


دكتور  
الخامس  
في الطب الشرعي

# توابع

# العلاقات الجنسية الغير شرعية



تأليف

**دكتور / هشام عبد الحميد فرج**

دكتوراه في الطب الشرعي والسموم

مدير إدارة الطب الشرعي بمحافظة المنوفية



٦٥

٨١٣,٨٥

جـ ٤



# تَوَابِع

## العَلَاقَاتُ الْجَنْسِيَّةُ الْغَيْرُ شَرِيعَيَّةُ

تأليف

دكتور // هشام عبد الحميد فرج

دكتوراة في الطب الشرعي والسموم

مدير إدارة الطب الشرعي بمحافظة المنوفية

الطبعة الأولى

أغسطس ٢٠٠٦ م

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ويمنع طبع أو نسخ أو تصوير أو بيع هذا الكتاب  
عن طريق البريد الإلكتروني إلا بعد الرجوع للمؤلف.

- يمكنكم الحصول على مؤلفات الدكتور/ هشام من الأماكن التالية:-
- ١- مكتبة نادى القضاة - خلف دار القضاء العالى بالأسعاف.
  - ٢- دار الفجر للنشر والتوزيع - النزهة الجديدة - القاهرة.
  - ٣- النهضة المصرية - ش عدلى القاهرة.
  - ٤- الملتقى المصرى للإبداع والتنمية - ش البيطاش - الإسكندرية.
  - ٥- دار الكتب القانونية - ش عدلى يكن - المحلة الكبرى.
  - ٦- دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع - ش الجلاء - المنصورة.
  - ٧- دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر - الإسكندرية.
  - ٨- المكتبة العصرية للنشر والتوزيع - المشاية السفلية - المنصورة.
  - ٩- مكتبة مدبولى - ميدان طلعت حرب - القاهرة.
  - ١٠- النهضة العربية - ش عبد الخالق ثروت - القاهرة.
  - ١١- مكتبة شادى - ش عبد الخالق ثروت القاهرة.
  - ١٢- دار الفكر العربى - ش عباس العقاد - القاهرة.
  - ١٣- دار حراء - ش شريف القاهرة.
  - ١٤- الأنجلو المصرية - ش محمد فريد - القاهرة.
  - ١٥- عالم الكتب - ش عبد الخالق ثروت - القاهرة.
  - ١٦- دار الكتاب المصرى اللبناني - ش قصر النيل - القاهرة.
  - ١٧- معظم المكتبات القانونية.
  - ١٨- أو الاتصال على المؤلف في ٠١٠٦٧٦٤٦٠٦

## المقدمة

أحمد الله حمدا يليق بمقامه علي توفيقه لي لإصدار هذا الكتاب الخامس في سلسلة الطب الشرعي المتخصصة لرجال القضاء والنيابة والشرطة والمحاماة والطب الشرعي وعلماء الجريمة والاجتماع.

لقد بدأت كتابة هذا الكتاب قبل الترتيب الذي وضعته له مسبقا في سلسلتي متأثراً تأثيراً كبيراً بخبر تناوله بإلحاح الفنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة. لقد صعقت من الرقم الضخم للقضايا المتناولة في المحاكم الآن بشأن إثبات النسب والذي بلغ حوالي ١٤٠٠٠ قضية (نعم أربعة عشر ألف قضية). أربعة عشر ألف طفل ولد من علاقة جنسية غير الزواج الشرعي الذي نعرفه.

شرع الله الزواج للحفاظ على النسل ، وجعل في الزواج سكن ومودة ورحمة. كانت الحياة بالأمس القريب بسيطة والزواج سهل ويسور ، وفي متناول معظم الشباب ، وفي سن يدور حول عشرين عاما. لكن تبدل الحال وساعت الظروف الاقتصادية للبلاد والعباد فأصبح الزواج حلم بعيد المنال لمعظم الشباب والفتيات وتأخر سن الزواج ليصل في المتوسط حول خمسة وثلاثين عاما للشاب وحول ثلاثين عاما للفتاة.

مع اختلاط الشباب بالفتيات في الجامعات والنادي والأماكن المختلفة وزادت نسبة العنوسية وارتفاع مهور الزواج ونتيجة ضياع الضوابط الشرعية والأخلاقية ظهرت نوعيات وسميات جديدة غير شرعية للزواج مثل الزواج العرفي وزواج فريندز وزواج ويك إند والزواج بالدم (في زواج الدم يتمترج دم طرف العلاقة معا بوخذ إبرة بأحد الأصابع لكلا منهما ثم تتلامس أصابعهم الدامية معا أمام الشاهدين) وزواج الوشم (فيه

يكتب كلا الزوجين اسم الآخر بحجم كبير بارز في جزء من جسده) والزواج بالكاسيت (فيه يقوم الكاسيت مقام الورقة حيث يسجل الطرفين موافقتهما على الزواج شفهيا وكذلك تسجل شهادة الشهود شفهيا على الكاسيت) والزواج المؤقت. ذكرت مجلة الأزهر في عددها الصادر في يونيو ٢٠٠٦م أن عدد الحالات التي أعلنت عن زواجهما العرفي وصلت إلى ٤٠٠ ألف حالة هذا بخلاف الذين لم يبحوا بزواجهم العرفي. إن هذه العلاقات الجنسية الغير شرعية جميعها تدخل تحت نطاق الزنا ولها آثار اجتماعية ودينية واقتصادية خطيرة.

الطلاق في الدول العربية عامة ومصر خاصة زادت حدته بشكل مخيف حيث تشير أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن حالات الطلاق عام ٢٠٠٤م بلغت حوالي ٦٤ ألف حالة ، وأن عدد المطلقات في مصر بلغ ٢٤٥٩٠٠٠ (حوالي أتنين ونصف مليون مطلقة) ، ومعدل الطلاق وصل لحالة كل ٦ دقائق. تصل نسبة الطلاق في السنة الأولى من الزواج إلى حوالي ٣٤% ، وإلي ١٢% في السنة الثانية من الزواج. إى إننا أمام مشكلة حادة وهي شباب غير مسلح دينيا تسليح كاف بسبب تسطيح التربية الدينية الأسرية والمدرسية والجامعية ، وتهبيش دور أماكن العبادة في المجتمع ، وتفكك الأسرة ، وتفشي الماديات بالمجتمع ، والهجمة الشرسة من الفضائيات على القيم والأخلاق ، وفي ظل وجود اختلاط بين الجنسين في الدراسة والعمل بدون نضوج ووعي فكري وديني ، ونتيجة كل ذلك ارتفعت حالات الممارسات الجنسية الغير شرعية.

إن أكثر شيء يقلقني هو توجه الشباب لممارسة الجنس لمجرد الاستمتاع بالجنس فقط وبدون ضوابط شرعية وبدون رغبة في تكوين أسرة

محترمة معترف بها اجتماعياً. أصبح الشاب يتهرب من الزواج الرسمي ويتهرب من الإنجاب خشية الالتزام بمسؤوليات الأبوة ، وأخشى أن نصل لمرحلة من الزمن مماثلة لتلك التي حدثت في أواخر الإمبراطورية الرومانية عندما عزف الرجال عن الزواج مما اضطر القيسar الروماني إلى فرض ضريبة عدم زواج (ضريبة عزوبيّة) وضريبة امتياز عن الإنجاب.

وفقاً للتعداد السكاني لمصر عام ٢٠٠٥ الذي بلغ فيه مجموع سكان مصر ٧٣,٦ مليون نسمة وجد أن حوالي ٤٠,٨ % (أي حوالي ٣٠ مليون) في الشريحة العمرية من ١٥ - ٤٠ سنة. ونظراً لتأخر سن الزواج ولزيادة حالات الطلاق (٤٠% من حالات الطلاق تحدث في سن الثلاثين) ، فإننا أمام حوالي ١٥ مليون ناضج جنسياً لم يتزوج نهائياً بالإضافة للمطلقين والمطلقات الناضجين جنسياً في نفس تلك الشريحة العمرية.

تشير بعض الدراسات إلى وجود حوالي ثلاثة ملايين ناشط وناشطة جنسية في المجتمع المصري (يقصد بعبارة ناشط جنسياً هو الذي يمارس الجنس خارج نطاق الزواج). لكنني أتوقع أن يكون الرقم أكثر من ذلك بكثير لأن هذه العلاقات سرية ولا نكتشف منها إلا الحالات التي تتعرض لتوابع العلاقات الجنسية الغير شرعية. هذا الشباب يتعرض لاضطراب نفسي شديد بسبب الكبت والامتياز عن ممارسة جنسية يتغيّرها أو بسبب الندم على ممارسة جنسية غير شرعية. كذلك قد تدفع الرغبة الجنسية الشاب لارتكاب جريمة جنسية مثل الخطف والاغتصاب والتحرش الجنسي. إن إطلاق الشباب العنان لرغباتهم الجنسية قد يوقعهم فريسة

لأمراض التي تنتقل من خلال الممارسات الجنسية. إن الممارسات الجنسية الغير شرعية يصاحبها زيادة في انتشار الإدمان وتعاطي المخدرات ، وكذلك يصاحبها ارتفاع معدلات الجريمة. لذا فقد حاولنا في هذا الكتاب تناول توابع العلاقات الجنسية الغير شرعية.

تناولنا في الفصل الأول من هذا الكتاب أسباب العلاقات الجنسية الغير شرعية ، ونتائجها على الفتاة والطفل المولود وعلى المجتمع بأسره ، وكيفية علاج تلك المشكلة من وجهة نظرنا. في الفصل الثاني تناولنا موضوع الحمل الغير شرعي وتطرقنا فيه إلى بداية الخلق كما وردت في القرآن الكريم وتركيب الجهاز التناسلي للأثني ، والحمل من الوجهة الطبية الشرعية ، وأعراض ومظاهر الحمل وكيفية تشخيصه.

في الفصل الثالث وقفتا وقفه طويلة مع الإجهاض حيث تناولنا فيها تعريف الإجهاض ومشروعاته علي مستوى قارات العالم المختلفة ورأي الأديان السماوية والعقائد المختلفة فيه ، ورأي المؤلف الشخصي ووجهة نظره في مواجهة إباحة الإجهاض. في نفس هذا الفصل أيضا ذكرنا موقف القانون المصري من الإجهاض ، ثم تحدثنا من الوجهة الطبية الشرعية عن أنواع الإجهاض. وأخيرا مررنا علي علاقة المشاجرات بالإجهاض ، والإجهاض الكيميائي الواسع الانتشار الآن في أمريكا وأوروبا ، وكيفية تشخيص الإجهاض بالأحياء والأموات ، وسدة السائل الأمنيوسي كأهم مضاعفات للإجهاض.

في الفصل الرابع تناولنا علامات الولادة الحديثة والقديمة في الأحياء والأموات. ناقشنا في الفصل الخامس قتل المواليد حديثي الولادة من حيث

الأسباب وعلامات الاستعراض وعلامات ولادة الطفل حيا وكيفية تحديد عمر المولود ومدة بقائه علي قيد الحياة وسبب وفاته.

نظرًا لحدوث وفيات فجائية لبعض الأطفال وهو ما يسمى متلازمة الوفاة الفجائية للأطفال واحتمال تفسيرها من البعض على إنها جريمة قتل ، فقدرأينا مناقشة تلك الوفيات في الفصل السادس لتوضيح صورتها ومعالجتها منعاً لحدوث اللبس.رأينا أن نختتم هذا الكتاب بمناقشة المشاكل الاجتماعية المتربطة عن العلاقات الجنسية الغير شرعية في الفصل السابع حيث ناقشنا جرائم الشرف وترقيع غشاء البكارة وإثبات النسب والأطفال القطاء وزيادة عدد ممارسي الدعارة في المجتمع وانتقال الأمراض النتاسلية وزيادة نسبة المتسربين من التعليم وزيادة نسبة الجريمة في المجتمع.

القارئ العزيز بعد أن تفرغ من قراءة فصول الكتاب بأكملها ستصل إلى مغزى كلمة توابع في عنوان هذا الكتاب. لقد أردت أن أشبه العلاقات الجنسية الغير شرعية بالزلزال نظراً لخطورتها الشديدة على المجتمع بأسره. بالطبع هناك فارق بين توابع العلاقات الجنسية الغير شرعية وتتابع الزلزال: الأولى متعة وقنية تتبعها توابع تصاعدية تزداد حدتها وشدتها بمرور الوقت ، والثانية كارثة وقنية تتبعها توابع أقل حدة وشدة من وقع الزلزال نفسه.

إن انتشار العلاقات الجنسية الغير شرعية يدل على فشل المجتمع بأسره في التعامل مع انشباب في فترة المراهقة وما بعدها. إنها تعني فشل الأسرة وفشل نظام التعليم وفشل رجال الدين وفشل علماء الاجتماع وفشل مؤسسات المجتمع المدني وأخيراً فشل الدولة.

إنني أطالب بتقليص عدد ساعات عمل المرأة لتعود إلى أبنائها وتحل محل معهم وتهتم بشئونهم. أمنعوا اختلاط الشباب مع الفتيات في الجامعات وخصصوا كليات للشباب وكليات للفتيات مثلاً بدأ الآن بعض دول أوروبا الغربية تتوجه لذلك. أعيدوا دور العبادة ولعلماء الدين هبّتهم ووفارهم وأعطوهم الوقت الكافي في المساجد وفي التليفزيون والقنوات الفضائية لتوضيح مفهوم الدين الصحيح دون تطرف أو ابتذال. أعيدوا للمدرس هبّته ومكانته ليعود كما كان قدوة ومثل للأبناء. يسروا الزواج على الأبناء ولا تتشددوا في الطلبات واتركوهن يبدأوا حياتهم بالقدر المتاح لديهم وسيغනوهم الله من فضله بمشيئته. إن علماء الاجتماع مطالبون ببذل قصارى جهدهم لدراسة الظواهر الغربية على مجتمعنا لمعرفة أسبابها والتوصل لكيفية علاجها. إن شبابنا يستحق منا الاهتمام أكثر من هذا فهم نصف الحاضر وهم مستقبل الأمة بالكامل. إن مصر أسم أكبر مننا جميعاً ويستحق منا بذل الغالي والرخيص من أجلها ، وشبابنا هو مصر القادمة فهل تتركوهن ليضيعوا وتضيع معهم هويتنا وثقافتنا وديننا.

وأخيراً أحمد الله حمدًا كثيرة على توفيقه لإصدار هذا الكتاب الذي أطمع أن ينال رضاكم كما عوينتمني في الأجزاء السابقة لهذه السلسلة ، وأسأل الله العلي القدير أن يوفقني في استكمال تلك السلسلة ، وإلي لقاء في إصدار جديد قريب بمشيئته الله.

### المؤلف

دكتور/هشام عبد الحميد فرج

أغسطس ٢٠٠٦ م

[dhesham3737@hotmail.com](mailto:dhesham3737@hotmail.com)

٠١٠٦٧٦٤٦٠٦ تليفون

## الفهرس

### الفصل الأول

١٩ .....	أسباب ونتائج العلاقات الجنسية الغير شرعية.
٢٢ .....	أسباب العلاقات الجنسية الغير شرعية.....
٢٥ .....	ما هي مشكلة الحمل الغير مرغوب فيه.....
٢٥ .....	أولاً: مشاكل الحمل الغير مرغوب فيه للفتاة وأسرتها.....
٢٧ .....	ثانياً: مشاكل الطفل الناتج عن الحمل الغير مرغوب فيه.....
٢٩ .....	ثالثاً: تأثير الحمل الغير مرغوب فيه على المجتمع.....
٣٠ .....	علاج المشكلة.....

### الفصل الثاني

٣٥ .....	الحمل.....
٣٧ .....	مراحل الخلق في القرآن الكريم.....
٣٧ .....	أولاً: مرحلة التراب.....
٣٨ .....	ثانياً: مرحلة النطفة.....
٣٩ .....	ثالثاً: مرحلة العطقة.....
٣٩ .....	رابعاً: مرحلة المضفة.....
٤٠ .....	خامساً: مرحلة نفح الروح.....
٤٠ .....	سادساً: القرار المكين.....
٤١ .....	سابعاً: ثم السبيل يسره.....
٤١ .....	الجهاز التناسلي للأئمـى.....
٤١ .....	أولاً: الأعضاء الخارجية.....
٤٢ .....	ثانياً: الأعضاء الداخلية.....
٤٥ .....	التغيرات الفسيولوجية لدورة الحيض الشهرية.....
٤٦ .....	التعریف الطبی للحمل.....

٥٠	مدة الحمل.....
٥٢	الطب الشرعي والحمل.....
٥٣	<b>تشخيص الحمل.....</b>
٥٣	أعراض الحمل.....
٥٥	علامات الحمل.....
٥٥	أولاً: العلامات الترجيحية للحمل.....
٥٨	ثانياً: علامات الحمل المؤكدة.....
٥٩	أسباب تأخر اكتشاف الحمل.....

### **الفصل الثالث**

٦١	الإجهاض.....
٦٣	تعريف الإجهاض.....
٦٤	الإجهاض المشروع والإجهاض الغير مشروع.....
٧٥	إحصائيات الإجهاض في أمريكا.....
٧٩	الأدبيان والعقائد والإجهاض.....
٨١	رأي الشخصي للمؤلف في إباحة الإجهاض.....
٩٠	القانون المصري والإجهاض .....
٩٤	نص القوانين المصرية في جريمة الإجهاض.....
٩٤	جنحة الإجهاض.....
٩٥	جريمة الإجهاض.....
٩٦	أنواع الإجهاض.....
٩٦	أولاً: الإجهاض الطبيعي أو التلقائي.....
٩٨	ثانياً: الإجهاض المستحق.....
٩٨	الإجهاض المستحق المشروع.....
٩٩	الإجهاض المستحق الغير مشروع.....

٩٩	وسائل الإجهاض الجنائي.....
٩٩	العنف العام علي الجسد.....
١٠٠	العنف الموضعي علي الجهاز التناسلي.....
١٠١	استعمال العقاقير.....
١٠٢	الإجهاض الطبي.....
١٠٣	وسائل الإجهاض الطبي.....
١٠٣	الامتصاص الخولي.....
١٠٤	التوسيع والكحت.....
١٠٤	إجهاض التسمم الملحي.....
١٠٥	التوسيع والتفریغ.....
١٠٥	الحقن داخل القلب.....
١٠٦	إجهاض الولادة الجنئي.....
١٠٦	مضاعفات الإجهاض الجراحي الطبي.....
١٠٨	الإجهاض بعد مشاجرة.....
١٠٩	الإجهاض الكيميائي.....
١١٢	الآثار الجانبية للإجهاض الكيميائي.....
١١٣	تشخيص الإجهاض.....
١١٣	تشخيص الإجهاض في الأحياء.....
١١٦	تشخيص الإجهاض في المتوفيات.....
١١٩	سدة السائل الأمينيوسي.....
	<b>الفصل الرابع</b>
١٢٣	الولادة (الوضع).....
١٢٥	الولادة من الوجهة الطبية الشرعية.....
١٢٦	علامات الولادة.....

١٢٦	أولاً: علامات الولادة الحديثة.....
١٢٦	علامات الولادة الحديثة في الأحياء.....
١٢٨	علامات الولادة الحديثة في المتوفيات.....
١٢٩	ثانياً: علامات الولادة القديمة.....
١٢٩	علامات الولادة القديمة في الأحياء.....
١٢٩	علامات الولادة القديمة في الأموات.....
	<b>الفصل الخامس</b>
١٣١	<b>قتل المواليد حديثي الولادة.....</b>
١٣٤	أسباب قتل المواليد حديثي الولادة.....
١٣٩	علامات الاستعراف بالجثة.....
١٤١	هل ولد حياً أو ميتاً.....
١٤١	الأدلة الغير طبية الدالة على الحياة.....
١٤١	الأدلة الطبية.....
١٤٢	ظواهر التنفس.....
١٤٥	تغيرات الحبل السري.....
١٤٦	تغيرات الجلد.....
١٤٧	تغيرات الأوعية الدموية.....
١٤٧	علامات الرضاعة.....
١٤٨	ظواهر إصابية حيوية.....
١٤٨	ظواهر تعارض مع الحياة.....
١٤٩	تحديد عمر الجنين.....
١٥٤	تحديد طبيعة عملية الولادة .....
١٥٦	تحديد مدة بقاء المولود علي قيد الحياة.....
١٥٦	درجة نقشر الجلد.....

١٥٦	التغيرات بقاعدة الحبل السري.....
١٥٦	انغلق الفتحة البيضاوية.....
١٥٦	قفل القناة الشريانية.....
١٥٦	طفو المعدة والأمعاء.....
١٥٧	وجود براز أصفر.....
١٥٧	درجة التئام أو نقيح.....
١٥٧	تحديد سبب الوفاة.....
١٥٧	الفعل السلبي.....
١٥٨	الفعل الإيجابي.....
١٦٠	تحديد المدة التي مضت بين الولادة والوفاة.....
	<b>الفصل السادس</b>
١٦١	متلازمة الوفاة الفجائية للأطفال.....
١٦٣	تعريف المتلازمة.....
١٦٣	معدل حدوثها.....
١٦٤	عوامل الخطورة المؤثرة في المتلازمة.....
١٦٩	كيفية حدوث الوفاة.....
١٦٩	معاينة مكان وفاة الطفل.....
١٦٩	الكشف الظاهري.....
١٧٠	الصفة التشريحية.....
	<b>الفصل السابع</b>
١٧١	المشاكل الاجتماعية للعلاقات الجنسية الغير شرعية.....
١٧٣	أولاً: جرائم الشرف.....
١٧٦	الزنا.....
١٧٨	ثانياً: ترقيع غشاء البكاراة.....

١٧٩ .....	أنواع غشاء البكاره.....
١٨٣ .....	رأي الدين في البكاره.....
١٨٣ .....	رأي الدين في ترقيع غشاء البكاره.....
١٨٥ .....	ثالثاً: إثبات النسب.....
١٨٥ .....	إثبات النسب في الشريعة الإسلامية.....
١٨٥ .....	إثبات النسب بالفراش.....
١٨٦ .....	الإقرار.....
١٨٧ .....	البينة.....
١٨٧ .....	القيافة.....
١٨٧ .....	البصمة الوراثية.....
١٩٠ .....	رابعاً: الأطفال اللقطاء.....
١٩٤ .....	خامساً: زيادة عدد ممارسي الدعارة في المجتمع.....
١٩٤ .....	سادساً: انتقال الأمراض التناولية.....
١٩٥ .....	سابعاً: زيادة نسبة المتسربين من التعليم.....
١٩٦ .....	ثامناً: زيادة نسبة الجرائم في المجتمع.....

### **المراجع**

١٩٧ .....	المراجع العربية.....
١٩٩ .....	موقع الانترنت.....
١٩٩ .....	المراجع الأجنبية.....

## فهرس الأشكال

.....	الحيوانات المنوية تحيط بالبوياضة.....	شكل ١
.....	حيوان منوي واحد ينجح في اختراق البوياضة.....	شكل ٢
.....	انقسام البوياضة الملقحة.....	شكل ٣
.....	مقطع طولي يوضح الجهاز التناسلي للأثني.....	شكل ٤
.....	الأعضاء الخارجية للجهاز التناسلي للأثني.....	شكل ٥
.....	الأعضاء الداخلية للجهاز التناسلي للأثني.....	شكل ٦
.....	مقطع طولي يظهر علاقة عنق الرحم بتجويف الرحم والمهبل..	شكل ٧
.....	تكوين بطانة الرحم بعد نزول دم الحيض ، وظهور البوياضة...	شكل ٨
.....	زيادة سمك بطانة الرحم وجود البوياضة داخل المبيض.....	شكل ٩
.....	عملية التبويض وخروج البوياضة إلى أنبوبة فالوب.....	شكل ١٠
.....	ضمور البوياضة الغير ملقحة مع زيادة سمك بطانة الرحم.....	شكل ١١
.....	التغيرات الحادثة بالبوياضة والجسم الأصفر.....	شكل ١٢
.....	زيادة سمك بطانة الرحم وخلوه من الحمل.....	شكل ١٣
.....	نزول دم الحيض.....	شكل ١٤
.....	البقاء الحيوانات المنوية بالبوياضة في أنبوبة فالوب.....	شكل ١٥
.....	توأم متماثل به مشيمة واحدة وحبلين سريين.....	شكل ١٦
.....	دكانة حلمة الثدي مع خروج اللبا (علامات الحمل).....	شكل ١٧
.....	رحم متوفاة به جنين في الشهر الثامن الرحمي.....	شكل ١٨
.....	خط أسود رأسي على الخط المنصف للبطن (علامات الحمل)..	شكل ١٩
.....	تقطيعات الحمل (علامات الحمل).....	شكل ٢٠
.....	مضاعفات الإجهاض الجنائي.....	شكل ٢١

شكل ٢٢	الإجهاض بطريقة الامتصاص الخوائي.....
شكل ٢٣	تمزق جسد الجنين لأجزاء عديدة نتيجة الإجهاض.....
شكل ٢٤	فحص الجنين المجهض للتأكد من نزوله بالكامل.....
شكل ٢٥	فحص الجنين المجهض للتأكد من نزوله بالكامل.....
شكل ٢٦	جنين تم إجهاضه بطريقة التسمم الملحي.....
شكل ٢٧	الإجهاض بطريقة التوسيع والتثريغ.....
شكل ٢٨	تمزق الجنين أربا نتيجة الإجهاض بطريقة التوسيع والتفریغ....
شكل ٢٩	تمزق الجنين أربا نتيجة الإجهاض بطريقة التوسيع والتفریغ....
شكل ٣٠	الإجهاض بطريقة الولادة الجزئية.....
شكل ٣١	الإجهاض بطريقة الولادة الجزئية.....
شكل ٣٢	مظهر سدة السائل الأمينيوي تحت المجهر.....
شكل ٣٣	خروج الجنين من الرحم في نهاية المرحلة الثانية من الولادة..
شكل ٣٤	لقطة عثر عليه في حالة تعفن رمي متقدم.....
شكل ٣٥	حبل سري مفصول من المشيمة وغير مربوط.....
شكل ٣٦	الطريقة الطبية لفصل وربط الحبل السري.....
شكل ٣٧	تقرح مكان السرة.....
شكل ٣٨	تشوهات خلقية تتعارض مع الحياة.....
شكل ٣٩	تشوهات خلقية تتعارض مع الحياة.....
شكل ٤٠	عدم اكتمال الأشهر الرحمية يتعارض مع الحياة.....
شكل ٤١	عدم اكتمال الأشهر الرحمية يتعارض مع الحياة.....
شكل ٤٢	جنين قابل للحياة.....
شكل ٤٣	جنين يبلغ أربعة أسابيع رحمية.....

.....	جنين يبلغ أربعة أسابيع رحمية.....	شكل ٤٤
.....	جنين يبلغ سبعة أسابيع رحمية.....	شكل ٤٥
.....	جنين يبلغ سبعة أسابيع رحمية.....	شكل ٤٦
.....	جنين يبلغ ثمانية أسابيع رحمية.....	شكل ٤٧
.....	جنين يبلغ ثمانية أسابيع رحمية.....	شكل ٤٨
.....	جنين يبلغ ١١ أسبوع رحمي.....	شكل ٤٩
.....	جنين يبلغ ١٢ أسبوع رحمي.....	شكل ٥٠
.....	جنين يبلغ ١٦ أسبوع رحمي.....	شكل ٥١
.....	جنين يبلغ ١٦ أسبوع رحمي.....	شكل ٥٢
.....	جنين يبلغ أربعة أشهر رحمية.....	شكل ٥٣
.....	جنين يبلغ أربعة أشهر رحمية.....	شكل ٥٤
.....	جنين يبلغ ١٦ أسبوع رحمي.....	شكل ٥٥
.....	جنين يبلغ ١٦ أسبوع رحمي.....	شكل ٥٦
.....	جنين يبلغ خمسة أشهر رحمية.....	شكل ٥٧
.....	جنين يبلغ خمسة أشهر رحمية.....	شكل ٥٨
.....	جنين يبلغ ٢٠ أسبوع رحمي.....	شكل ٥٩
.....	جنين يبلغ خمسة أشهر رحمية.....	شكل ٦٠
.....	جنين يبلغ ستة أشهر رحمية.....	شكل ٦١
.....	جنين يبلغ ستة أشهر رحمية.....	شكل ٦٢
.....	جنين يبلغ ستة أشهر رحمية.....	شكل ٦٣
.....	جنين يبلغ سبعة أشهر رحمية.....	شكل ٦٤
.....	جنين يبلغ سبعة أشهر رحمية.....	شكل ٦٥

شكل ٦٦ جنين يبلغ ثمانية أشهر رحمية.....	66
شكل ٦٧ جنين يبلغ ثمانية أشهر رحمية.....	67
شكل ٦٨ جنين يبلغ تسعه أشهر رحمية.....	68
شكل ٦٩ شعر الرأس يصبح سميك وكثيف في الشهر التاسع الرحمي....	69
شكل ٧٠ إلقاء القطيط في الشارع العام.....	70
شكل ٧١ لقطيط ملقي عار عن الملابس وجد داخل قطعة قماش.....	71
شكل ٧٢ لقطيط به إصابة طعنية.....	72
شكل ٧٣ الوضع الصحيح والوضع الخاطئ لنوم الطفل.....	73
شكل ٧٤ نوم الطفل في سرير خالي وعدم تغطية الوجه.....	74
شكل ٧٥ نوم الطفل في سرير مستقل في نفس حجرة الأم.....	75
شكل ٧٦ طفل مبتسر.....	76
شكل ٧٧ بهاته حول الفم والأنف نتيجة منع تكوين الرسوب الدموي.....	77
شكل ٧٨ تقيحات وإنتهابات حول غشاء التامور المحاط بالقلب.....	78
شكل ٧٩ غشاء بكارة هلامي الشكل.....	79
شكل ٨٠ غشاء بكاره حلقي الشكل.....	80
شكل ٨١ غشاء بكاره مسنن الحواف.....	81
شكل ٨٢ تمزق حديث بغشاء البكاره.....	82
شكل ٨٣ تلاشي غشاء البكاره نتيجة تكرار الممارسة الجنسية والولادة..	83

**الفصل الأول**  
**أسباب ونتائج**  
**العلاقات الجنسية**  
**الغيرشرعية**



## الفصل الأول

### أسباب ونتائج العلاقات الجنسية الغير شرعية

نقصد هنا بعبارة العلاقات الجنسية الغير شرعية هي كل العلاقات الجنسية التي تتم بالتراضي بين الطرفين (الرجل والأنثى) خارج نطاق الزواج ، وتشمل ما يسمى الزواج العرفي. دائمًا أنا أحب أن أطلق علي ما يسمى بالزواج العرفي بأنه ارتباط المراهقين الغير شرعي لأنه لا يحوي في طياته على أركان الزواج لعدم وجود ولد أو إشهاد ، وما هو إلا رغبات جنسية بين الشباب الصائحة.

كما سبق أن ذكرت في المقدمة كان العدد الضخم لقضايا إثبات النسب هو الدافع لإصدار هذا الكتاب ، لأن هذا الرقم يعني لي:-

(١) أن هناك أربعة عشر ألف طفل غير مرغوب فيه يربى وينشأ في ظروف اجتماعية سيئة لعدم تواجد الأب والأم معاً في نسيج أسري متancock. هذا من شأنه أن يجعلنا أمام أربعة عشر ألف طفل غير سوي نظراً للتباين الأبي والأمي وأسرتيهما ، وبالتالي يجعلنا أمام أربعة عشر طفل مشروع مجرم في المستقبل القريب.

(٢) أن هناك ثمانية وعشرين ألف شاب وفتاة (أي آباء وأمهات هؤلاء الأربعين ألف طفل) أقاموا علاقات جنسية غير شرعية مما يدل على وجود خلل شديد في نسيج المجتمع.

(٣) أن حدوث الحمل في العلاقات الجنسية الغير شرعية يمثل نسبة ضئيلة من تلك العلاقات ، حيث تقوم الفتاة غالباً باستعمال طريقة أو أخرى لمنع حدوث الحمل وافتضاح أمر تلك العلاقة السرية. أي إن هذا الحمل غير مرغوب فيه وحدث بطريق الخطأ. تشير الدراسات الأمريكية

والأوروبية أن نسبة حدوث الحمل الغير المرغوب فيه بين المراهقين نتيجة العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج تبلغ حوالي ٥٥% فقط من مجموع العلاقات الجنسية. لو طبقنا تلك النسبة على القضايا المرفوعة لإثبات النسب الآن لوجدنا أن عدد الذين يمارسون العلاقات الجنسية الغير شرعية يصل إلى حوالي ٥٦٠٠٠ (خمسماة وستون ألف). أي إننا أمام أكثر من نصف مليون شاب وفتاة من خيرة الشباب بدعوا حياتهم في الظلام وهم في حالة ضياع أخلاقي ولا يوجد لديهم وازع ديني يمنعهم ، وهو ما يشير لوجود خلل مجتمعي شديد.

(٤) أن العدد المتوقع للعلاقات الجنسية الغير شرعية السابق ذكره (٥٦٠٠٠) لا يمثل كل العدد لأن هناك العديد من تلك العلاقات تم إنتهاء الحمل فيها بالإجهاض ، وبالتالي فإننا أمام عدد قابل للزيادة بشكل كبير. (٥) أيضاً هذا العدد قابل للزيادة نظراً لأن بعض الأسر التي تفشل في إحداث الإجهاض لابنتهم تنتظر حتى ولادتها ثم تتخلص من الطفل وتتركه أمام أحد المساجد أو تقتله وتلقى به في المناطق النائية أو المصارف المائية.

(٦) بعد كل ما سبق تخيلوا معى هؤلاء الشباب والفتيات فى مقتبل العمر وقبل أن يحصلوا على المؤهل الجامعى تبدأ أولى تجاربهم في النزاعات والمحاكم بدلاً من توجيه طاقاتهم للعمل والإنتاج. الأمر جد خطير على الشباب وأخطر على الأطفال والمواليد.

### أسباب العلاقات الجنسية الغير شرعية

بالطبع أنا لست متخصصاً في علم الاجتماع لدراسة أسباب المشكلة ، ولكنني مواطن يعيش في هذا البلد ويستشعر قضايا الوطن والأهم من ذلك

هي كوني أتعامل مع الجريمة نتيجة طبيعة عملِي كطبيب شرعي. إن  
أسباب تلك المشكلة من وجهة نظري الخاصة تكمن في:-  
(١) فقدان الوازع الديني بسبب تحجيم منهج التربية الدينية بالمدارس  
وإهمال الجوانب الروحية في المناهج ، وغياب دور أماكن العبادة والأزهر  
، وتخلف أداء رجال الوعظ الديني عن التعامل مع مستحدثات العصر .

(٢) ضياع دور الأسرة بسبب:-  
(أ) غياب دور الأم في الأسرة بسبب خروجها للعمل وعودتها  
منهكة للمنزل بعد العصر تقريبا فتحاول أداء الأعمال المنزلية مثل إعداد  
الطعام وتنظيم المنزل ، وبالتالي لا يتبقى لها وقت للجلوس مع الأبناء  
لسماعهم وصداقتهم ومعرفة مشاكلهم.

(ب) غياب دور الأب بسبب ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع ، أو  
سفره للخارج وتركه للأم مع الأطفال ، أو دخوله السجن أو وفاته.  
(٣) غياب المدرسة والجامعة عن أداء الدور المنوط بهما بسبب زياد  
أعداد الطلبة بالفصول والمدرجات وتوجه الأساتذة المادي نحو الدروس  
الخصوصية ، وعدم مناقشة مشاكل الطلبة لضيق الوقت.

(٤) انفتاح المجتمع افتتاح سريع على عادات العالم الغربي من خلال  
الفضائيات دون إعداد المجتمع الإعداد المناسب لمواجهة هذا الطوفان  
إنني أشبه ما يحدث الآن في المجتمع العربي بشخص جائع لدرجة أن  
شارف على الموت جوعا ووضعنا أمامه كل أنواع الطعام فيظل يأكل  
ويأكل حتى يموت من التخمة. هذا هو حالنا في الحرية والجنس وكل شيء  
حيث كنا مجتمع مغلق وظهرت أمامنا الفضائيات فأخذنا أسوأ ما عنده  
وتركتنا جدهم واجتهادهم وعلمهم. إن قضاء الأطفال والراهقين فتر

طويلة في مشاهدة برامج التلفزيون بدون تمييز النافع من الضار منها هو من أكثر العوامل التي تؤدي لتعلم العادات والتقاليد الغربية عن مجتمعاتنا الشرقية المحافظة. إن مشاهدة المراهقين للعلاقات الجنسية المفتوحة دون قيود أو ضوابط أخلاقية في المسلسلات والأفلام الأجنبية يجعلهم يعتقدوا أن تلك السلوكيات طبيعية ومحبوبة ، ولذلك أصبحت وسائل الإعلام من أهم العوامل التي تساعد على انتشار الرذيلة في المجتمع.

(٥) اختلاط شباب الجامعات الغير ناضج فكريًا داخل قاعات العلم فتركوا العلم وتحولوا لإقامة العلاقات العاطفية أو العلاقات الجنسية الغير شرعية. هذا يحدث في المجتمعات العربية بالرغم من إن بعض الدول الأوروبية بدأت الآن في فصل الطلبة في أماكن مختلفة عن أماكن الطالبات.

(٦) تفشي السبطالة في المجتمعات العربية بشكل صارخ مما جعل الشباب يفقد الأمل في العثور على وظيفة تمكنه من أعباء الزواج.

(٧) عدم وجود قدوة واضحة أمام الشباب غير أبطال أغاني الفيديو كليب الفاضحة والأفلام السينمائية ، وبالتالي فهم يقلدوهم في الإباحية والتصرفات والملابس.

(٨) غياب دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني عن أداء الدور المنوط بها في توعية المجتمع.

سماع المرأة المتزوجة بنبأ حملها من الطبيب يقابل بفرحة وسعادة ليس لها مثيل من المرأة وزوجها وعائلتها وأصدقائهم. علي النقيض من ذلك تماما عندما تسمع فتاة غير متزوجة بنبأ الحمل تتزلزل الأرض تحت قدميها وتتمنى أن تتشق الأرض وتبتلعها لسماعها أسوأ خبر في حياتها.

المجتمعات الغربية التي تسمح بالممارسات الجنسية خارج نطاق الزواج تمر الآن بمشكلة خطيرة بسبب زيادة نسبة حدوث الحمل الغير مرغوب فيه. لقد بدأت أمريكا والدول الأوروبيه في تكوين الجمعيات الأهلية لمحاربة ظاهرة الحمل خارج نطاق الزواج (حمل المراهقات تحت سن ٢٠ سنة).

على سبيل المثال تذكر الإحصائيات الأمريكية أن حوالي مليون مراهقاً أقل من عشرين سنة تحمل خارج نطاق الزواج في السنة الواحدة ، وهو ما يمثل ٣٤٪ من عدد المراهقات في هذه الفئة العمرية. كما تشير الإحصائيات إلى أن معدل المواليد من المراهقات الغير متزوجات يصل إلى ٥٦٠ ألف مولود في السنة الواحدة ، وهو ما يمثل حوالي ١٦٪ من عدد المواليد في أمريكا. تشير الإحصائيات أن نسبة حدوث الحمل للفتيات المراهقات خارج نطاق الزواج بأمريكا تمثل ضعف نصف نسبة حدوث هذا الحمل في بريطانيا ، وأربعة أمثال نسبة حدوث الحمل في فرنسا وألمانيا : وأكثر من عشرة أمثال نسبة حدوث الحمل في اليابان.

#### ما هي مشكلة الحمل الغير مرغوب فيه ؟

يمثل الحمل الغير مرغوب فيه (خارج نطاق الزواج) مشكلة الفتاة وأسرتها وعائلتها ولطفلها وللمجتمع بأسره.

#### أولاًـ مشاكل الحمل الغير مرغوب فيه للفتاة وأسرتها

(١) في بداية الأمر تمر الفتاة بمحنة نفسية شديدة وتحاول أن تقنع والد هذا الجنين أن يذهب لأسرتها ليتم الزواج بسرعة قبل أن يفضح أمرها. غالباً لا يستجيب الشاب لذلك لأنه لا يستطيع مواجهة أسرته برغبته في الزواج (غالباً يكون ما زال طالباً جامعاً) وكذلك لعجزه المادي على

تكلسيف الزواج فيقترح على الفتاة التخلص من الجنين. تمر الفتاة بعد ذلك بأصعب لحظات حياتها فهي في المقام الأول أم لجنين بين أحشائها هو جزء منها ولا تزيد التخلص منه ، ولكنها تحت وطأة الظروف القاسية تضطر لمحاولة الإجهاض لإنتهاء الحمل.

(٢) تُتعرض الفتاة لمحنة الإجهاض والبحث عن وسيلة للتخلص من الجنين ، فهي تلجأ أولاً للطرق التقليدية وهي العنف العام على الجسد أو العنف الموضعي بإدخال أشياء غريبة في فرجها ورحمها. بعد فشلها في الإجهاض بهذه الطرق تحاول تدبير المبالغ المالية المطلوبة وتلجأ للعيادات السرية المشهور عنها إجراء عمليات الإجهاض الغير مشروعة. إذا لم تستطع الفتاة تدبير المبلغ المطلوب لإجراء الإجهاض بالعيادات المشبوهة فقد تلتقطها بعض محترفات الدعاارة لتقديم المتعة مقابل أجر من خلال شبكات الدعاارة وذلك لتدبير المبلغ المطلوب للعملية. بعد تدبير المبلغ للعملية فإن الفتاة قد تتعرض لمشاكل صحية شديدة بسبب الإجهاض السري الذي يجري في ظروف صحية غير آمنة والذي قد يؤدي بحياتها.

(٣) قد تنجح محاولات الإجهاض وتنخلص الفتاة من الجنين. نعم هي نجحت في القضاء على المشكلة الوقتية ولكنها ستمر بظروف نفسية مستقبلية صعبة. فهي عادة تفقد احترامها لذاتها وصدقها مع النفس ، وتعامل مع الرجال علي إنهم كلام مخادعين ، وتبثث دائماً عن الأبواب الخلفية لإنتهاء مشاكلها مثلاً فعل الطبيب معها. ثم إنها تلجأ للغش بترقيع غشاء البكارة قبل زواجهما لتصبح عذراء أمام زوجها الجديد المخدوع.

(٤) إذا فشلت الفتاة في إجراء الإجهاض قد تهرب من أهلها خوفاً من بطشهم ويلتقطها من الشارع أهل السوء وتصبح فتاة ليل تنشر شرورها في المجتمع بين الرجال.

(٥) قد لا تنجح محاولات الإجهاض ويفتضح أمرها أمام أهلها. في مثل هذه الحالة قد يكون قتل الفتاة هو مصيرها النهائي على يد أسرتها للتخلص من عارها ، وبالتالي يتعرض أهلها للسجن ويكون القبر هو مثواها هي وجذنها.

(٦) قد يتستر أهل الفتاة على الحمل حتى تتجب ابنتهما ثم يقتلا الطفل أو يلقوه حياً أمام مسجد ليضاف طفل لقبطي جديد في المجتمع.

(٧) قد تتجب الفتاة والطفل وتلجمان للقضاء لإثبات نسب الطفل لأبيه وتمر برحلة من العذاب في المحاكم ومكاتب المحامين.

(٨) نتاج المشاكل النفسية والعائلية الشديدة التي تمر بها هذه الفتاة فإنها لا تكمل تعليمها ، وبذلك تفقد كيانها العلمي ويفقد المجتمع بخروج فرد منه من محراب العلم.

(٩) صحيًا إذا استمر الحمل ونظرًا للمشاكل النفسية والعائلية الشديدة التي تمر بها فهي لا تتبع حالتها الصحية أثناء الحمل مما يعرضها غالباً لفقد وزنها الذي قد يصل لدرجة الذهاب ، وتسمم الحمل (انتفاخ الوجه واليدين والقدمين ، وارتفاع ضغط الدم ، ونزول البروتين بالبول أثناء الحمل) ، والأنيميا وتفاقم الأمراض التي تنتقل بالمارسة الجنسية.

ثانياً: مشاكل الطفل الناتج عن الحمل الغير مرغوب فيه

(١) أهم مشكلة صحية يعني منها هذا الطفل هو ولادته ناقص الوزن (Low birth weight babies)

احتمالية وفاة الطفل ، أو تعرضه للعمى ، وفقدان السمع ، ومشاكل نفسية مزمنة ، وتخلف عقلي ، وإعاقة ذهنية وحركية.

(٢) ولادة الطفل قبل اكتمال نموه (Premature labor): معظم الأجنة تولد بعد ٣٨ – ٤٢ أسبوع من آخر دورة حيض. يقصد بولادة الطفل قبل اكتمال نموه هو الولادة قبل بلوغ الأسبوع ٣٧ من آخر دورة حيض. معظم المواليد يوضعوا في حضانات ولا يعانون أي مشاكل صحية مستقبلية ، ولكن القليل منهم قد يعاني من صعوبات التعلم أو الشلل المخي (Cerebral palsy).

(٣) فقدان الرعاية الصحية: يحتاج الطفل عقب الولادة لرعاية صحية جيدة ، ولكن نظرا لأنه طفل غير مرغوب فيه فإن أمه وأسرتها يهملون رعايته صحيا بعد الولادة فيصبح نهبا للأمراض وتزداد فرصة وفاته نتيجة الإهمال.

(٤) فقدان الرعاية العامة: هذا الطفل غالبا يفقد الرعاية والحنان والبيئة الصحية التي يجب أن توفر لكل طفل لأنه غير مرغوب فيه ، وأن الأم غالبا تكون صغيرة السن وتفتقد الخبرة الكافية ولا تجد العون من أهلها. كما إن هذا الطفل يفقد رعاية الأب له الذي يرفض الاعتراف به غالبا. المحصلة النهائية لكل ذلك تكون تنشئة طفل غير سوي نفسيا ، وقد يكون عنصر من عناصر الإجرام في المجتمع.

(٥) تعذيب واضطهاد الطفل: هذا الطفل الغير مرغوب فيه غالبا يكون عرضة للاضطهاد والتتعذيب من أسرة الأم أو الأم ذاتها لأنه جلب لهم العار والفضيحة. من المعروف أن اضطهاد الأطفال قد يكون بدني أو نفسي أو جنسي.

تشير الدراسات الأمريكية أن اضطهاد الأطفال الغير مرغوب فيهم في أمريكا تبلغ حوالي ١١%. نحن نعتقد أن تلك النسبة في مصر والدول العربية تزيد عن ذلك كثيرا.

(٦) فقدان الرعاية التعليمية: هذا الطفل الغير مرغوب فيه غالبا لا يجد أي عون دراسي من أمه أو من أهلها ، وبالتالي فهو غالبا يرسب في دراسته ويتحول للعمل وهو صغير ويخوض كل تجارب التدخين والإدمان والشذوذ الجنسي والمشاكل النفسية بمفرده وهو في هذه السن الصغيرة ولا يستطيع أن يحمي نفسه أو يجد من يحميه.

### ثالثاً: تأثير الحمل الغير مرغوب فيه على المجتمع

يدفع المجتمع ثمن باهظ نتيجة الحمل الناتج عن الممارسات الجنسية الغير شرعية وتمثل في:-

(١) زيادة معدل القضايا المرفوعة في المحاكم لإثبات الحمل ثم لإثبات النسب.

(٢) زيادة معدل الجرائم في المجتمع مثل قتل بعض المواليد أو قتل الفتاة الحامل أو قتل الشاب علي يد أهل الفتاة الحامل انتقاما منه. تزداد معدل الجرائم أيضا لوجود أشخاص غير أسواء في المجتمع مثل الطفل اللقيط وأمه الفاقدة للثقة في الرجال والمجتمع الذي لم ينصفها علي حسب رأيها.

(٣) زيادة عدد اللقطاء الذين يحتاجوا إلي دور لإيوائهم ورعايتهم صحيا واجتماعيا ودراسيا حتى الانتهاء من الجامعة.

(٤) زيادة عدد المتربيين من التعليم ، وارتفاع نسبة أطفال الشوارع وتعاطي المخدرات وتحولهم لأشخاص سلبيين غير منتجين في المجتمع.

(١) لحل أي مشكلة يجب معرفة حجمها وأبعادها والاعتراف بوجودها أولاً. إن مواجهة الحقائق والأرقام هو بداية طريق العلاج.

### (٢) العودة للدين عن طريق:-

\* زيادة الجرعة الدينية بالمدارس والجامعات ودور العبادة.

\* اختيار دعاء يعيشون مشاكل العصر الحديث وإطلاعهم على كافة مشاكل المجتمع حتى لا يكونوا في واد المجتمع في واد آخر.

إن الإسلام أراد للمرأة الصون والعفاف والعزّة حيث حرم على غير الزوج أن يمسها أو أن يخلو بها أو ينظر إليها ، وأمرها أن تستر جسدها بزي ساتر كما ورد في الآية ٣١ من سورة النور حيث قال الحق سبحانه وتعالى ((وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبواء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهم أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتبوا إلى الله جميعاً أئم المؤمنون لعلكم تفلحون)). وكذلك قوله تبارك وتعالى في الآية ٥٩ من سورة الأحزاب ((يأيها النبي قل لأزواجك وبنائك ونساء المؤمنين يذين عليهن من جلبيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً)).

حرم الإسلام الاختلاط بين المرأة والرجل إلا بعد زواج شرعى ، كما حرم أي اختلاط جنسي بين المرأة والرجل بدون زواج شرعى حيث قال الحق سبحانه وتعالى في الآية ٣٢ من سورة الإسراء ((ولا تقربوا الزنى

إنه كان فاحشة وساء سبيلاً). في هذه الآية يتضح أن الحق سبحانه وتعالى طلب منا الأخذ بمبدأ الوقاية خير من العلاج حيث قال تعالى ولا تقربوا الزنى ولم يقل سبحانه لا تزنيوا. إن العودة لمبادئ الدين ستقلل الاختلاط الغير شرعي وتقلل العبث بين الفتيات والشباب ، وبالتالي نقل توابع الممارسات الجنسية الغير شرعية.

يقول الكاهن جيري فولول (١٩٨١م) في كتابه أسمعي يا أمريكا (الذي إحصاءات مرعبة عن حوادث الطلاق ، وتدمير الأسرة ، والإجهاض ، وجنوح الناشئة ، والفووضى الجنسية ، وتعاطي المخدرات ، وجرائم القتل. إنني أشاهد حطام الإنسان والأرواح المهدرة التي تفوق الإحصاءات. إن أمريكا بحاجة سريعة إلى الإنقاذ الروحي والأخلاقي إذا كانت تريد أن لا تهلك في القرن القادم).

### (٣) تفعيل دور الأسرة

الأسرة هي اللبنة الأولى في علاقة الفرد بالحياة الاجتماعية ، وخط الدفاع الأول ضد الانحراف. إن معظم الممارسات الجنسية الغير شرعية تتم في مرحلة المراهقة التي لا يزال فيها المراهقون والمرأة تحت سيطرة الأسرة. إن الأبناء في حاجة ماسة إلى الارتباط الأسري والاتصال الحقيقي المباشر مع الوالدين والتحدث معهم عن الحب والجنس والعلاقات الجنسية. الأبناء لديهم أسئلة كثيرة عن الحب والجنس ، وإذا لم يحصلوا على إجابة لها من الأهل والمدرسة بطريقة علمية صحيحة قد يحصلوا عليها بطريقة خاطئة شاذة من الزملاء والأصدقاء.

لابد من احترام عقلية الأبناء وعدم التعامل معهم بسذاجة وسطحية.  
 علينا دائمًا أن ننكر أن الأبناء في حاجة للمشورة والدعم والصراحة ،  
 ولكنهم ليسوا في حاجة لمحاضرات أو تهديد.

يفضل اختيار الوقت المناسب لبدء المناقشة مع الأبناء مثلّ بعد مشاهدة فيلم أو موضوع مماثل بفيلم يعرض بالتليفزيون. يتم الحوار بين الطرفين (الأباء والأبناء) بطريقة مفتوحة وأمينة ومحترمة. تصحح معلومات الأبناء الخاطئة بطريقة سلسلة وكلمات مباشرة. تبدأ الحوارات مع الأبناء قبل سن البلوغ وتستمر خلال فترة المراهقة حتى سن الرشد.

دائماً يجب مراقبة تصرفات الأبناء دون أن يشعرون بذلك. لابد من معرفة أصدقائهم جيداً ومعرفة أسرهم لتحديد ما إذا كانوا من وسط جيد مناسب أم هم بذرة للأصدقاء السوء. كذلك يجب متابعة ما يشاهده الأبناء من برامج تلفزيونية وأفلام فيديو ومواقع الانترنت والمجلات متابعة دقيقة دون أن يشعرون بالمرأبة. إذا لاحظ الأبوين خروج الأبن عن الخط الطبيعي في ذلك يجب مناقشته وتوجيهه ومنعه من مشاهدة البرامج الغير لائقة للسن. بالطبع لن نستطيع منع ذلك مائة بالمائة ولكن يمكن تقليل ذلك. لقد أثبتت الدراسات التي أجرتها كينكل وآخرون (1999م) أن مشاهدة الأبناء للبرامج والأفلام التي تحتوي على إثارة جنسية مكثفة هي من أهم الأسباب التي تؤدي إلى سقوط الأبناء في الممارسات الجنسية الغير شرعية.

متابعة المستوى الدراسي للأبناء عن كثب يعتبر مؤشر جيد عن حالة الأبناء. إن هبوط معدل درجات الأبناء هو أول مؤشر لوجود خطأ ما عند الأبناء والذي قد يعني أصدقاء السوء والتدخين وتعاطي المخدرات

والدخول في مغامرة عاطفية أو إقامة علاقات جنسية غير مشروعة. لذلك لابد من وجود علاقة جيدة بين الآباء والمدرسة بحيث يمكن تدرك أي تغير يحدث في سلوك أو تصرفات الأبناء مبكرا.

أي إننا دائماً في حاجة للحوار مع الأبناء لنغطي على التأثير السيئ البعض الأصدقاء والزملاء. إن صداقه الأبناء تتبع شبح الكثير من المعاناة التي قد يتعرض لها الأبناء إذا تركناهم يحصلوا على معلوماتهم من الشارع والأصدقاء والتليفزيون والأفلام.

#### (٤) تفعيل دور الميديا الإعلامية

استخدام الميديا الإعلامية مثل التليفزيون في استضافة الفتيات التي تعرضت لمشاكل العلاقات الجنسية الغير شرعية مثل الحمل وإثبات النسب (بالطبع مع مراعاة إخفاء معالم الوجه حفاظاً على خصوصية الفتاة). إن وسائل الإعلام مطالبة بتأصيل القيم الأخلاقية والبعد عن كل ما فيه إثارة جنسية للشباب.

في النهاية فإنني لا أجد جهة واحدة قادرة بمفردها على حل تلك المشكلة. إن المشكلة كبيرة وتحتاج إلى تضافر جهود الآباء ، ودور العبادة ، والمدارس والجامعات والميديا الإعلامية والجمعيات الأهلية. يجب أن نسلط الضوء على المشكلة بكل وضوح وبدون خجل ، وأن نجعل التوعية هي الأساس للقضاء على هذه الظاهرة المفجعة.

سنتابع بمشيئة الله في الفصول التالية توابع الممارسات الجنسية الغير

شرعية وهي:-

\* الحمل.

\* الإجهاض.

- \* الولادة (الوضع).
- \* قتل المواليد.
- \* جرائم الشرف.
- \* إثبات النسب.
- \* الأطفال اللقطاء.

**الفصل الثاني**

**الحمل**



## الفصل الثاني

### الحمل

#### مراحل الخلق في القرآن الكريم

قال تعالى في الآية ٥ بسورة الحج ((يا أيها الناس إن كنتم في ريب منبعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مختلفة وغير مخلقة لنبين لكم ونفر في الأرحام ما شاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يُرَدُّ إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً)). وكذلك قال سبحانه وتعالى في الآية ٤ من سورة المؤمنون ((ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين)). ولو تأملنا مراحل الخلق الواردة بهذه الآيات لوجدناها:-

#### أولاً:- مرحلة التراب ((إنا خلقناكم من تراب))

تناول القرآن الكريم الحقائق العلمية عن أصل بداية خلق آدم من التراب والماء والطين وسلالة من الطين كما ورد في الآيات التالية:-

(١) من تراب: قال تعالى ((ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون)) ، سورة الروم (آية ٢٠).

(٢) من ماء: قال تعالى ((وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربكم قديراً)) ، سورة الفرقان (آية ٥٤).

(٣) من طين: من المعروف أن الطين مكون من التراب والماء. قال تعالى ((وإذ قال ربكم للملائكة إني خالق بشراً من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين)) سورة ص (آية ٧١).

(٤) من سلالة من طين: أي خلاصة من الأرض. قال تعالى ((ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين))، سورة المؤمنون (آية ١٢).

هذه الآيات تذكر أن بداية خلق الإنسان (آدم عليه السلام) كانت من طينة هذه الأرض وخلاصتها. ولقد أثبت العلم الحديث أن جسم الإنسان مكون من حوالي ٢٣ عنصراً من عناصر الأرض ، وهي كما يلي : \* الأوكسجين والهيدروجين: هما مكونات الماء الذي يشكل حوالي ٧٠% من جسم الإنسان.

\* الكربون والنتروجين ، وهذه العناصر الأربع (أي الأوكسجين والهيدروجين والكربون والنتروجين) تشكل أساس المواد العضوية (السكريات ، البروتينات ، الدهون ، الفيتامينات ، الهرمونات ، والخمانز أو الإنزيمات).

\* الكلور والكبريت والفوسفور والمنجنيز والكلاسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والحديد والمناس والليود والماغنسيوم والكوبالت والزنك والموليبيديوم والفلور والألومنيوم والبور والسيلينيوم والكامديوم.

#### ثانياً: مرحلة النطفة ((ثم من نطفة))

النطفة هي الحيوان المنوي الموجود بالمني الذي يقذفه الرجل. يقذف الرجل ربع إلى نصف مليار حيوان منوي في الجماع الواحد (شكل ١) ، ويحدث الحمل من حيوان منوي واحد (شكل ٢). هذا مصداقاً لقوله تعالى في الآية ١٧ من سورة القيامة ((ألم يكُن نطفةً من منيٍّ يُمنى)). أي إن نطفة واحدة من نصف مليار نطفة (منيٌّ يُمنى) هي المسئولة عن تكوين الإنسان. بعد النقاء النطفة القائمة من الأب مع البويضة القادمة من الأم ، تتشكل النطفة الأمشاج أو ما يسمى البويضة الملقة (zygot) ، والتي

تحمل عدداً كاملاً من الكروموزومات ، نصفها قادم من الأب ، والنصف الآخر قادم من الأم ، فتعطي خصائص جديدة لمولود جديد.

### ثالثاً: مرحلة العلقة (( ثم خلقنا النطفة علقة ))

بعد التحام النطفة بالبويضة ، تتكون النطفة الأمشاج ، ثم تنقسم (شكل ٣) وتنتجه لتجويف الرحم ، فتصله في غضون (١٠-٥) أيام من بدء التفريح ، ثم تلتصق بالجدار الداخلي لتجويف الرحم وهو ما يسمى العلقة كما ورد بالقرآن ، ويعرف طيباً بالأغراض أو الالتحام.

### رابعاً : مرحلة المضفة (( ثم من مضفة مخلقة وغير مخلقة ))

بعد أن يعلق محصول الحمل في جدار الرحم تبدأ مرحلة المضفة ، وهي تتكون من:-

(١) المضفة غير المخلقة: وهي التي لم تتمايز خلاياها بعد.

(٢) المضفة المخلقة: وهي مرحلة التخلق ، أو التمايز (Differentiation) ، حيث تتشكل الأعضاء والأجهزة من خلال ثلاثة طبقات جنينية هي :

(أ) الطبقة الخارجية (Ectoderm): تعطي النسيج العصبي ، والجلد بمكوناته ، وعدسة وقرنية العين وتجويف الأنف ، وغيره.

(ب) الطبقة المتوسطة (Mesoderm): تعطي الهيكل العظمي عظام الوجه ، والعضلات ، والجهاز الدوري والقلب ، والجهاز البولي والتناسلي .

(ج) الطبقة الداخلية (Endoderm): تعطي الجهاز الهضمي والغدد الملحقة به ، والجهاز التنفسى.

## خامسًا: مرحلة نفح الروح (( ثم أشئاه خلقا آخر ))

تنتهي عملية التخلق في الشهر الرابع ، حيث تبدأ مرحلة نفح الروح . روى البخاري ومسلم عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن أحدهم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل إليه الملك ، فينفح فيه الروح ، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه ، وأجله ، وعمله ، وشقى أم سعيد)).

سادساً: القرار المكين (( ونُقرُّ في الأرحام ما نشاء إلى أجلٍ مسمى ))  
خلق الله للمرأة الرحم ليكون مأوي الجنين ، وهياً لهذا الظروف المناسبة حتى ينمو وهو ينعم بكل وسائل الراحة والأمان والاستقرار التي تتضح على هيئة:-

### (أ) مكان الرحم يوفر الحماية للجنين:-

يقع الرحم داخل الحوض ويحيط به جدار عظمي متين جداً يتمثل في عظم العانة من الأمام ، والعجز والعصعص من الخلف والعظم الحرقفي من الجانبيين. هذا التكوين العظمي المتين والوضع التشريحي يحمي الرحم من الرضوض والصدمات الخارجية ، ويؤمن ولادة سهلة للجنين ، ولا يعيق مروره من خلالها. كذلك يتم تثبيت الرحم في مكانه بمجموعة أربطة مرنة تتصل بهذه بالعظام المحيطة بالرحم.

### (ب) تأثير الهرمونات الأنثوية على الرحم:-

تسيدر على الرحم هرمونات تؤمن له النمو ، والتوازن في الانقباض والانبساط. بعد خروج البويضة الناضجة من المبيض ، يتشكل مكانها بالمبيض جسم يسمى الجسم الأصفر (Corpus luteum) ، فإذا حدث التلقيح

بين النطفة والبويضة وتشكلت النطفة الأمشاج ، يقوم هذا الجسم الأصفر بإفراز هرمون يسمى هرمون استروجين (Ostrogen) ، الذي يؤدي إلى نمو الرحم وزيادة سمكاه جدره وزيادة التروية الدموية فيه ، وذلك لاستقبال النطفة الملقحة القادمة من قناة فالوب. ترسل النطفة الملقحة بعد إنغراسها في جدار الرحم إشارة هرمونية تسمى جونادوتروفين (Gonadotrophin) إلى المبيض لتحثه على إيقاع الجسم الأصفر فاعلاً حتى تقوم المسئمة بدوره الهرموني فيستمر المبيض في إفراز هرموني استروجين وبروجيسترول (Progesterone). وبالتالي يوجد توازن هرموني ثلاثي من استروجين وبروجيسترول وجونادوتروفين يكون مسؤولاً عن إيقاع الحمل ونموه.

#### سابعاً: ثم السبيل يسره (ثم نخرجكم طفلاً)

بعد حوالي أربعين أسبوعاً يصبح الجنين مؤهلاً للحياة معتمداً على ذاته. تبدأ عملية الولادة على شكل تقلصات تؤدي في النهاية إلى قصر عنق الرحم وكبر فتحته ليخرج الجنين إلى الحياة.

#### الجهاز التناسلي للأنثى

قبل أن نتكلم عن الحمل سنلقي نظرة سريعة على التركيب التشريحي وبعض التغيرات الفسيولوجية المصاحبة للتبويب والحمل. يتكون الجهاز التناسلي للأنثى (شكل ٤) من أعضاء خارجية وأعضاء داخلية.

#### أولاً: الأعضاء الخارجية

تتكون الأعضاء الخارجية للأنثى (شكل ٥) من قمة العانة (جبال الزهراء) ، والشفران الغليظان (Labia Majora) ، والشفران الصغيران ، والبظر (Clitoris) ، وغشاء البكارة (Labia Minora)

وغدة بارثولين (Bartholin Gland) ، وفتحة القناة البولية. يقع جبل الزهراء فوق الإرتقاق العاني مباشرة. يمتد الشفران الغليظان من جبل الزهراء على جنبي فتحة المهبل للخلف بطول حوالي ٨ سنتيمتر وعرض كلاً منها حوالي ٢,٥ سنتيمتر وهما يغطيان فتحة المهبل بالكامل عند الفتاة البكر، ولكنهما يتبعادا عن بعضهما البعض من تكرار الممارسة الجنسية والولادة. الشفران الصغيران عبارة عن ثنيتين يقعان مخفيتين بين الشفرين الغليظين طول كلاً منها ٣ – ٥ سنتيمتر وتوجد عند التقائهما بالخلف ثنية مستعرضة تسمى الشوكة. يقع البظر بمقدم الفرج عند ملتقى أمامية الشفرين الغليظين.

#### ثانياً: الأعضاء الداخلية

ت تكون الأعضاء الداخلية للأنثى من المهبل والرحم والمبيضين وقناة فالوب (شكل ٦).

##### (أ) المهبل (Vagina)


عبارة عن ممر أنبوبي يمتد من الشفرين الصغيرين حتى يتصل بعنق الرحم وطول جداره الأمامي حوالي ٨ سم وطول جداره الخلفي حوالي ١٠ سم. الغشاء المبطن بالمهبل به ثنيات واضحة تزول بتكرار الجماع الجنسي.

##### (ب) الرحم (Uterus)

الرحم عضو عضلي مجوف كمثري الشكل في ثلثيه العلوين وأسطواني في ثلثه الأسفل ، يبلغ طوله حوالي ٧,٥ سم وعرضه ٥ سم وسمكه ٣ سم للمرأة التي لم يسبق لها الحمل. هذا القوام العضلي المتماسك

شكل (١) →

حيوانات منوية عديدة تحيط بالبويضة



← شكل (٢)


حيوان منوي واحد ينجح في اختراق البويضة



شكل (٣) →


إنقسام البويضة الملقحة






**شكل (٥)**  
الأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى

**شكل (٤)**  
مقطع طولي يوضح الجهاز التناسلي للأنثى



**شكل (٧)**  
مقطع طولي يظهر علاقة عنق الرحم  
بتجويف الرحم والمهبل



**شكل (٦)**  
الأعضاء التناسلية الداخلية للأنثى

للرحم يجعله عند انقباضه يدفع بمحتواه نحو عنق الرحم ، سواء كان هذا المحتوى هو الحمل أو دم الحيض.

يتكون الرحم من جزئين هما عنق الرحم (الجزء السفلي) وجسم الرحم (الجزء العلوي). عنق الرحم عبارة عن فناء (شكل ٧) تصل بين المهبل وتجويف الرحم وله فتحتين: فتحة علوية تتصل بتجويف الرحم ، وفتحة سفلية تتصل بتجويف المهبل. طول الجزء المهبل للعنق حوالي ٣ سم.

يتكون جدار الرحم من ثلاثة طبقات: طبقة خارجية رقيقة مكونة من مادة بريتونية ، وطبقة وسطي سميكة عضلية في ثلاثة طبقات ، وطبقة داخلية غشائية إسفنجية هشة تتغير في السمك حسب مراحل دورة الطمث لتأثرها بإفراز الهرمونات الأنثوية. إذا لم يحدث حمل تنفصل الطبقة السطحية من هذه البطانة وتسقط على هيئة دم الحيض. أما الطبقة العميقة الداخلية فتتجدد زیادتها في السمك مع دخول دورة شهرية تالية.

يحاط عنق الرحم والجزء العلوي من المهبل بنسيج خلوي ضام يربط الرحم بالمثانة والمهبل ، وكذلك يثبت الرحم في موضعه مجموعة من الأربطة تسمح له بالزيادة التدريجية أثناء الحمل ليتضاعف حجم الرحم إلى حوالي ثلاثة آلاف ضعف في نهاية الحمل. كذلك يرتبط الرحم بعضلات الحوض والعجان التي تزيد من درجة ثباته. يحمي الرحم عظام الحوض من الخلف وتحيط به الأمعاء من كافة الاتجاهات. في معظم السيدات ينحني الرحم للأمام ليستند على المثانة ، ولكن في حوالي ١٥% من السيدات ينقلب الرحم للخلف.

## (ج) قناتا فالوب (Fallopian tubes)

يخرج من جانبي الرحم العظيين الوحشيين قناتين طول كلاً منها يتراوح ما بين ١٠ إلى ١٥ سم ، وقطرها الداخلي يتراوح ما بين ٦ إلى ٨ مم. تتجه واحدة لليمين والأخرى لليسار وتمثلا قناتي اتصال بين جسم الرحم والبويضين. تنتهي قناة فالوب بأهداب تماثل الأصابع تغطي الجزء الأكبر من المبيض. يبطن القناتين نسيج ذو أهداب ينقل الحيوانات المنوية من الرحم لوحشية القناة ، وينقل بعد ذلك البو胥ة الملقة بالاتجاه المعاكس. تقوم قناتا فالوب بوظائف رئيسية في الحمل فهي تلتقط البو胥ة فور خروجها من المبيض وتبقّيها بالجزء الوحشي بها ، وتسهل حركة الحيوان المنوي في اتجاه البو胥ة ، وتهيأ المكان المناسب لإخصاب البو胥ة بالحيوان المنوي ، ثم تدفع البو胥ة الملقة للرحم.


## (د) المبيضان (Ovaries)

يشتمل الجهاز التناسلي للمرأة على مبيضين (أيمن وأيسر) يقعان على جهتي قناة فالوب. يتكون كل منهما من القشرة الخارجية التي تحتوي على البو胥ات وجزء داخلي يسمى Medulla ، وبينهما توجد الأوعية الدموية والأعصاب. أبعاد المبيض حوالي  $1 \times 2,5 \times 3,5$  سم ، وسطحه مدبب وعليه عدة نتوءات. يضم المبيض عدداً مختلفاً من الجرثومات الأولية تختلف من امرأة لأخرى وتختلف في نفس المرأة باختلاف المرحلة العمرية وتتراوح من حوالي ٣٠٠ ألف إلى ٤٠٠ ألف جرثيم عند البلوغ. في كل دورة حيض شهرية تتنقى حوالي عشرة جرثومات أولية تقريباً ولكن واحدة أو اثنين منهم تصل لمرحلة النضوج وتصبح بويضة قابلة للتلقيح. بعد أن يُطلق الجرثيم الناضج بويضته يتحول إلى الجسم الأصفر. أي إن المبيض

## دورة الحيض للأنثى

days

1 28




شكل (٨)

بداية تكوين بطانة الرحم  
بعد نزول دم الحيض  
وببداية ظهور البويضة في  
المبيض

## دورة الحيض للأنثى

days

1 28



زيادة سمك بطانة  
الرحم


شكل (٩)

زيادة سمك بطانة الرحم  
ووجود البويضة داخل  
المبيض

## دورة الحيض للأنثى

شكل (١٠)


عملية التبويض وخروج  
البويضة إلى أنبوبة  
فالوب في إنتظار الحيوان  
الذو للتقيحها



## دورة الحيض للأنثى

شكل (١١)

ضمور البويضة الغير  
ملقحة مع زيادة سمك  
بطانة الرحم



هو العضو المسؤول عن إنتاج البويضات ، وإنما الهرمونات الأنثوية الضرورية (استروجين وبروجيسترون) لإعطاء السيدة الشكل الأنثوي وتمكينها من القيام بدورها في العملية التناضلية.

### التغيرات الفسيولوجية لدورة الحيض الشهرية

تحسب بدأة دورة الحيض الشهرية من اليوم الأول لنزول دم الحيض. في بداية الدورة يكون تركيز هرمون استروجين منخفضاً كثيراً فيفرز هرمون جونادوتروفين من الهيبوفالامس ليحفز دوره إفراز هرموني LH & FSH. يقوم هرموني LH & FSH بتحفيز المبيض لإنجاح البويضات فتتجدد البويضات (شكل ٨). البويضة الناجحة تفرز هرمون استروجين فيرتفع تركيزه في الدم تدريجياً ، مما يساعد على نضوج البويضة أكثر ، وكذلك يساعد على نمو بطانة الرحم (شكل ٩). مع استمرار ارتفاع نسبة تركيز هرمون استروجين يحدث أيضاً ارتفاع مفاجئ في نسبة تركيز هرمون LH في اليوم ١٢ من الدورة المنتظمة ، وهو ما يساعد على النضوج النهائي للبويضة داخل الحويصلة الكبيرة. بعد ٣٦ ساعة من هذا الارتفاع المفاجئ لهرمون LH يحدث التبويض في اليوم ١٤ من الدورة (شكل ١٠). بعد خروج البويضة تتكمل الحويصلة التي كانت تحوي هذه البويضة لتكوين الجسم الأصفر (Corpus Luteum) في الجزء الخارجي للمبيض الذي يفرز هرمون بروجيسترون وكمية صغيرة من هرمون استروجين. إفراز هرموني استروجين وبروجيسترون معاً يرتبط إفراز هرموني LH & FSH من الغدة النخامية بعد التبويض. إذا تم تلقيح البويضة يستمر الجسم الأصفر في النمو في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل لإفراز هرموني استروجين وبروجيسترون لتحضير بطانة الرحم

لاستقبال البوبيضة الملقحة وغرس الجنين بجدار الرحم. بعد الشهر الثالث للحمل يختفي الجسم الأصفر وتبدأ المشيمة بإنفراز هرموني استروجين وبروجسترون بدلاً من الجسم الأصفر. أما إذا لم يحدث الحمل تضمر البوبيضة (شكل ١١) ثم يضمر الجسم الأصفر (شكل ١٢) بعد ١٠—١٢ يوم من التبويض (شكل ١٣) وبالتالي نقل نسبة تركيز هرموني استروجين وبروجسترون ، وتبدأ بطانة الرحم في الانفصال وينزل دم الحيض الشهري (شكل ١٤). إن هبوط نسبة هرموني استروجين وبروجسترون يؤدي إلى ارتفاع نسبة هرمون جونادوتروفين وتبدأ دورة شهرية جديدة.

### التعريف الطبي للحمل

ينتج المبيض البوبيضات بالمرأة بعد سن البلوغ ( حوالي ١٢—١٤ سنة) ويستمر في إنتاج البوبيضات حتى انقطاع الطمث ( حوالي ٤٥—٥٠ سنة). ينتج مبيض المرأة في كل دورة حIGINية بوبيضة ( الدورة الحIGINية في معظم السيدات حوالي ٢٨ يوم). هذه البوبيضة تعيش حوالي ٤٨ ساعة فإذا وصل إليها حيوان منوي من ماء الرجل نتيجة الجماع الجنسي يحدث الحمل. يحدث الحمل بتلقيح بوبيضة المرأة بحيوان منوي ذكري في الجزء الخارجي من قناة فالوب (شكل ١٥) ثم تتحرك البوبيضة الملقحة بفعل حركة قناة فالوب وتستقر هذه البوبيضة الملقحة في الرحم. لتوضيح ما سبق سنحاول إعادة صياغة هذه المعلومات على هيئة سؤال وجواب:-

س: هل يمكن أن تحمل فتاة قبل بلوغها أو تحمل امرأة بعد سن اليأس ؟  
ج: لا يمكن حدوث الحمل قبل سن البلوغ أو بعد سن اليأس نظراً لعدم وجود بوبيضة يمكن تلقيحها عند هذه الفتاة أو المرأة. عند ولادة طفلة أنثى يحتوي المبيضان بجسدها على حوالي ٢ مليون بوبيضة. تبقى البوبيضات

كامنة لحين سن البلوغ وتضمر أغلبها ويتناقص عددها إلى حوالي ٤٠٠ ألف بويضة عند البلوغ. تستمر عملية ضمور البوopies طوال حياة المرأة أثناء الحمل وأثناء الدورة الشهرية. في كل دورة شهرية تنمو حوالي ٢٠ بويضة ولكن بويضة واحدة فقط منهم تصل إلى مرحلة النضوج وتتلاشى باقي البوopies. تضمر البوopies لعوامل كثيرة منها الجينات الوراثية أو الظروف البيئية (مثل الإشعاع ، التدخين ، وبعض الأدوية). لهذا يختلف سن اليأس من امرأة لأخرى حيث تبلغ المرأة سن اليأس عند ضمور جميع البوopies.

**س: هل يمكن أن يحدث الحمل عند جماع المرأة في أي وقت من الدورة الح惺ية؟**

ج: يحدث الحمل فقط في فترة وجود البويضة ، وعادة ينبع المبيض بويضة في منتصف الدورة الح惺ية. إذا تمت المعاشرة الجنسية يقذف السائل المنوي داخل قناة المهبل وتطلق ملايين الحيوانات المنوية داخل عنق الرحم ثم إلى تحريف الرحم وتصلأخيرا إلى قناة فالوب حيث يلتقي حيوان منوي واحد بالبويضة ويخصبها.

**س: ما هو الوقت الذي يستغرقه الحيوان المنوي للصعود إلى قناة فالوب للبحث عن البويضة؟**

ج: عند القذف يكون السائل المنوي لزجاً ثم يتحول إلى سائل في المهبل في خلال ٣٠-٢٠ دقيقة. بعد ذلك يخترق الحيوان المنوي المادة المخاطية في عنق الرحم في خلال دقيقتين. يتحرك الحيوان المنوي بواسطة الذيل للأمام بسرعة ليصل بعد حوالي ساعة من الجماع إلى مكان التلقيح بقناة فالوب عابراً عدة سنتيمترات من القنوات ومتجاوزاً عدة حواجز.

س: كيف يمكن حساب الدورة الحيضية للمرأة ؟

ج: تحسب الدورة الحيضية للمرأة من اليوم الأول لنزول دم الحيض (الدورة الشهرية) ، وليس بعد اختفاء دم الحيض (كما يعتقد البعض) ، وبالتالي يكون اليوم الرابع عشر هو اليوم المتوقع لظهور البوياضة.

س: لماذا ينزل دم الحيض ؟

ج: إذا لم تلقي البوياضة بحيوان منوي فإن الغشاء المبطن للرحم يسقط ومعه البوياضة من الرحم ويخرج من الفرج على هيئة دم الحيض (الطمث).

س: هل يشترط لحدوث الحمل أن يتم الجماع الجنسي بعد خروج البوياضة مباشرة ؟

ج: لا يشترط ذلك حيث تشير الدراسات إلى أن الحيوانات المنوية الناتجة من جماع حدث قبل خروج البوياضة بثلاثة أو أربعة أيام قد تستطيع إحداث الحمل بالبوياضة عند إنتاجها من المبيض إذا لم تكن المرأة قامت بتشطيف المنطقة التناسلية والقضاء على الحيوانات المنوية.

س: هل يمكن حدوث الحمل إذا حدث الجماع أثناء نزول دم من الفرج ؟

ج: يمكن حدوث الحمل إذا حدث الجماع أثناء نزول دم من فرج الفتاة بسبب من السببين التاليين:-

(1) ليس كل الدم النازل من فرج الفتاة هو دم حيض. أحياناً تنزل كمية قليلة من الدماء من المهبل وقت التبويض. أثناء التبويض تتطلق البوياضة من أحد المبيضين خلال قناة فالوب لتسقى في الرحم وقد يصاحب ذلك نزول بعض الدماء. تكون فرصة حدوث الحمل في تلك الحالة في أعلى مستوياتها نظراً لوجود البوياضة القابلة للتلقيح من الحيوان المنوي.

(٢) التبويض عادة يحدث في منتصف دورة الحيض ، لكن في حالات قليلة قد يحدث التبويض قبل توقف دم الحيض أو يحدث في خلال بضعة أيام من توقف نزول دم الحيض (أي بعد طهارة الفتاة من دم الحيض). الحيوان المنوي قادر على تلقيح البويضة في خلال ثلاثة أيام من القذف (أي من الجماع) ، ولذلك إذا حدث الجماع أثناء نزول دم الحيض في هذه الحالات الاستثنائية القليلة قد يحدث الحمل.

س: كيف يحدث الحمل خارج الرحم ؟

ج: أحيانا لا تغادر البويضة الملقحة قناة فالوب إلى تجويف الرحم حيث تلتصل بجدار قناة فالوب وتنمو وتكبر إلى أقصى درجة تسمح به تمدد قناة فالوب ، ثم تنفجر قناة فالوب وتخرج البويضة الملقحة إلى تجويف البطن محدثة نزيف وألم حاد بالبطن تتطلب التداخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة تلك المرأة الحامل.

س: كيف يحدث حمل التوأم ؟

ج: التوأم نوعان وهما:-

(١) التوأم المتماثلة Identical twins

ينتج هذا التوأم من بويضة واحدة تم تلقيحها بحيوان منوي واحد ، ولكن تنقسم البويضة الملقحة مبكرا إلى قسمين أو أكثر بحيث ينموا كل جزء مستقل كأنه بويضة مستقلة. في هذه الحالة يكون التوأم له مشيمة واحدة وحبلين سريين منفصلين (شكل ١٦). هذا التوأم يكون من نفس النوع (ذكور أو إناث) ومتتشابهين تشابه كبير من حيث الملامح.

في كل دورة حيضة ينتج مبيض واحد بوبيضة واحدة يتم تلقيحها فيحدث الحمل. لكن أحياناً تنتج بوبيضة من كل مبيض من المبيضين في وقت واحد. في تلك الحالة قد يحدث تلقيح للبوبيضتين من حيوانين منويين منفصلين ، سواء كان ذلك من جماع جنسي واحد أو من أكثر من جماع جنسي واحد. في هذه الحالة يكون لكل جنين مشيمة مستقلة وحبل سري منفصل. هذا التوأم قد يكون من نفس الجنس أو لا يكون من نفس الجنس ، وقد يتشابهان أو يختلفان من حيث الملامح.

الخطورة القانونية لهذا النوع من التوأم الغير متطابقة هو إمكانية حدوثه من رجلين مختلفين جاماًعاً هذه المرأة جماع متعاقب (أي جماعين جنسين بينهما فارق زمني صغير فيتم تلقيح بوبيضة من حيوان منوي لأحد الرجلين ، وتلقيح البوبيضة الأخرى بحيوان منوي للرجل الآخر).

س: هل يمكن أن يخلق المولود من ماء منوي لرجلين ؟

ج: لا يمكن أن يخلق المولود من ماء منوي لرجلين لأن البوبيضة الواحدة لا يلقحها إلا حيوان منوي واحد ، حيث يمنع الجدار الشفاف المحيط بالبوبيضة دخول أي حيوانات منوية أخرى بعد اختراق البوبيضة بأول حيوان منوي.

### مدة الحمل

مدة الحمل يقصد بها المدة التي تمضي بين تلقيح الحيوان المنوي للبوبيضة حتى وضع الجنين.

اتفق معظم الفقهاء على أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر وذلك استناداً لما جاء بالقرآن الكريم حيث قال الله تعالى في الآية الخامسة عشر من

سورة الأحقاف (وحمله وفصاله ثلاثة شهراً) ، وكذلك قول الله تعالى في الآية ٢٣ من سورة البقرة (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة). أي إن الآيتين ذكرتا أن الحمل والفطام في ثلاثة شهر بينما الرضاعة في أربعة وعشرين شهر فيكون الفرق بينهما هو ستة أشهر وهي أقل مدة حمل.

من الناحية الطبية ثبت الآن إمكانية أن يحيا المولود عن ستة أشهر رحيمية بعد توفير الحضانات الازمة في الفترة الحرجة عقب الولادة. لكن العلماء والفقهاء اختلفوا كثيراً حول أطول مدة للحمل وكان سبب الخلاف هو إنجاب بعض السيدات كل أربع سنوات أو كل سنتين أو كل سنة أو كل تسعه شهور فاعتقدوا (حسب العلم الذي كان متاح لديهم في ذلك الوقت) أن السيدات ظلت تحمل الجنين في بطونها لمدة أربع سنوات أو سنتين أو سنة أو تسعه شهور ، ولذلك اختلفوا في تحديد أطول مدة للحمل فمنهم من ذهب إلى إنها أربع سنوات ومنهم من رأى أنها تصل إلى سنتين ومنهم من رأى أنها سنة واحدة ومنهم من ذكر إنها تسعه أشهر.

من الناحية العملية فإن مدة الحمل في المتوسط تكون حوالي عشر دورات حيضية (الدوره الحيضية حوالي ٢٨ يوم) أي حوالي ٢٨٠ يوم أو عشرة أشهر قمرية. أي بحساب ٢٨٠ يوم من موعد آخر طمت حدث للمرأة فيكون هو الموعد التقريبي للولادة. ذهب القانون المصري ومعظم قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية إلى أن أقل مدة حمل هي ستة أشهر وأن أطول مدة حمل هي ٣٦٥ يوم (عام كامل).

## الطب الشرعي والحمل

تعرض المرأة على الطبيب الشرعي لبيان ما إذا كانت حامل من عدمه ، وكذلك لتحديد مدة الحمل في الأحوال التالية:-

### (١) الاغتصاب

من المضاعفات المحتمل حدوثها للاعتداء الجنسي هو احتمال حدوث حمل للمغتصبة. إن احتمال حدوث الحمل من اعتداء جنسي عشوائي وحيد من جانبي لا يستعمل واقتصر ذكري يقدر بحوالي ٢ - ٤%. ترتفع النسبة إلى حوالي ١٠% إذا حدث الاغتصاب في فترة التبويض (من اليوم ١١ حتى اليوم ١٨ في المرأة التي تكون دورة حيضها ٢٨ يوم). وترتفع أيضاً نسبة حدوث الحمل لتصل إلى ٣٠% إذا حدث الاعتداء يوم التبويض.

### (٢) الميراث

قد تدعى الأرملة (المرأة التي مات زوجها) الحمل وذلك بهدف حصول مولودها على جزء من الميراث.

### (٣) الطلاق

قد تدعى المرأة المطلقة أنها حامل من زوجها الذي طلقها وذلك للحصول على نفقة للطفل.

### (٤) اتهام المرأة بالزننا

قد يغيب الرجل عن زوجته فترة طويلة لسفره بالخارج ويعود ليجد زوجته حملت أو أنجبت طفل فيتهمها بالزننا.

### (٥) الإعدام

لا ينفذ الإعدام في المرأة الحامل ، ولذلك قد تدعى المرأة أنها حامل لتأجيم تنفيذ حكم الإعدام. إذا ثبت أن هذه المرأة حامل فإن القانون يحتم

تأجيل تنفيذ حكم الإعدام لحين حدوث الولادة وإرضاع الطفل لمدة عامين ،  
ثم يتم بعد ذلك تنفيذ حكم الإعدام.

## (٦) حالات ارتباط المراهقين جنسياً

قد تحمل الفتاة من شاب يقيم معها علاقة جنسية بمحض إرادتها فيما يطلقون عليه الزواج العرفي أو ما شابهه ، ويرفض هذا الشاب الاعتراف بالحمل فتعرض الفتاة على الطب الشرعي لإثبات الحمل ومدته.

### تشخيص الحمل

البويضة المقحمة تغرس نفسها في الرحم مكونة كائن صغير جديد داخل الرحم فيحدث بالرحم والمرأة أعراض وعلامات للحمل.

### أعراض الحمل

#### (١) غثيان الصباح

تشعر الحامل بميل للغثيان وللقي غالباً في الصباح ، ولكنه قد يحدث في أي وقت من اليوم. يعتقد بأن سبب ذلك هو ارتفاع هرمون الحمل Human chorionic gonadotrophin في الدم ، والشد السريع بعضلات الرحم ، وزيادة حموضة المعدة ، وزيادة حاسة الشم.

يبدأ الغثيان في الظهور في الفترة من الأسبوع الثاني للأسبوع الثامن بعد حدوث الحمل. الغثيان لا يؤكد حدوث الحمل لأنه يحدث أيضاً في أحوال أخرى عديدة مثل:-

\* التسمم الغذائي.

\* الالتهابات.

\* أمراض المرارة.

\* أسباب أخرى عديدة.

## (٢) الرغبة الملحّة للأكل

تحدث نتيجة التغيير الهرموني بجسد الحامل ، وخاصة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. الرغبة الملحّة للأكل لا تؤكّد حدوث الحمل لأنّها تحدث أيضاً في أحوال أخرى عديدة مثل:-

\* نقص التغذية الجيدة.

\* الإجهاد والتوتر والقلق.

\* بداية نزول دم الدورة الحيضية.

## (٣) التبول المتكرر

يحدث نتيجة زيادة حجم سوائل الجسم وضغط الرحم المتضخم على المثانة. يبدأ التبول المتكرر في الظهور في الفترة من الأسبوع السادس للأسبوع الثامن بعد حدوث الحمل. هذا العرض لا يؤكّد حدوث الحمل لأنّه يحدث أيضاً في أحوال أخرى عديدة مثل:-

\* التهابات الجهاز البولي.

\* تعاطي العقاقير المدرة للبول.

\* مرض ارتفاع نسبة السكر في الدم.

\* تعاطي سوائل كثيرة.

## (٤) التعب والوهن

يحدث التعب والوهن نتيجة ارتفاع نسبة هرمون الحمل Human chorionic gonadotrophin في الدم وزيادة استخدام الجسم للطاقة بسبب نمو الجنين. عادة يبدأ الوهن في الشهور الثلاثة الأولى من الحمل. الوهن لا يؤكّد حدوث الحمل لأنّه يحدث أيضاً في أحوال أخرى عديدة مثل:-

\* الإجهاد والقلق والاكتئاب.

\* سوء التغذية.

\* الأنفلونزا ونزلات البرد.

\* عدم مزاولة الأنشطة الرياضية.

\* قلة عدد ساعات النوم.

### علامات الحمل

يقصد بعلامات الحمل المظاهر التي تحدث بجسد المرأة بعد حدوث الحمل. تقسم علامات الحمل إلى علامات ترجيحية وعلامات مؤكدة.  
أولاً: العلامات الترجيحية للحمل

هذه العلامات تعطي مؤشر لاحتمال حدوث الحمل ولكنها لا تؤكده حدوثه لكنها تحدث في أحوال أخرى للمرأة نتيجة بعض الأمراض العضوية أو النفسية.

#### (١) انقطاع الطمث

تحيض المرأة مرة كل حوالي ٢٨ يوم منذ البلوغ وحتى سن اليأس. ينقطع الطمث بعد حدوث الحمل وحتى الولادة. انقطاع الطمث لا يؤكّد حدوث الحمل لأنّه قد يحدث أيضاً في بعض الحالات التالية:-

\* الزيادة المفرطة أو فقد السريع لوزن الجسم.

\* اضطراب هرمونات الجسم.

\* التوتر والضغوط والإجهاد الشديد.

\* الرضاعة.

\* التوقف عن تعاطي أقراص أو حقن منع الحمل.

\* فقر الدم (الأنيميا).

أحياناً في حالات قليلة جداً قد تكون المرأة حامل ولا ينقطع الطمث في الأشهر الأولى من الحمل وهو ما يسمى الحمل الغزلاني.

## (٢) امتلاء الثديان والتوجع عند لمسهما Tender, swollen breasts

تحدث هذه التغيرات نتيجة زيادة كمية هرمونات الاستروجين (Estrogen) والبروجسترون (Progesterone). تتضح هذه التغيرات على هيئة كبر حجم الثديين وامتلاء أو عيدهما الدموية ، والتوجع عند لمس الثدي ، ونادراً ما تكون مصحوبة بآفرازات من حلمة الثدي. تبدأ هذه الأعراض في الظهور بعد أيام قليلة من حدوث الحمل. هذه العلامات لا تؤكّد حدوث الحمل لأنها قد تحدث أيضاً في بعض السيدات نتيجة:-

\* تعاطي أقراص منع الحمل.

\* بداية حدوث دورة الحيض.


\* بعض الحالات المرضية بالثدي مثل وجود أكياس ليفية.

## (٣) تغيرات بحلمة الثدي

تكبر حلمة الثدي في الحجم وتتحول للون الداكن وتصبح نتوءات مونتجمي أكثر وضوحاً وذلك نظراً لأن الثديين تتهيأ لإنتاج لبن الرضاعة. تحدث هذه العلامات تدريجياً في الأسبوع الأول من الحمل. عند عصر الثديين قد يخرج منها اللبأ (شكل ١٧) وهو سائل أصفر اللون وغالباً يحدث ذلك في نهاية الشهر الثالث من الحمل. هذه العلامات لا تؤكّد حدوث الحمل لأنها قد تحدث أيضاً في بعض السيدات نتيجة:-


\* اضطرابات الهرمونات.

\* تغيرات سن البلوغ.



شكل (١٢)

التغيرات الحادثة بالبويضة والجسم الأصفر من بداية دورة الحيض حتى نهايتها



شكل (١٣)

زيادة سمك بطانة  
الرحم وخلوه من  
الحمل

أحياناً في حالات قليلة جداً قد تكون المرأة حامل ولا ينقطع الطمث في الأشهر الأولى من الحمل وهو ما يسمى الحمل الغزلاني.

## (٢) امتلاء الثديان والتوجع عند لمسهما Tender, swollen breasts

تحدث هذه التغيرات نتيجة زيادة كمية هرمونات الاستروجين (Estrogen) والبروجسترون (Progesterone). تتضح هذه التغيرات على هيئة كبر حجم الثديين وامتلاء أو عيدهما الدموية ، والتوجع عند لمس الثدي ، ونادرًا ما تكون مصحوبة بإفرازات من حلمة الثدي. تبدأ هذه الأعراض في الظهور بعد أيام قليلة من حدوث الحمل. هذه العلامات لا تؤكّد حدوث الحمل لأنها قد تحدث أيضًا في بعض السيدات نتيجة:-

\* تعاطي أقراص منع الحمل.

\* بداية حدوث دورة الحيض.

\* بعض الحالات المرضية بالثدي مثل وجود أكياس ليفية.


## (٣) تغيرات بحلمة الثدي

تكبر حلمة الثدي في الحجم وتتحول للون الداكن وتصبح نتوءات مونتجمي أكثر وضوحاً وذلك نظراً لأن الثديين تتهيأ لإنتاج لبن الرضاعة. تحدث هذه العلامات تدريجياً في الأسابيع الأولى من الحمل.

عند عصر الثديين قد يخرج منها اللبأ (شكل ١٧) وهو سائل أصفر اللون وغالباً يحدث ذلك في نهاية الشهر الثالث من الحمل. هذه العلامات لا تؤكّد حدوث الحمل لأنها قد تحدث أيضًا في بعض السيدات نتيجة:-


\* اضطرابات الهرمونات.

\* تغيرات سن البلوغ.



شكل (١٢)


التحفيزات الحادثة بالبويضة والجسم الأنصاف من بداية دورة الحيض حتى نهايتها



شكل (١٣)

زيادة سمك بطانة  
الرحم وخلوه من  
الحمل

## دورة الحيض للأثني



شكل (١٤)

سقوط بطانة الرحم  
على هيئة دم الحيض  
في بداية دورة حيض  
جديدة للمرأة

الحيوانات المنوية

البويضة

المبيض

الرحم

شكل (١٥)

التقاء الحيوانات  
المنوية بالبويضة في  
أنبوبة فالوب

#### (٤) كبر حجم البطن

يُكبر حجم البطن نتيجةً لـ **كبر حجم الرحم** (شكل ١٨). يبدأ **كبر البطن** من منطقة الحوض ويزتفع تدريجياً لأعلى البطن حيث:-

- \* **يملاً الرحم** تجويف الحوض ويصل لحافة عظم العانة في الشهر الثالث للحمل.

- \* يُكبر الرحم ويصل لأعلى العانة في الشهر الرابع.
- \* يصل الرحم بين السرة والعانة في الشهر الخامس.
- \* يصل للسرة في الشهر السادس.
- \* يصل لأعلى السرة بحوالي ثلاثة أصابع في نهاية الشهر السابع.
- \* يصل للمسافة بين السرة والغضروف الخنجرى في نهاية الشهر الثامن.

- \* يصل للغضروف الخنجرى في نهاية الشهر التاسع.
- \* ينزل مرة أخرى للمسافة بين السرة والغضروف الخنجرى في نهاية الشهر العاشر.

#### (٥) تلون الجلد

- \* يتتحول لون جلد الفرج وغشاوته إلى اللون القاتم.
- \* تتكون حالات سمرة حول العينين وبالعنق (يسمى كلف الحمل).
- \* يظهر خط أسمراً يمتد من العانة إلى السرة (شكل ١٩).
- \* تظهر تلونات على هيئة خطوط حمراء اللون على جانبي البطن ثم يتتحول لونها إلى اللون الأبيض تسمى نقطاعات الحمل (شكل ٢٠).

## (٦) تغيرات المهبل

- \* يتغير لون الغشاء المخاطي المبطن للمهبل ويتحول من اللون الأحمر الوردي إلى اللون البنفسجي.
- \* تزداد افرازات المهبل.
- \* يلين عنق الرحم.
- \* تحس الحامل نبض بالمهبل نتيجة امتلاء الأوعية الدموية.

## ثانية: علامات الحمل المؤكدة

### (١) جس أجزاء الجنين

يمكن من خلال الفحص اليدوي لبطن الحامل جس أجزاء الجنين بعد الشهر الرابع. كذلك يمكن الإحساس بحركات الجنين بوضع اليد على بطن الحامل بعد الشهر الرابع أو بالنظر بالعين لحركات الجنين ببطن الحامل بعد الشهر الخامس.

### (٢) سماع نبض قلب الجنين

- \* يمكن سماع نبض قلب الجنين بعد ١٠ - ١٢ أسبوع من الحمل.
- \* تسمع أسفل السرة بمنتصف البطن في الشهر الخامس وال السادس.
- \* تسمع أعلى الخط الممتد من السرة إلى التنوء الشوكي الحرقفي الأمامي في الشهر السابع والثامن.
- \* يصل معدل نبض قلب الجنين نحو ١٣٠ نبضة في الدقيقة.

### (٣) الكشف بالموجات فوق الصوتية

من خلال الموجات فوق الصوتية يمكن تشخيص الحمل بعد ٤ - ٦ أسابيع من الحمل.


شكل (١٦) →

توأم متماثل به مشيمة واحدة  
وحبلين سريين (الحبل السرى الأيمن  
قطع بعد الولادة، والحبل السرى  
الأيسر مرتبط به جنين متوفى)



← شكل (١٧)


دكانة حلمة الثدي مع خروج اللبا  
(علامات الحمل)



شكل (١٨) →


رحم متوفاه به جنين في الشهر  
الثامن الرحمى (حدثت وفاة هذا  
الجنين نتيجة وفاة الأم)





شكل (١٩)

خط أسود رأسى على الخط المنصف للبطن (من علامات الحمل)



شكل (٢٠)

تقطيعات الحمل (من علامات الحمل)

(٤) اختبارات الحمل: تشمل:-

(أ) اختبار الحمل المنزلي Home pregnancy test

يمكن تشخيص الحمل من خلال هذا الاختبار بعد يوم واحد من امتناع نزول دورة الحيض (أي بعد حوالي ١٤ يوم من الحمل). هذا الاختبار يعتمد على وجود هرمون Human chorionic gonadotrophin (HCG) في البول ، وتحتاج النتيجة خلال ٥ دقائق.

(ب) اختبار الحمل المعملي Lab test

يمكن تشخيص الحمل من خلال هذا الاختبار بعد مرور حوالي ١٠ أيام من الحمل (أي مبكراً أربعة أيام عن التحليل المنزلي). هذا الاختبار يعتمد أيضاً على وجود هرمون الحمل (HCG) في البول. دقة هذا التحليل تقترب من ١٠٠٪.

(ج) اختبار الدم Blood test

يمكن تشخيص الحمل من خلال هذا الاختبار بعد مرور حوالي أسبوع من الحمل (أي مبكراً أسبوع عن التحليل المنزلي). هذا الاختبار يعتمد أيضاً على وجود هرمون الحمل (HCG) في الدم. هذا الاختبار لا يحتمل الخطأ ونسبة الدقة فيه تصل إلى ١٠٠٪.

أسباب تأخر اكتشاف الحمل

بعض السيدات لا تكتشف الحمل إلا في مرحلة متقدمة نتيجة أحد الأسباب التالية:-

(١) عدم انتظام الدورة الحيضية نتيجة علة مرضية أو تعاطي بعض العاقير الطبية أو التدريبات الرياضية العنيفة المنتظمة (أي احتراف

رياضية عنيفة). هذه المرأة لا تتوقع حدوث الحمل عند غياب الدورة الحيوانية بسبب تعودها على عدم انتظامها.

(٢) اعتقاد السيدة التي قاربت على سن اليأس أن غياب الدورة الحيوانية بسبب الحمل يرجع لوصولها لسن اليأس وتوقف الدورة الحيوانية لديها ، وبالتالي فهي لا تتوقع حدوث الحمل.

(٣) المرأة ذات الدورة الحيوانية قليلة الكمية قد تعتقد أن نقاط الدم القليلة التي قد تنزل في بداية الحمل دورة حيوانية وبالتالي لا تتوقع حدوث الحمل حتى يصبح الحمل متاخر.

(٤) السيدة التي تعتقد أنها لا يمكن أن يحدث لها حمل نظراً لكونها ترضع طفلاً من ثدييها.

(٥) الفتيات الصغيرات التي تحمل سفاحاً ولا تعرف أعراض ومظاهر الحمل. هناك بعض الفتيات تعتقد أن الحمل لا يمكن أن يحدث من ممارسة جنسية واحدة. بعض الفتيات تحمل عند حدوث أول تبويض لها وقبل نزول الحيض عليها.

**الفصل الثالث**

**الإجهاض**



## الفصل الثالث

### الإجهاض

#### تعريف الإجهاض (Abortion)

الإجهاض هو خروج محصول الحمل قبل اكتمال فترة الحمل. يطلق لفظ الإجهاض عادة إذا خرج محصول الحمل قبل ٢٤ أسبوع من الحمل (عند ٢٤ أسبوع يكون الجنين قابل للحياة إذا ولد) ، أما إذا خرج محصول الحمل بعد ٢٤ أسبوع من الحمل وقبل اكتمال فترة الحمل يسمى ذلك الولادة المبكرة (Premature birth).

الإجهاض ليس شيء مستحدث بل هو ممارسة قديمة قدم التاريخ وتحدث في كل المجتمعات البشرية بلا استثناء. يعود تاريخ الإجهاض إلى ما قبل زوال الإمبراطورية الرومانية عام ٤٧٦م. في القرن الثاني الميلادي ذكر الطبيب الروماني سورانوس Soranus في كتابه (علم أمراض النساء) أن المرأة التي ترغب في إنهاء الحمل لابد أن تقوم بمحظود بدني عنيف أو القفز أو حمل أشياء ثقيلة أو ركوب الحيوانات أو استعمال بعض الأعشاب. كذلك حذر هذا الطبيب من استخدام الأدواء الحادة نظراً لإمكانية تقب الأعضاء الداخلية.

سمحت معظم الدول بإجراء الإجهاض تحت مسميات مختلفة مثل حقوق المرأة ، والحفاظ على حياة المرأة ، والحرية الشخصية للمرأة ، ومكافحة التضخم السكاني وهو ما يسمى الإجهاض القانوني أو الإجهاض المشروع. معظم الدول العربية والإسلامية ودول أمريكا اللاتينية ما زالت تحظر الإجهاض. إن حظر إجراء الإجهاض لم يمنع ولم يقل معدل إجراء الإجهاض حيث تجري تلك العمليات بطريقة سرية وهو ما يسمى

الإجهاض الغير قانوني أو الإجهاض الغير مشروع. سواء كان الإجهاض مشروع أم غير مشروع فإن حوالي ٥٠ مليون عملية إجهاض تتم سنويا في كل بقاع الأرض مع اختلاف الثقافات والديانات والدخل الاقتصادي.

### الإجهاض المشروع والإجهاض الغير مشروع

لا يوجد دين واحد من الأديان السماوية يحث على الإجهاض ، ولكن الليبرالية والتحرر وحقوق الإنسان الوضعية في حوالي ثلثي العالم أعطت المرأة الحرية فيأخذ قرار استمرار الحمل أو الإجهاض وهو ما يسمى الإجهاض المشروع.

لقد نجحت هذه الدول المتعرّة من القيم الدينية والأخلاقية في إعطاء المرأة الحق في الإجهاض نتيجة فشل العالم المتدين في الحفاظ على قيمه الدينية والأخلاقية. إن انتشار الثقافة الغربية أدى إلى تنشي سوء الأخلاق ، ولكن التخلف في المجتمعات التي ما زالت تقيم وزناً لقيم الدينية هو الذي أدى إلى ارتفاع نسب الممارسات الجنسية الغير شرعية وبالتالي ارتفاع نسب حدوث الحمل والإجهاض السري (الغير مشروع) الذي قد يضاعفه مخاطر صحية خطيرة تؤثر على المرأة. هذه المخاطر الصحية للمرأة هي التي جعلت المجتمعات الغربية المادية تبيح الإجهاض ، بل وأصبحت تضغط على الدول التي ما زالت تجرم الإجهاض لتبيح الإجهاض.

إن الدول الغربية التي يسمح قانونها بالإجهاض نجحت في تخفيض مضاعفات الإجهاض ونسبة وفيات الأمهات الحوامل بنسب كبيرة وكذلك انخفضت عدد حالات قتل المواليد بنسب كبيرة مقارنة بها قبل تطبيق قانون إباحة الإجهاض. هذا الكلام صحيح ولا يحتمل الشك لأن الأرقام تذكر أن الإجهاض السري (الغير قانوني) يسبب حوالي ١٣% من وفيات

السيدات أثناء الحمل ( حوالي ٧٠ ألف — ٢٠٠ ألف امرأة تموت سنوياً من جراء الإجهاض الغير قانوني ) ، بينما معدل حدوث التقيحات يصل إلى أقل من ١% والوفيات تصل إلى حوالي حالة لكل ١٠٠ ألف حالة إجهاض في الإجهاض القانوني . هذه الأرقام هي التي دفعت العالم الغربي للضغط على العالم الشرقي لإباحة الإجهاض تحت دعاوى الإنسانية وحياة المرأة .

هذا الكلام بالرغم من صحته فهو يمثل النظر لنصف الكوب . بالطبع هذا الكلام صحيح بالنسبة لحياة المرأة ، ولكن أين هذا الحرص على حياة الجنين الذي هو نفس بشرية أيضاً . بمعنى إننا نحاول أن ننقد حياة حوالي ٢٠٠ ألف امرأة مقابل قتل حوالي ٣٠ مليون طفل سنوياً (تشير الإحصائيات إلى أن حوالي ٥٠ مليون عملية إجهاض تتم سنوياً في كافة أنحاء العالم منها حوالي ٣٠ مليون عملية تتم تحت رعاية طبية آمنة في الدول التي تبيح الإجهاض) . هذا يجعلنا نلقي نظرة سريعة على تطور قانون إباحة الإجهاض في بعض البلدان .

### أولاً: الدول الغربية

كل الدول الأوروبية ( عدا جمهورية أيرلندا ، وأيرلندا الشمالية ، ومالطا ) أصدرت قانون يبيح إجراء عمليات الإجهاض ، مع بعض الاختلاف بينهم في التفاصيل . معدل إجراء عمليات الإجهاض في أوروبا الغربية ٥ — ١٠ مرات أقل من معدلها في أوروبا الشرقية والوسطى بسبب زيادة معدل استخدام موائع الحمل في أوروبا الغربية ، وليس بسبب التزامهم الديني والأخلاقي .

## (١) بلجيكا

\* قانون عام ١٨٦٧م البلجيكي كان يحارب الإجهاض بكل صوره المختلفة.

\* في عام ١٩٩٠م صدر قانون بلجيكي يبيح إجهاض المرأة حسب رغبتها أثناء الفصل الأول من الحمل (١٢ أسبوع رحمي). بعد الأسبوع ١٢ من الحمل يسمح بالإجهاض إذا كان الحمل يهدد حياة المرأة الحامل بالخطر أو في حالة كون الجنين غير طبيعي.

## (٢) الدنمارك

\* في عام ١٩٣٩م صدر قانون يبيح الإجهاض للمرأة لإنقاذ حياتها في حالة خطورة الحمل عليها فقط.

\* في عام ١٩٧٠م تم تعديل القانون ليببيح الإجهاض للمرأة الحامل فوق سن ٣٨ سنة أو المرأة التي لديها أربعة أبناء وأكثر.

\* كانت الدنمارك أول دولة أوروبية تبيح الإجهاض حسب الرغبة حيث صدر قانون يوم ١٣/٦/١٩٧٣م ليببيح الإجهاض للمرأة الحامل أثناء الفصل الأول من الحمل (١٢ أسبوع رحمي).

\* توسيع الدنمارك في خدمات منع الحمل التي أصبحت تقدم مجاناً وتشمل المراهقات الغير متزوجات مما أدي إلي حدوث هبوط شديد في معدل عمليات الإجهاض ، حيث هبطت لأقل من نصف معدل الإجهاض في أمريكا.

## (٣) فنلندا

\* في عام ١٩٨٥م صدر قانون يبيح الإجهاض للمرأة الحامل أثناء الفصل الأول من الحمل (١٢ أسبوع رحمي) بعد استشارة اثنين من

الأطباء. بعد الأسبوع ١٢ من الحمل يسمح القانون بالإجهاض إذا كان الحمل يهدد حياة المرأة الحامل بالخطر أو كان الجنين غير طبيعي.

#### (٤) فرنسا

\* كان القانون الفرنسي أثناء الاحتلال النازي يحرم إجراء الإجهاض ، لدرجة معاقبة المرأة التي تحاول أن تجهض نفسها (حتى لو لم تنجح في الإجهاض) مع معاقبة من يقوم بإجراء الإجهاض. اتهمت احدى السيدات بإجراة الإجهاض الغير قانوني ٢٦ مرة وتم تنفيذ حكم الإعدام فيها أثناء الاحتلال النازي لفرنسا. بعد تحرر فرنسا من الاحتلال النازي تم إلغاء عقوبة الإعدام في جريمة الإجهاض .

\* في بداية السبعينيات كانت تجري حوالي نصف مليون عملية إجهاض غير قانوني في فرنسا.

\* في عام ١٩٧٥م صدر قانون يبيح الإجهاض للمرأة الحامل أثناء الأسابيع العشرة الأولى من الحمل بعدأخذ استشارة قانونية والانتظار لمدة أسبوع بعد تقديمها لطلب الإجهاض. بعد الأسبوع العاشر من الحمل يسمح القانون بالإجهاض إذا كان الحمل يهدد حياة المرأة الحامل بالخطر أو في حالة كون الجنين غير طبيعي. هذا القانون جعل بعض السيدات يسافرن إلى بريطانيا لإجراء الإجهاض هناك بعد الأسبوع العاشر.

#### (٥) ألمانيا

##### (أ) ألمانيا النازية

\* في عام ١٩٣٣م تم إغلاق مراكز تنظيم الأسرة وإيقاف إعلانات الدعاية لوسائل منع الحمل. كذلك تم تشجيع المرأة للعودة للمنزل وعدم العمل وتشجيعها بحوافز مالية للإنجاب.

\* في عام ١٩٤٣ صدر قانون إعدام من يقوم بجريمة الإجهاض للسيدات الألمانيات. على عكس ذلك كانت اليهوديات تجبر على الإجهاض على أساس أن اليهود كان جنس غير مرغوب فيه.

#### (ب) ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية

\* في عام ١٩٦٧ صدر قانون في ألمانيا الغربية يبيح الإجهاض للمرأة الحامل أثناء الفصل الأول من الحمل (١٢ أسبوع رحمي) لأسباب صحية أو في حالات الاغتصاب أو الحالات المصحوبة بمشاكل اجتماعية خطيرة ، ولكن بعدأخذ رأي أثنتين من الأطباء وأخذ استشارة قانونية إجبارية والانتظار لمدة ثلاثة أيام بعد تقديمها لطلب الإجهاض. عمليا دفعت الإجراءات المشددة معظم السيدات للسفر إلى هولندا لإجراء الإجهاض هناك.

\* في عام ١٩٧٢ صدر قانون في ألمانيا الشرقية يبيح إجراء الإجهاض للمرأة الحامل أثناء الفصل الأول من الحمل حسب رغبة الحامل.

#### (ج) ألمانيا الاتحادية

\* في عام ١٩٩٢ صدر قانون يبيح الإجهاض للمرأة الحامل أثناء الفصل الأول من الحمل (١٢ أسبوع رحمي) حسب رغبتها بعد أخذ استشارة قانونية إجبارية والانتظار لمدة ثلاثة أيام بعد تقديم الطلب.

#### (٦) بريطانيا

\* في عام ١٩٦٢ حدث ولادة لألف طفل في بريطانيا بدون أطراف نتيجة تعاطي السيدات الحوامل لعقار ثاليدوميد (thalidomide).

\* في عام ١٩٦٧م صدر قانون يبيح الإجهاض إذا رأى أثنتين من الأطباء خطورة على حياة الأم الحامل أو أن الجنين غير طبيعي.

\* في عام ١٩٩٠م تم تخفيض الإجهاض القانوني للمرأة الحامل حسب رغبتها من ٢٨ أسبوع إلى ٢٤ أسبوع ، ولكن مع ترك الاستثناء بعد ٢٤ أسبوع لحالات الخطورة على حياة الأم الحامل أو أن الجنين غير طبيعي.

## ثانياً: الشرق الأوسط

### (١) الدول العربية

\* كل الدول العربية ظلت تحرم استخدام موانع الحمل لسنوات طويلة. الآن كل الدول العربية أباحت استخدام موانع الحمل ، ولكن مع وجود بعض الآراء الدينية التي تحرمها.

\* كل الدول العربية والإسلامية (عدا تونس وتركيا) تحظر الإجهاض إلا بشروط خاصة حفاظا على حياة الأم أو لمنع إنجاب طفل معاق.

### تونس

\* في عام ١٩٦٥م صدر قانون يبيح الإجهاض للمرأة التي لديها خمسة أبناء أو أكثر.

\* في عام ١٩٧٣م صدر قانون يبيح الإجهاض للمرأة الحامل حسب رغبتها أثناء الفصل الأول من الحمل (١٢ أسبوع رحمي) بشرط أن يقوم بالإجهاض طبيب في مستشفى أو عيادة.

\* انخفض معدل المواليد في تونس في الثلاثين سنة الأخيرة بسبب منع تعدد الزوجات (الزوج لا يحق له الجمع بين أكثر من امرأة) ، وتحديد عدد الأبناء في الأسرة بثلاثة فقط ، وتسهيل استخدام وسائل منع الحمل ، ورفع الحد الأدنى للزواج للبنات إلى ١٧ سنة والوليد إلى ٢٠ سنة.

## (٢) تركيا

\* في عام ١٩٨٣ صدر قانون يجيز الإجهاض للمرأة الحامل حسب رغبتها أثناء الأسبوع العاشر وذلك لتقليل عدد السكان. يشترط هذا القانون أن تأخذ المرأة المتزوجة موافقة زوجها على الإجهاض.

\* تقدر حالات الإجهاض القانونية التي تتم الآن في تركيا بحوالي ٥٠٠ ألف حالة سنوياً.

## (٣) إيران

\* الإجهاض في إيران غير قانوني إلا في الحالات الاستثنائية لإنقاذ حياة الأم أو لمنع إنجاب طفل معاق.

\* عند قيام الثورة الإسلامية الإيرانية سنة ١٩٧٩ م منعت الإجهاض وأغلقت عيادات تنظيم الأسرة ورفضت استخدام موانع الحمل وحجبت المرأة عن الظهور في المجتمع ، وجعلت دور المرأة في المجتمع هو الزواج والإنجاب والمنزل.

\* أثناء الأربعين الثمانية للحرب بين العراق وإيران شجعت الحكومة الإيرانية زيادة معدل المواليد. في نهاية الحرب عام ١٩٨٨ م لوحظ أن الانفجار السكاني سيكون عائقاً للبناء الاقتصادي ، لذلك بدأت الحكومة الإيرانية في التراجع وشجعت رسمياً تنظيم الأسرة والتعاطي مع الأساليب المختلفة لمنع الحمل ، بل وسمحت أيضاً بمنع الحمل الدائم (مثل ربط الأنابيب للمرأة) وذلك للمرأة التي لديها ثلاثة أبناء بشرط موافقة الزوج.

## (٤) إسرائيل

\* في عام ١٩٧٧ تم السماح بإجراء الإجهاض للسيدات للحفاظ على حياتهن أو لعدم إنجاب طفل معاق.

\* استجابة للضغوط الدينية تم وقف قانون الإجهاض سنة ١٩٧٩ م وإلغاء كل الاعتبارات الاجتماعية.

\* بعد ذلك تم السماح لإجراء الإجهاض في ٢٨ مستشفى حكومي موزعة بجميع أنحاء إسرائيل حسب رغبة الحامل بشرط توافر أحد الأحوال التالية:-

(أ) الحامل التي يكون عمرها أقل من ١٧ سنة (سن الزواج للفتاة في إسرائيل ١٧ سنة) أو أكبر من ٤٠ سنة.

(ب) حدوث الحمل نتيجة الاغتصاب أو زنا المحارم أو علاقة جنسية خارج نطاق الزواج.

(ج) وجود دلائل تشير إلى أن الطفل سيولد معاق بدنيا أو ذهنيا.

(د) وجود دلائل تشير إلى أن استمرار الحمل يهدد صحة أو حياة الأم.

\* تشير إحصائيات الثمانينيات من القرن الماضي لإجراء حوالي ٢٠٠٠

- ٥٠٠ حالة إجهاض غير قانوني سنويا في إسرائيل.

### ثالثاً- قارة آسيا

#### (1) الصين

\* صدر قانون السماح بالإجهاض في الصين عام ١٩٥٧ م.

\* في عام ١٩٧٩ م صدر قانون بسياسة الطفل الواحد للأسرة الصينية بالمدينة ، وطفلين للأسرة الصينية الريفية. لذلك كانت تجبر المرأة الحامل في الطفل الثاني بالمدينة على الإجهاض.

\* تشير الدراسات إن نسبة الأولاد للبنات تبلغ ١١٩ : ١٠٠ حيث كانت الأسرة الصينية تفضل الولد وتتخلص من البنات وتندعى أنها توفيت عقب الولادة. بدأت الحكومة الصينية حملة ضد الإجهاض الانتقائي الذي

يهدف إلى التخلص من الأجنة الأنثوية بعدما تحول إلى ظاهرة تعيد إلى الأذمان وأد البنات عند العرب في الجاهلية. وتعتزم الحكومة جعل الإجهاض الانتقائي جريمة ومنع الأمهات من إجراء فحص بالموجات الصوتية لمعرفة جنس الجنين في محاولة لکبح أحد الأعراض الجانبية لسياسة الطفل الواحد التي بدأت قبل ٢٥ سنة. وقد اظهر تحقيق رسمي حدوث ٣٦٠٥ حالات للإجهاض الانتقائي خلال عامين . وتتضمن الحملة الحكومية جهودا للقضاء على التمييز ضد البنات تشمل برنامجا قوميا لاستثناء البنات من المصاريف الدراسية ومنح العائلات التي لم تنجح سوي بنت واحدة مسكن ووظيفة ومزايا في الضمان الاجتماعي. وي تعرض الوالدان في حالة إنجاب مزيد من الأطفال للغرامة أو فقدان الوظيفة أو التعقيم الإجباري. وفي إقليم هينان الذي يشهد أكبر فجوة بين الجنسين يفوق عدد الأولاد البنات في بعض المدارس بنسبة ثلاثة إلى واحد. وسن حاكم الإقليم قانونا في أكتوبر ٢٠٠٤ يجعل من الممكن الحكم بالسجن خمس سنوات على الطبيب الذي يجري فحصا بالموجات الصوتية بغض الإجهاض الانتقائي وبنفس العقوبة على من يجري لها هذا الفحص. ووجد في دراسة للإقليم أن هذه السياسة لم تسفر عن إلقاء القبض على أي شخص. ورغم حظر الفحص بالموجات الصوتية في 'هينان' إلا أنه من الممكن إجراؤه إذا قال الأطباء أن هناك أسبابا طبية تحتاج للفحص. وتدفع الأم ٣٠٠ - ٦٠٠ جنيه مصرى مقابل الفحص بعيدا عن أعين القانون.

(٢) الهند

\* لتجنب التضخم السكاني الشديد صدر قانون يبيح الإجهاض عام

١٩٧١م.

\* تعتبر إندونيسيا أكبر دولة إسلامية ، ورابع دولة في العالم من حيث عدد السكان. تشير الإحصائيات إلى أن إندونيسيا هي أكبر دولة يتم فيها الإجهاض الغير قانوني حيث يتراوح ما بين ٧٥٠٠٠ - مليون عملية سنويا ، وتجري معظمها بالعيادات السرية المشبوهة.

\* في بداية السبعينيات تم السماح بإجراء الإجهاض لإنقاذ الأم فقط.

#### رابعاً: قارة أفريقيا

##### نيجيريا

\* مسموح بالإجهاض فقط للحفاظ على حياة الأم. عقوبة مرتكب عملية الإجهاض الغير قانوني السجن لمدة ١٤ سنة.

\* يسبب الإجهاض الغير قانوني حوالي ٥٥٪ من مجموع وفيات الأمهات في نيجيريا.

#### خامساً: أمريكا اللاتينية

##### الأرجنتين

\* يسمح بالإجهاض للحفاظ على حياة الأم أو لمنع إنجاب طفل معاق.

\* عقوبة الإجهاض الغير قانوني السجن لمدة ١ - ٤ سنوات للمرأة والطبيب. تشير الدراسات إلى إجراء حوالي ٤٥٠٠٠ ألف عملية إجهاض غير قانوني سنويا.

#### سادساً: الولايات المتحدة الأمريكية

\* قبل عام ١٩٧٣م كان الإجهاض غير قانوني في أمريكا ، وكان القانون يعاقب الجهة التي تقوم بالإجهاض وأحياناً يعاقب المرأة الحامل التي تخضع للإجهاض.

\* في عام ١٩٦٥ توفيت ٢٦٥ امرأة في أمريكا نتيجة الإجهاض الغير قانوني ، مما دفع منظمات العمل المدنى للضغط لإصدار قانون يجيز الإجهاض ليتم تحت رعاية طبية مما يقلل الوفيات والمضاعفات المحتملة حدوثها. لذلك أعطت المحكمة الأمريكية العليا عام ١٩٧٣ المرأة الحق في إجراء الإجهاض حسب رغبتها خلال الأشهر الستة الأولى من الحمل. منذ ذلك التاريخ تجري سنويا في أمريكا حوالي مليون ونصف عملية إجهاض ، وانطلقت حمى الإجهاض لتفشي الآن حوالي ثلثي سكان الأرض والبقية ستائى تحت ضغوط حقوق المرأة. أي إن أمريكا تقتل سنويا مليون ونصف طفل بدون ذنب يقرفه لمنع وفاة ٢٦٥ امرأة مذنبة ، أرأيتم إنسانية ورحمة أكثر من ذلك ؟ .

\* إن الجماعات المناهضة للإجهاض في أمريكا تشن حرب ضارية ضد قتل الأجنة تحت مسمى حرية الفتاة في الإجهاض حسب رغبتها ، ولذلك بدأت ظواهر النجاح لمقاومة الإجهاض تلوح في الأفق حيث أقر المشرعين في ولاية ساوث داكوتا الأمريكية قانون يحذر كافة أنواع الإجهاض باستثناء الحالات التي تكون فيها صحة الأم مهددة بخطر حقيقي ، وسيصبح هذا القانون ساري المفعول اعتبارا من ٦/٧/٢٠٠٦م بعد توقيع حاكم الولاية عليه. بمقتضى هذا القانون سيعاقب الطبيب الذي يجرى عملية إجهاض غير قانوني بالسجن ٥ سنوات. نأمل أن تكون هذه هي البداية التي تطبق على كل الولايات الأمريكية وأوروبا لمنع إباحة الإجهاض وقتل الأجنة.

## إحصائيات الإجهاض في الولايات المتحدة

- \* أربعين فتیات من كل خمس فتیات بدأت الممارسة الجنسية قبل سن العشرين. معظم تلك الحالات بدأت الممارسة الجنسية نتيجة الاعتداء عليها وليس برغبتها.
- \* ٤٠٪ من السيدات في أمريكا أجرت عملية الإجهاض مرة واحدة في حياتها على الأقل.
- \* ٤٠٪ من الفتیات أصبحت حامل تحت سن العشرين مرة واحدة على الأقل.
- \* ٨٣٪ حدث لهن الحمل والإجهاض وهن غير متزوجات ، ويقسمن إلى: ٦٧٪ لم يتزوجن نهائيا ، ١٦٪ مطلقات أو أرامل.
- \* معدل الإجهاض في أمريكا حوالي ٢٠ حالة سنويا لكل ١٠٠٠ امرأة في المرحلة العمرية من ١٥ – ٤٤ سنة.
- \* تحدث ٣٢٥ حالة إجهاض سنويا في أمريكا مقابل كل ١٠٠٠ حالة ولادة طفل حي.
- \* تشير الدراسات أن حوالي ٣٪ من حالات الإجهاض تجري للحفاظ على حياة الأم ، وأن حوالي ٣٪ من حالات الإجهاض تجري لوجود تشوهات خلقية بالجنين. الحالات الباقية (أي ٩٤٪ من حالات الإجهاض) هي حالات قتيل تحدث بدون أي مبرر طبي بناء على رغبة الأم في التخلص من الجنين.
- إن تطبيق الإجهاض طرح نقاط خلافية عديدة في أمريكا بين الجماعات المؤيدة والجماعات المناهضة للإجهاض ، منها علي سبيل المثال:—

(أ) هل يجب أخذ موافقة أهل الفتاة الحامل قبل إجراء الإجهاض ؟

الجماعات المناهضة للإجهاض في أمريكا ترى ضرورة أخذ موافقة أهل الفتاة الحامل قبل إجراء الإجهاض إذا كان عمرها أقل من ١٨ سنة. على الجانب الآخر يرى مؤيدو الإجهاض عدم ضرورة أخذ تلك الموافقة قبل إجراء الإجهاض ، وكذلك يروا حرية الفتاة في استعمال أي طريقة لمنع الحمل. مؤيدو الإجهاض يروا إن أخذ موافقة الأهل تعرقل إجراءات الإجهاض مما يعرض الفتاة لمشاكل صحية أكبر نتيجة تأخر الإجهاض ، أو يجعل الفتاة تسافر إلى ولاية أخرى تسمح بإجراء الإجهاض دون أخذ موافقة الأهل .

تشير الدراسات الأمريكية أن حوالي ٤٥٪ من الفتيات الحوامل الأصغر من ١٨ سنة أخذنوا رأي وموافقة الأهل على الإجهاض ، بدون قانون يشترط ذلك.

(ب) هل يجوز إجراء الإجهاض بعد أن أصبح الجنين قابل للحياة ؟

عبارة قابل للحياة تعني قدرة الجنين على الحياة خارج رحم الأم بدون أي مساعدة طبية خاصة (أي بدون وضعه في حضانة). حتى الآن كل التجارب الطبية المقبولة تؤكد عدم إمكانية حدوث ذلك قبل ٢٨ أسبوع ، حيث إن الأجنة التي تولد في حوالي ٢٤ أسبوع رحمي تتطلب العناية المكثفة بالحضانة.

الجماعات المناهضة للإجهاض تحاول أن تمنع الإجهاض للجنين القابل للحياة وتعتبر ذلك قتلا ، بينما يرى مؤيدو الإجهاض إن ذلك أفضل من ولادة طفل غير مرغوب فيه.

أجريت دراسة عام ١٩٩٨ على ٢٧ دولة تجيز الإجهاض لتحديد

أسباب الإجهاض فظهرت الأسباب حسب الترتيب التالي:-

- \* الرغبة في تأجيل الإنجاب والأمومة.
- \* تعارض الحمل والإنجاب مع التعليم أو العمل.
- \* مشاكل عاطفية مع أب الجنين.
- \* عدم نضوج الفتاة الحامل.
- \* حوالي ١٣ ألف امرأة تجري الإجهاض سنويًا نتيجة حدوث الحمل من جراء الاغتصاب أو زنا المحارم.

- \* عدم القدرة المالية للإنفاق على طفل.
- \* الضغط من الزوج أو العشيق أو الأب لإنهاء الحمل.

#### استفتاء الشعب الأمريكي عن إباحة الإجهاض:-

أظهر استفتاء للشعب الأمريكي أجري في يناير ٢٠٠٦ عن آرائهم في الإجهاض فوجد:-

\* ٢٧٪ يوافق على إباحة الإجهاض للمرأة حسب رغبتها دون قيود أو شروط.

\* ١٥٪ يوافق على إباحة الإجهاض مع وضع بعض القيود أشد من المطبقة الآن.

\* ٣٣٪ يوافق على إباحة الإجهاض فقط للحمل الناتج من الاغتصاب أو زنا المحارم أو لإنقاذ حياة الأم.

\* ١٧٪ يوافق على إباحة الإجهاض فقط لإنقاذ حياة الأم.

\* ٥٪ لا يوافقوا على إجراء الإجهاض نهائياً مهما كانت الأسباب.

\* ٣٪ لم يحددوا رأيهما.

## العنف ضد القائمين بالإجهاض في أمريكا

منذ صدور قانون إباحة الإجهاض عام ١٩٧٣م تحدث اعتداءات يومية شديدة على القائمين على الإجهاض وعلى أماكن إجراء الإجهاض ، وكانت الحصيلة كما يلي:-

\* ٧ حالات قتل.

\* ١٧ حالة محاولة قتل لم تنجح.

\* ٣ حالات خطف.

\* ٢٠٧ حالة إحراق للعيادات.

\* آلاف الحالات من التهديد.

مما سبق يتضح لنا أن حوالي ٤٢% فقط من الشعب الأمريكي هو الذي يوافق على إباحة الإجهاض ، وأن الإجهاض يحارب محاربة شديدة من الجماعات المعارضة للإجهاض.

بالرغم من إباحة الإجهاض في أمريكا حسب رغبة الحامل إلا إن الإجهاض الغير شرعي ما زال يجري هناك بسبب الفقر . التأمين الصحي في أمريكا لا يغطي عمليات الإجهاض ، لذلك تلجأ الفتيات الصغيرات الفقيرات إلى محاولة الإجهاض بنفسها أو الذهاب لغير المتخصصين من أجل إنهاء الحمل بسبب عدم قدرتها على تحمل نفقات عملية الإجهاض التي تتراوح ما بين:-

\* ٣٥٠ - ٥٠٠ دولار إذا أجريت في ٦ - ١٠ أسابيع من الحمل.

\* ٦٥٠ - ٧٠٠ دولار إذا أجريت في الأسبوع ١٦ من الحمل.

\* ١٠٠٠ دولار بعد الأسبوع ٢٠ من الحمل.

أولاً: اليهودية

اليهودية ترى أن الجنين ليس إنسان كامل ، ولذلك فهي ترى أن قتل الجنين ليس جريمة. تفضل اليهودية إجراء الإجهاض قبل مرور ٤٠ يوم من فترة الحمل.

العادات والتقاليد اليهودية تقدس الحياة وبالتالي فهي لا تسمح بإجراء الإجهاض حسب الرغبة ، ومع ذلك فهي تسمح بالإجهاض تحت ظروف معينة (عندما يكون استكمال الحمل يهدد حياة الأم أو يؤدي لولادة طفل غير طبيعي) لأنها لا تعتبر الجنين كائن مستقل بذاته.

ثانياً: المسيحية

لم تذكر الأنجيل الأربعة أي شيء عن الإجهاض ، ولم يرد بها أي تحريم أو إباحة.

(١) الكاثوليك الرومان

رؤيَّة الكاثوليك الرسمية أن التدخل في عملية التكاثر البشري هو شيء آثم ، ولذلك فإن الإجهاض مُحظور. وهي كذلك ترى أن دخول الأرواح وخروجهَا للنفس البشرية يحدده الله وليس البشر ، ولذلك هم يرون أن الإجهاض يجب ألا يكون طريقة لتحديد النسل.

(٢) الأرثوذكس الشرقيين

يروا أن الحياة تبدأ مع بداية الحمل ، وأن الإجهاض هو قتل للحياة.

(٣) البروتستانت

الكنائس الإنجيلية ترى أن الإجهاض هو قتل للأطفال وبالتالي فهو خطأ. الكتاب المقدس لا يحتوي على أي مضمون لتحريم الإجهاض ،

بالرغم من احتوائه على العديد من الصفحات التي تذكر أن الحياة تبدأ مع بداية الحمل.

القليل من الكنائس الإنجيلية توافق على مبدأ الإجهاض برغبة المرأة ، ولكن معظم الإنجيليين يروا ضرورة وجود ضوابط صارمة للإجهاض.

### ثالثاً: الإسلام

في الشريعة الإسلامية تقسم تكوين حياة الجنين إلى مرحلتين وهما:-

(أ) المرحلة الأولى قبل أن تدب الحياة بالجنين (أي قبل أن يصبح للجنين روح).

(ب) المرحلة الثانية بعد أن تدب الحياة في الجنين.

يحظر الإسلام إجهاض امرأة حامل إلا لإنقاذ حياتها ، ولكن هناك بعض الآراء الفقهية التي يجب أن نستعرضها وهي:-

(١) الإجهاض قبل تمام الأربعين يوماً من العلوّق منعه بعض العلماء مثل الغزالى ومن تبعه ، وأجازه آخرون مثل الحنفية والحنابلة والمالكية ولو بغير حاجة ، وقد أجازه بعض الفقهاء مع الكراهة. أي إن معظم الفقهاء نری جواز الإجهاض برضاء الزوجين إن لم يكن الحمل قد بلغ ٤٠ يوم.

(٢) إذا تجاوز الحمل ٤٠ يوم ولم يصل ١٢٠ يوم لا يجوز الإجهاض إلا في الحالتين الآتيتين:-

(أ) إذا كانبقاء الحمل مضرًا بصحة الأم ضررًا جسيماً.

(ب) إذا ثبت أن الجنين سيولد بشوه بدني أو قصور عقلي.

(٣) يحظر الإجهاض بعد نفخ الروح أي بعد ١٢٠ يوم من الحمل ، إلا لإنقاذ حياة الأم. يجب أن تجري عملية الإجهاض في مستشفى حكومي ، ولا تجري إلا بقرار من لجنة طبية مشكلة من ثلاثة أطباء متخصصون.

\* أي أن الفقهاء أجمعوا على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح أي بعد بلوغ الجنين أربعة أشهر رحيمة.

\* لا يجوز إجهاض الحامل من زني وإن خشي عليها القتل من أهلها ، لأنها هي المخطئة فلا يحمل جنينها خطأها لأن الجنين معصوم الدم.

### الهندوسية

تحرم الهندوسية الإجهاض وتراه جريمة ضد الله.

### اليونانية

اليونانية تحارب أي تعدى على الحياة ، سواء لإنسان أو لحيوان. ترى اليونانية أن الحياة تبدأ بالجنين بعد الشهر الثاني من الحمل ، أي إن الإجهاض قبل شهرين (قبل أن تدب الحياة بالجنين) غير محرم باليونانية.

### الرأي الشخصي للمؤلف في إباحة الإجهاض

يجب مقاومة كل محاولات الغرب للضغط من أجل إباحة الإجهاض في مصر . بعيدا عن تحريم الدين للإجهاض ، ولكن من منظور المشاهدات الواضحة أمامنا الآن عالميا للدول التي أجازت الإجهاض فإنني أرفض الإجهاض للأسباب التالية:-

### (١) تطبيق القانون يزيد عدد حالات الإجهاض

بالرغم من أن الهدف من إصدار قانون إباحة الإجهاض كان هو الحد من معدل الإجهاض الغير قانوني للحفاظ علي حياة الحامل ، لكن الواقع العملي يثبت أن إصدار القانون صاحبه زيادة في عدد حالات الإجهاض. إن الإباحة ستجعل محترفو إجراء الإجهاض السري في الأزقة والشوارع الجانبية يخرجوا للعلن ويعلنوا عن تجارة عمليات الإجهاض دون الخوف من المساعلة القانونية. بل إن الإباحة ستجعل المرأة لا تخشى عوائق

الممارسات الجنسية خارج نطاق الزواج ما دام إصلاح كل المشاكل التي تنتجم عنها (مثل الإجهاض) سهل ويسير ولا يتطلب سوى بضعة مئات أو آلاف من الجنيهات. تشير الدراسات الغربية أن حوالي ٤٠ - ٨٥ % من السيدات التي تم إجهاضها قالت إنها لم تكن ستجهض نفسها إذا كان الإجهاض غير قانوني.

تشير الدراسات الأمريكية إلى إجراء أكثر من ٤٤ مليون عملية إجهاض (حالي ٦٧٠ ٨١٢) في الولايات المتحدة في ثلاثة عقود (١٩٧٣ - ٢٠٠٣م)، أي منذ صدور قانون إباحة الإجهاض.

بغض النظر مما إذا كان الإجهاض قانوني أم غير قانوني فإن بعض السيدات تنجح في الإجهاض وتتخلص من الجنين وبعضهن تموت من المضاعفات. في كل تلك الأحوال فإن الشيء المؤكد الوحيد هو موت الجنين. لذا يجب ألا نصدر قانون يبيح الإجهاض لقتل الأجنة بدون ذنب لمجرد جعل عملية القتل أكثر أماناً للمرأة الآثمة.

## (٢) الجنين هو إنسان

هناك موافقة ساحقة من معظم الأطباء وعلماء الأحياء على أن حياة الإنسان تبدأ مع الحمل مستدرين في ذلك إلى أن:-

\* قلب الجنين يبدأ ينبض بعد ١٨ - ٢٥ يوم من الحمل.

\* موجات المخ الكهربية تم تسجيلها بمخ الجنين برسام المخ الكهربى في اليوم ٤٣ من الحمل. إذا كان الأطباء يعتبروا أن غياب موجات المخ الكهربية تعنى وفاة الشخص ، فلماذا لا يري مؤيدو الإجهاض أن ظهور موجات المخ الكهربية هو دليل على الحياة.

\* يكتمل تخليق كل أجهزة جسم الجنين في الأسبوع الثامن من الحمل ، وتقوم هذه الأجهزة بوظائفها في الأسبوع ١٢ من الحمل. عند الأسبوع الثامن يستيقظ الجنين وينام ويغلق قبضة يده ويمضي إصبع الإبهام.

\* في الأسبوع التاسع يصبح للجنين بصمة أصابع متفردة.

\* في الأسبوع ١١-١٢ يستجيب الجنين للحرارة واللمس والضوء والإزعاج وتعلم كل أنسجته ، وربما تكون الأم لم تشعر بالحمل.

إن هذا الجنين يستحق منا الحماية القانونية الكاملة كأي شخص بالغ.

### (٣) الإجهاض والرق

إن الجنين هو إنسان وليس عبد بياع ويشتري ، ولكننا عندما نسير خلف القاطرة الأمريكية سنجعل الجنين هو عبد يحق لنا منحه الحياة أو قتلها. ولتوسيع تلك الصورة تعالوا نراجع معاً قانوني الرق والإجهاض في أمريكا وسننشر مدى تطابقهما.

في عام ١٨٥٧م أصدرت المحكمة الأمريكية العليا بموافقة ٧ أصوات ومعارضة صوتين قانون يقول أن الشخص الأسود ليس شخص قانوني وهو ملكية خالصة لمالك الأبيض الذي له الحق في بيعه أو شرائه أو حتى قتله. مناهضو الرق في ذلك الوقت اعترضوا وقالوا إن هذا قرار شائن وغير أخلاقي وتمييز عنصري ضد البشر لاعتماده فقط على لون البشرة. رد مؤيدو الرق قائلين إذا كان مناهضو الرق معترضين فلا يشتروا عبد حيث لا يرغبن أحد على ذلك ، ولكن ليس لهم الحق في فرض أخلاقياتهم على مالكي العبيد لأن تملك العبيد هو حرية لهم.

بنفس تلك الكيفية في عام ١٩٧٣م أصدرت المحكمة الأمريكية العليا بموافقة ٧ أصوات ومعارضة صوتين قانون يقول أن الجنين ليس شخص

قانوني وليس له أي حقوق مدنية أو حقوق إنسان وهو ملكية خاصة للأم التي يحق لها الاحتفاظ أو التخلص من الجنين. مناهضو الإجهاض في ذلك الوقت اعترضوا وقالوا إن هذا قانون شائن وغير أخلاقي وتمييز عنصري ضد كل البشرية لاعتماده فقط على سن الجنين وملكية الأم للرحم. رد مؤيدو الإجهاض قائلين إذا كان مناهضو الإجهاض لديهم اعتراض أخلاقي فلا يقوموا بالإجهاض حيث لا يوجد أحد يرغمهم على ذلك ، ولكن ليس لهم الحق في فرض أخلاقياتهم على الأم لأن هذه هي حريتها الخاصة في امتلاك أو التخلص من الجنين.

#### (٤) الإجهاض لا يقل اضطهاد الأطفال

يُزعم مؤيدو الإجهاض أن إنجاب الأم لطفل غير مرغوب فيه يجعله عرضة لأن يصبح طفل مضطهد ، لكن الدراسات الأمريكية تشير لعكس ذلك تماما. في دراسة أجريت في جامعة جنوب كاليفورنيا على ٦٧٤ طفل مضطهد أظهرت أن ٩١٪ من هؤلاء الأطفال المضطهددين ولدوا من حمل تم بموافقة الأبوين وبرغبتهما الكاملة.

إن الإجهاض في حد ذاته يمثل أكثر أشكال اضطهاد الأطفال عنفا.

#### (٥) الإجهاض القانوني ليس آمنا ١٠٠٪

نعم أنا أتفق أن الإجهاض القانوني أقل في عدد الوفيات عن الإجهاض الغير القانوني ، ومع ذلك فإن الإجهاض عموما (سواء كان قانوني أم غير قانوني) له العديد من المضاعفات في الحمل التالي مثل:-

\* الحمل خارج الرحم.

\* التهابات الحوض.

\* العقم.

- \* الإجهاض المتكرر.
  - \* الولادة المبكرة بسبب تحطم عنق الرحم أثناء عملية الإجهاض.
  - \* ثقب جدار الرحم الذي قد يتطلب التدخل الطارئ والعاجل لاستئصال الرحم.
- إن مضاعفات الإجهاض الوقتية تمثل حوالي ١٠ % ، بينما مضاعفات الإجهاض على المدى البعيد تمثل حوالي ٢٥ - ٤٠ %.

#### (٦) احتمال زيادة معدل سرطان الثدي

في كل النساء يزداد سرطان الثدي مع زيادة العمر. طبقاً لمعهد السرطان الدولي ترتفع معدل حالات سرطان الثدي من ١ : ٢٥٢ في الثلاثينيات من عمرهن إلى ١ : ٢٧ سيدة في السنتينيات من عمرهن. كل الدراسات التي أجريت على حالات الإجهاض المعتمد (المستحدث) قبل ولادة أول طفل (أي المرأة التي تجهض متعمدة قبل ولادة أي طفل) أظهرت وجود زيادة في معدل حدوث سرطان الثدي بنسب تصل إلى حوالي ٥٥ %.

أثناء الحمل الأول للمرأة يحدث تدفق لهرمون الاستروجين مما يسبب انقسام خلايا الثدي ونضجها وقدرتها على إفراز اللبن. أثناء عملية الانقسام تكون خلايا الثدي أكثر حساسية للمواد المسرطنة. إذا استمر الحمل ل نهايته يصبح الثديان ناضجين تماماً ، وتتوقف الخلايا عن الانقسام بسرعة وهذا يحدث توازن مع تدفق هرمون الاستروجين. لكن في حالة حدوث الإجهاض تتوقف هذه العملية الطبيعية وتبقى خلايا الثديين غير ناضجة وأكثر عرضة لحدوث سرطان الثدي.

تشير الدراسات القديمة التي أجريت على حالات الإجهاض المتمضى قبل ولادة أول طفل أنها تكون مصحوبة بزيادة في معدل حدوث سرطان الثدي في دول العالم المختلفة عن السيدات اللاتي لم تجهض كما يلى:-

\* ٤٢٪ زيادة في سيدات إيطاليا.

\* ١٤٪ زيادة في سيدات الصين.

\* تضاعفت ثلاثة مرات منذ عام ١٩٦٠ م حتى عام ١٩٨٧ في سيدات جمهوريات جورجيا واستونيا وروسيا.

لكن الدراسات الحديثة تشير عدم تأثير الإجهاض على نسبة حدوث سرطان الثدي نهائياً ، ويرى أصحاب الدراسات الحديثة أن الدراسات القديمة أجريت على عدد قليل من النساء. في فبراير ٢٠٠٣ عقدت ورشة عمل بمعهد السرطان الدولي وانتهت تلك الورشة إلى أن الإجهاض المستحدث لا يصاحبه زيادة في سرطان الثدي. عموماً ما زال هناك جدل علمي شديد حول هذا الموضوع الذي لم يحسم بعد.

#### (٧) هل يعالج الإجهاض تضخم السكان

الاعتقاد السائد أن هناك تضخم سكاني في معظم أنحاء العالم أدى إلى انتشار الفقر والظلم في العالم ، وأن الحل هو في تحديد عدد السكان. الحقيقة أن معظم دول العالم تنتج غذاء يكفي احتياجاتها ، ولكن هناك بعض الدول التي لم تستطع حتى الآن إنتاج غذاء يكفيها. العيب في ذلك ليس في كثرة عدد السكان ولكنه في فشل سياسات تلك الدول وتفشي الفساد فيها.

إننا لا يجب أن نوجه جهودنا لتقليل عدد السكان بقدر توجيه معظم مجاهودنا لنجعل الناس منتجين.

## (٨) الإجهاض يؤدي لتبين نسبة الذكور والإثاث في المجتمع

الموجات الصوتية ساعدت الآباء في معرفة جنس الجنين قبل الولادة. إباحة الإجهاض نشأ عنها ظهور حالات الإجهاض بناء على جنس الجنين ، مما أدى إلى تباين ملحوظ في معدل مواليد الإناث والذكور في بعض الأماكن. تفضيل الجنين الذكر أدى إلى إجهاض الإناث وزيادة عدد مواليد الذكور في قارة آسيا على سبيل المثال.

صدر قانون في الصين عام ١٩٧٩م بسياسة الطفل الواحد للأسرة والسماح بالإجهاض حسب الرغبة. إن الأسرة الصينية تفضل الجنين الذكر ، وبالتالي تحايلوا على القانون لإجهاض الإناث حتى يكون الطفل الواحد هو ذكر. في عام ٢٠٠٢م لوحظ أن نسبة الذكور للإناث وصلت إلى ١١٧ : ١٠٠ في المدينة ووصلت إلى ١٣٠ : ١٠٠ في الريف الصيني.

في الهند لوحظ أن تعداد الذكور للإناث ارتفع من ١٠٥ : ١٠٠ إلى ١٠٨ : ١٠٠ ، وتشير الدراسات إلى إجراء حوالي ١٠ مليون عملية إجهاض للإناث في الهند بين أعوام ١٩٨٥م - ٢٠٠٥م.

أي إننا إذا سمحنا بالإجهاض فسوف نفتح الباب على مصراعيه لقتل الأجنة الإناث والعودة لؤاد البناء الذي كان موجود في الجاهلية.

## (٩) الإجهاض يقلل فرصة المرأة في الحمل والإنجاب مستقبلاً

الإجهاض يقلل فرص المرأة المستقبلية في الحمل بسبب المضاعفات التي تحدث من جراء عملية الإجهاض ، والتي تشمل:-

### (أ) تمزق عنق الرحم

\* تمزق عنق الرحم المصاحب للإجهاض الذي يحتاج لتدخل جراحي لإصلاحه يحدث في حوالي ٦١% من حالات الإجهاض.

\* يؤدي تمزق عنق الرحم إلى عدم كفاءة عضلة عنق الرحم وهو ما يتسبب بعد ذلك في الحمل التالي لحدوث الإجهاض التلقائي أو الولادة المبكرة أو المضاعفات أثناء الولادة.

#### (ب) المشيمة معيبة الالتحام Placenta pravia

\* الإجهاض يزيد فرصة حدوث المشيمة التي تلتزم بالرحم في موضع معيب في الحمل التالي حوالي ٧ – ١٥ ضعف، مقارنة بالي التي لم تجهض.

\* التحام المشيمة الغير طبيعي هذا يزيد فرصة حدوث تشوهات الجنين ، والوفيات داخل الرحم ، والتزيف الشديد أثناء الولادة.

#### (ج) الحمل خارج الرحم

\* الإجهاض يتلوه زيادة كبيرة في نسبة حدوث الحمل خارج الرحم في الحمل التالي للإجهاض.

\* الحمل خارج الرحم يهدد حياة الحامل بالخطر ، ويضطر الطبيب لإزالة قناة فالوب والجنين لإنقاذ حياة الحامل. هذا من شأنه أن يقلل فرصة المرأة في الحمل لاحقاً.

#### (د) مرض التهاب الحوض Pelvic inflammatory disease

\* بعض السيدات تعاني من وجود عدوى ميكروبية غير ظاهرة بالرحم وخاصة عدوى الكلاميديا Chlamydia.

\* تشير الدراسات أن حوالي ٢٠ – ٢٧% من السيدات اللاتي ترغبن في الإجهاض تعاني من هذه العدوى. ٢٣% من هذه السيدات تعاني من مرض التهاب الحوض بعد حوالي ٤ أسابيع من الإجهاض. كذلك وجد أن حوالي ٥% من السيدات اللاتي لا تعانى من هذه العدوى الميكروبية ظهر بهن مرض التهاب الحوض بعد حوالي ٤ أسابيع من الإجهاض.

\* إن مرض التهاب الحوض يزيد فرصة حدوث الحمل خارج الرحم ، وبالتالي يقلل خصوبة المرأة.

### (هـ) نقب الرحم

\* حوالي ٢ - ٣% من كل حالات الإجهاض تعاني من نقب بالرحم ، ومعظم تلك الحالات لا يتم تشخيصها وعلاجها إلا إذا تم الكشف من خلال المنظار. تزيد فرصة حدوث نقب الرحم لمن سبق لهن الولادة أو لمن يتم إجهاضهن باستخدام مخدر عام.

\* نقب الرحم قد ينشأ عنه مضاعفات في الحمل اللاحق ، وقد يستدعي استئصال الرحم وبالتالي يقلل أو يحرم المرأة نهائياً من فرصة الحمل.

### (١٠) متلازمة الأذى بعد الإجهاض **Post-abortion stress syndrome**

متلازمة الأذى بعد الإجهاض هي رد فعل عاطفي مرضي تستشعره بعض الأمهات والآباء بعد الإجهاض. قد يظهر رد الفعل بعد الإجهاض مباشرةً أو بعد عدة سنوات من الإجهاض.

سبب حدوث هذه المتلازمة:— قد يكون أحد الأسباب التالية:—

\* الأزمة المحيطة بالحمل الغير شرعي.

\* الشعور الملح بضرورة اتخاذ قرار بإنهاء الحمل.

\* الضغوط التي تتعرض لها الحامل من أهلهما لإنهاء الحمل.

\* احتفاظها بسر الحمل دون أن تطلع عليه أحد.

\* رغبتها الدفينة في الاحتفاظ بطفليها.

### أعراض هذه المتلازمة:—

تشمل عرض أو أكثر من الأعراض التالية: إيمان المخدرات أو الكحول ، الغضب ، القلق ، الرفض ، العزلة ، قلة احترام الذات ،

الكوابيس واسترجاع الأحداث ، أفكار انتحارية ومحاولة الانتحار ، الشعور بالندم على فقد الطفل ، البكاء المفاجئ الغير متحكم فيه ، تجنب أي شخص أو حدث يذكرها بالحمل والإجهاض وبالتالي فهي تتجنب صديقاتها الحوامل وتتجنب الأطفال والأطباء وفحص منطقة الحوض عند الأطباء.

هناك بعض الآراء من مؤيدي الإجهاض ترى أنه لا وجود لتلك المتلازمة وأن العكس هو الصحيح حيث ترى تلك الآراء أن الاضطرابات النفسية تكون أشد قبل الإجهاض عنها بعد الإجهاض ، وأن الفتاة تشعر بتحسن حالتها الذهنية بعد الإجهاض لخلصها من مشكلة الحمل الغير مرغوب فيه.

أجريت دراسة في فنلندا للمقارنة بين معدل حالات الانتحار بعد الولادة الطبيعية ومعدلها بعد الإجهاض ، وأشارت تلك الدراسة إلى ارتفاع معدل الانتحار بعد الإجهاض.

عموماً يرى بعض العلماء أن ردود الأفعال النفسية المرضية بعد الإجهاض تتوقف على الحالة النفسية للمرأة قبل حدوث الحمل.

### القانون المصري والإجهاض

لم يكتفي القانون المصري بحماية الحياة الإنسانية منذ ولادة الإنسان وحتى وفاته بل أضفي حمايته على الجنين في رحم أمه ، وأعطاه حقه في النمو الطبيعي في رحم أمه حتى موعد ميلاده المحدد. تتضح لنا مظاهر هذه الحماية في النصوص القانونية التي تعتبر الإسقاط (الإجهاض) جريمة يعاقب عليها كل من يرتكبها حتى ولو كانت أم الجنين التي هي مصدر حياته فالقانون يلزمها بالمحافظة على حملها حتى يكتمل نموه في أحشائها.

تقوم جريمة الإجهاض (الإسقاط) على أركان ثلاثة وهي :-

(١) وجود الحمل: وهذا يوضح القانون ما يلي:-

\* تقع الجريمة فقط على امرأة حامل (فإذا لم تكن حاملاً فإن الجريمة لا تقع مهما كان الشخص يعتقد بأن هناك حمل ، لأن الجريمة في هذه الحالة وهمية لا وجود لها وبالتالي لا عقاب عليها).

\* تقع جريمة الإجهاض حتى لو كان الجنين لم يتشكل بعد أو لم تدب فيه الحياة.

\* لا تقع الجريمة إذا كان الجنين ميت وقت وقوع الاعتداء.

\* لا تقع الجريمة بعد بداية عملية الولادة لأنها ببداية الولادة يصبح الجنين إنسان حي ، فيسأل الفاعل حينئذ عن فعله سواء كان جريمة القتل أو جرح أو عاهة.

(٢) الركن المادي

يقوم الركن المادي على ثلاثة عناصر وهي الفعل الذي يقوم به الجاني ، وتكون نتيجة فعله إسقاط الحمل ، مع وجود علاقة سببية بين الفعل والإسقاط.

(١) الفعل

\* يقصد به كل فعل من شأنه إنهاء الحمل قبل موعد الولادة الطبيعي مثل تناول مشروبات أو مأكولات معينة ، أو استعمال وسيلة طبية كإجراء جراحة أو تعاطي أدوية أو استخدام آلة لإخراج الجنين أو القضاء عليه ، أو قيام الحامل برياضة عنيفة كالقفز وحمل الأثقال وذلك يتضح من خلال المادة ٢٦١ من قانون العقوبات التي تنص على (كل من أسقط عدماً امرأة

حبلٍ بإعطائِها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلائلها عليها سواء كان برضاهَا أم لا يعاقب بالحبس).

\* يستوي فعل الإجهاض أن تقوم المرأة بإجهاض نفسها أو أن يقوم شخص آخر بالإجهاض ، يكون هذا الشخص مسؤُول سواء كان قد قام فعل بفعل الإجهاض أو اقتصر نشاطه على إرشاد الحامل على وسيلة أدت للإجهاض.

\* يقع فعل الإجهاض سواء كان ذلك برضاء الحامل أو بدون رضاها.

\* كلمة عمدا في القانون تعني ضرورة توفر القصد الجنائي لحدوث

الجريمة ، وبناء على ذلك لا يسأل المتهم عن فعله الغير متعمد مثل:-

- ارتطام شخص بسيدة حامل في الطريق أو في وسيلة نقل

وسقطها على الأرض وإجهاضها فلا تقع جريمة الإجهاض على هذا الشخص لعدم تعمده.

- قذف الكرة عن غير قصد أثناء لعب الكرة بالطريق ببطن امرأة

حامل ترتب عليه الإجهاض فلا تقع جريمة الإجهاض.

#### (ب) إسقاط الجنين

\* يشترط لحدوث جريمة الإجهاض إنهاء الحمل قبل موعد الولادة.

\* لا يشترط الإسقاط وفاة الجنين ، حيث إن خروج الجنين من الرحم

حي قبل موعده يمثل اعتداء علي حقه في النمو الطبيعي داخل الرحم حيث

قد تتعرض حياة الجنين أو صحته للخطر ، ومن الملاحظ انه نادرًا ما يعيش الجنين طويلا إذا خرج من رحم الأم قبل الموعد الطبيعي للولادة .

\* لا يشترط الإسقاط خروج الجنين فوراً عقب حدوث الاعتداء (بكل صوره السابق ذكرها) ، بل يتضمن ذلك حدوث وفاة الجنين داخل الرحم ولو ظل فيه حتى تم استخراجه بالتدخل الطبي أو الجراحى.

#### (ج) العلاقة السببية بين الفعل والإجهاض

\* إذا انتهت علاقة السببية بين الفعل والإسقاط فإن الفعل يكون شررعاً في الإجهاض وهو غير معاقب عليه في جريمة الإجهاض حيث تنص المادة ٢٦٤ من قانون العقوبات على (لا عقاب على الشروع في الإسقاط).

#### (٣) الركن المعنوي

الركن المعنوي في هذه الجريمة يتخذ صورة القصد الجنائي والذي يقوم علي عنصرين وهما:-

#### (أ) العلم

لتوافر أركان جريمة الإجهاض يجب أن يكون الجاني علي علم أن المرأة حامل. إذا كان الجاني لا يعلم أن المرأة حامل فلا يسأل عن جريمة الإجهاض ، ولكن يسأل عن جريمة الضرب أو العاهة فقط.

كذلك لتوافر أركان جريمة الإجهاض يجب أن يكون الجاني علي علم بأن فعله سينتج عنه الإسقاط. فمثلاً إذا أعطي المتهم امرأة حامل أي مادة يعتقد أنها تقييد في الحمل وهو لا يعرف ضررها علي الجنين وترتبط عنها حدوث الإسقاط فلا تقع عليه جريمة الإجهاض.

#### (ب) الإرادة

يجب أن تكون إرادة الجاني إحداث الإسقاط وإنهاء الحمل عمداً. لا تقع جريمة الإجهاض إذا ضرب الجاني امرأة يعلم أنها حامل دون إرادة منه في إحداث الإجهاض ، فإذا حدث الإجهاض يسأل فقط عن واقعة الضرب.

## نص القوانين المصرية في جريمة الإجهاض

تناول القانون المصري جريمة إسقاط الحوامل وعقوبتها في المواد ٢٦٠ إلى ٢٦٤ من قانون العقوبات. يقسم القانون المصري جريمة الإجهاض إلى قسمين وهم الجنحة والجناية.

### (١) جنحة الإجهاض

يعتبر القانون المصري جريمة الإجهاض جنحة في الحالتين التاليتين:-

#### (أ) جنحة الإجهاض الواقعة من الغير على الحامل

تنص المادة رقم ٢٦١ من قانون العقوبات علي (كل من أسقط عمداً امرأة حبلي بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلاتها عليهما سوءاً كان برضائها أم لا يعاقب بالحبس). شروط هذه المادة هي:-

- \* أن يحدث الإجهاض من شخص آخر غير المرأة الحامل.
- \* وقوعها بأي وسيلة غير العنف.

- \* ألا يكون الفاعل طبيباً أو جراحًا أو صيدلياً أو قابلة صحية.

لا تشترط هذه المادة حدوث الإجهاض برضاء المرأة أو بغير رضائهما. رضاء الحامل لا يعتبر سبباً لإباحة الإجهاض لأنّه يتعلق بالاعتداء على حياة الجنين ، وليس من حق الأم أن تنتصرف في حياة الجنين لكونها لا تملّكها.

#### (ب) جنحة الإجهاض الواقعة من الحامل على نفسها

تنص المادة رقم ٢٦٢ من قانون العقوبات علي (المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها ، أو رضيت باستعمال الوسائل السالفة ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبّب الإسقاط عن

ذلك تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها). أي أن هذه المادة تتصل على مسؤولية الحامل بطريقتين:-

- \* الأولى بفعل إيجابي عن طريق تعاطي الدواء الذي قدمه لها الغير ، أو استعمال الوسائل التي عرضها أو دلها عليها شخص آخر.
- \* الثانية بفعل سلبي بتمكن الغير من جسدها لاستعمال تلك الوسائل.

## (٢) جنائية الإجهاض

يعتبر القانون المصري جريمة الإجهاض جنائية في الحالتين التاليتين:-

### (أ) جنائية إجهاض الغير للحامل عن طريق الضرب ونحوه

تنص المادة رقم ٢٦٠ من قانون العقوبات علي (كل من أسقط عدماً امرأة حبلٍ بضربٍ ونحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة).

أي إن هذه المادة تشرط حدوث الإجهاض بالضرب أو أي نوع من أنواع الأذى الجسدي مثل الركل أو الدفع. تم التشديد في حالات الإيذاء البدني لأن هذا الفعل يتضمن الاعتداء على شخصين وهما الجنين والمرأة الحامل نفسها.

### (ب) جنائية الإجهاض من ذي الصفة الخاصة على الحامل

تنص المادة رقم ٢٦٣ من قانون العقوبات علي (إذا كان المسقط طيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة). يشدد القانون العقوبة على الطبيب أو الجراح أو الصيدلي أو القابلة والسبب في ذلك يرجع إلى أن المتهم أساء استعمال صفتة وخبرته التي وهبها له الله فأستعملها في ارتكاب الجريمة بدلاً من أن يستخدمها في خدمة المجتمع.

إذا كانت الحامل طبيعية أو صيدلية أو جراحية أو قابلة وقامت بإجهاض نفسها فيسقط عنها تشديد المادة ٢٦٣ ويطبق عليها المادة ٢٦٢ التي تعتبر الجريمة في هذه الحالة جنحة وليس جنابة.

### أنواع الإجهاض

يقسم الإجهاض من الناحية الطبية الشرعية إلى نوعين وهما:-

(١) الإجهاض الطبيعي Natural abortion أو التلقائي (Spontaneous abortion).

(٢) الإجهاض المستحدث Induced وهو يقسم إلى نوعين:-

(أ) الإجهاض المشروع أو القانوني Legal abortion .

(ب) الإجهاض الغير مشروع أو الغير قانوني Illegal abortion .

### أولاً: الإجهاض الطبيعي أو التلقائي

يحدث هذا النوع من الإجهاض تلقائيا بدون أي تدخل خارجي نتيجة سبب طبيعي أو حادث عرضي (Accidental abortion). عادة يكون سبب الإجهاض هو وجود حالة مرضية بالأم الحامل أو الجنين أو المشيمة.

(١) أسباب الإجهاض التلقائي الناتج عن مرض بالأم الحامل مثل:-

(أ) ارتفاع درجة حرارة الحامل نتيجة الملاريا والتيفود والأنفلونزا الشديدة والالتهابات الفيروسية المختلفة ، لأن ارتفاع درجة حرارة الأم تقضي على الجنين.

(ب) الزهري.

(ج) أمراض موضعية بالجهاز التناسلي مثل التهاب الرحم أو عنقه ، أورام الرحم الحميدة والخبيثة ، انقلاب الرحم ، نقص نمو الرحم ، التشوهات الخلقية بالرحم ، أو ضعف عضلة عنق الرحم.

(د) تعدد زائد لجدار الرحم نتيجة حمل توأم أو كثرة السائل الأمنيوسي حول الجنين.

(هـ) وجود كروموزومات غير طبيعية بالحامل.

(و) ارتفاع ضغط الدم للحامل أو الإصابة بمرض السكر أو اختلال وظائف الكلى.

(ز) قلة نشاط الغدة الدرقية.

(ح) التدخين.

(ط) تناول الحامل لبعض العقاقير التي تنشط انقباض الرحم مثل عقار الكينين الذي يستخدم في علاج الملاريا.

(ى) الصدمة العصبية الشديدة لأي سبب.

(٢) أسباب الإجهاض الناتج عن مرض بالجنين مثل:-

(أ) عيوب خلقية بالجنين.

(ب) نقص نمو الجنين.

(٣) أسباب الإجهاض التلقائي بسبب مرض بالمشيمة مثل الانفصال العارض للمشيمة أو الأغشية.

تشير الدراسات أن معظم حالات الإجهاض التلقائي تحدث في فترة مبكرة من الحمل.

تردد فرصة حدوث الإجهاض التلقائي في :-

\* السيدات اللاتي سبق لهن الإجهاض التلقائي أكثر من ٣ مرات.

\* السيدات اللاتي سبق لهن إجراء إجهاض مستحدث.

\* السيدات اللاتي تعانين من أمراض عامة مثل ارتفاع الضغط أو السكر أو الكلى.

\* السيدات اللاتي يزيد عمرهن عن ٣٥ سنة.

## ثانياً: الإجهاض المستحدث

الإجهاض المستحدث هو الإجهاض الذي يحدث بتدخل خارجي متعدد لإنهاء الحمل. من الصعب حصر درجة خطورة الإجهاض المستحدث على مستوى العالم لعدة عوامل منها:-

- \* الاختلاف الكبير في كفاءة خدمات الإجهاض بين الدول المختلفة ، وبين الشرائح الاجتماعية المختلفة في المجتمع الواحد.
- \* عدم وجود إحصائيات دقيقة من مختلف أقطار العالم لمتابعة ما بعد الإجهاض.

\* اختلاف درجة الخطورة باختلاف خبرة ومهارة القائم بالإجهاض ، وسن الحامل وصحتها وعدد مرات الحمل والإنجاب السابقة لها ، وعمر الجنين ، والظروف المحيطة بالحمل ، والطريقة والأدوات المستخدمة في الإجهاض ، والعاقاقير المستخدمة ، ومشروعية الإجهاض في البلاد المختلفة. الإجهاض المستحدث في مصر وكل الدول العربية (عدا تونس) نوعان وهما:-

### (١) الإجهاض المستحدث المشروع

يحدث هذا الإجهاض المشروع للحفاظ على حياة الأم أو لمنع ولادة طفل معاق ، وهو مشروع في كل دول العالم ، ويتم برعاية وإشراف طبي. يجري هذا الإجهاض وفق ضوابط محددة وهي:-

(أ) موافقة أثنين من الأخصائيين في تخصص أمراض النساء والتوليد على إجراء الإجهاض للحفاظ على حياة الأم ويدكرا في التقرير المخاطر المحتملة لاستمرار الحمل.

- (ب) أخذ موافقة المرأة الحامل كتابيا على إجراء الإجهاض.
- (ج) أخذ موافقة الزوج (للمرأة المتزوجة) أو أخذ موافقة والد الحامل أو الوصي عليها (للمرأة الغير متزوجة وحملت حمل غير شرعي ولكن حياتها معرضة للخطر).
- (د) إجراء العملية في مستشفى حكومي.
- معظم حالات الإجهاض المستحدث المشروع تجري من خلال عمليات التوسيع والكحت أو التوسيع والتقرير.

## (٢) الإجهاض المستحدث الغير مشروع (الإجهاض الجنائي)

يمكن تعريف الإجهاض الجنائي بأنه إسقاط الجنين لسبب غير إنفاذ حياة الأم الحامل أو غير منع ولادة طفل معاق. معظم حالات الإجهاض الجنائي تحدث للفتيات اللاتي تحملن حملا غير شرعيا.

### وسائل الإجهاض الجنائي

#### (١) العنف العام على الجسد

عند حدوث الحمل الغير شرعي تشعر البنت بالذعر وتخاف من بطش والديها أو تخاف من الطرد من المنزل ، لذلك تخفي الحمل وتبحث عن حل للمشكلة بمفردها بسرية تامة. أحيانا تخبر البنت أمها التي تساعدها في استعمال العنف على الجسد من خلال:-

- \* الضغط العنيف على جدار البطن والظهر ، أو الضرب والركل المباشر بقبضة اليد أو القدم على البطن.
- \* حمل أشياء ثقيلة.
- \* القفز من فوق مكان مرتفع نوعا مثل السرير أو منضدة.
- \* ركوب دراجة أو دابة.

إن الضرب المباشر لجدار البطن يحدث إصابات بالأحشاء البطنية والحوضية مثلاً يحدث بالرحم. سجلت حالات حدث لها مضاعفات خطيرة مثل تمزق الكبد أو الطحال أو الأمعاء وانتهت معظمها بالوفاة نتيجة نزيف بالتجويف البطني أو التهاب بريتوني ، وذلك مع سلامة الرحم والجنين. معظم حالات العنف العام على الجسد لا تحدث الإجهاض إلا إذا كان الرحم شديد الحساسية. الرحم شديد الحساسية بالسيدة يؤدي للإجهاض لأي حادث عارض ولو كان بسيطاً مثل انزلاق قدمها على درجة سلم.

## (٢) العنف الموضعي على الجهاز التناسلي

غالباً تلجأ الفتاة لهذه الطريقة بعد فشل العنف العام على الجسد في إحداث الإجهاض. عادة تبدأ بمفردها ، وبعد فشلها تستعين بصديقتها أو أمها أو أي امرأة. العنف الموضعي قد يكون موجة لعنق الرحم أو للرحم. الهدف من العنف الموضعي هو العنف الميكانيكي على عنق الرحم لإحداث توسيع عنق الرحم وتمزيق كيس الحمل بأي وسيلة مما يؤدي للإجهاض نتيجة تقلصات الرحم. يتم إدخال أجسام غريبة في عنق الرحم مثل عود نبات الملوكية أو عود من شجرة القطن أو إبرة التريكو أو أسلاك إطارات الدراجة. إن الشخص العادي ليس له دراية بالوضع التshireحي للرحم وعلاقته بالمهبل ، وهذا يجعله يدخل الأداة بخلفية المهبل بطريقة مستقيمة معتقداً أن عنق الرحم يقع على خط مستقيم مع المهبل مما يدفع الأداة لإحداث تقب بالمهبل ثم تمر الأداة للتجويف البطني وقد تحدث تقب بالأمعاء أو الأعضاء البطنية. كذلك قد تحدث الأداة تقب بعنق الرحم. في بعض الأحيان تدخل الأداة من عنق الرحم ولكن دفعها بقوة قد يؤدي لتقب جسم الرحم ثم النفذ إلى التجويف البطني وإحداث إصابات بالأحشاء

البطنية. إن تقب الأعضاء التناسلية أو الأعضاء البطنية أو الحوضية يصاحبه نزيف دموي داخلي أو خارجي وقد يصل لمرحلة حدوث الصدمة والوفاة. هذه الأدوات المستخدمة في العنف الموضعي على عنق الرحم تكون غير معقمة مما قد يحدث تلوث بالتجويف البريتوني أو الحوضي (شكل ٢١).

أحياناً قد توضع في عنق الرحم أعواد جافة من اللاميناريا أو أعواد الدردار وترك في عنق الرحم لتمتص الماء وبالتالي تنتفخ تلك الأعواد تدريجياً ، ولذلك قد تنزلق هذه الأعواد من عنق الرحم إلى داخل الرحم. انتفاخ هذه الأعواد بالماء يؤدي إلى اتساع عنق الرحم وتحريض الإجهاض. أيضاً هذه الأعواد قد تؤدي لمضاعفات تقب الأعضاء التناسلية والبطنية والحوضية وبالتالي النزف الدموي ، وكذلك التلوث والأنفان. يشمل العنف الموضعي على عنق الرحم إجراء غسيل للمهبل بماء بارد يتبعه ماء حار. أحياناً يتم حقن ماء الصابون أو المطهرات أو الجليسرين داخل الرحم ، وهذا قد يؤدي إلى انفصال غشاء الجنين من جدار الرحم وحدوث الإجهاض.

### (٣) الإجهاض باستعمال العقاقير

قبل أن نخوض في أنواع العقاقير المجهضة يجب أن ندرك أن معظم العقاقير والأعشاب التي تقتل الجنين قد تقتل الأم أيضاً.

تستخدم بعض الأعشاب وبعض العقاقير في إحداث الإجهاض منذ قديم الأزل. في بداية القرن العشرين استخدمت عجينة اليوتس *utus paste* وهي تتكون من مزيج من الصابون وصمغ الراتنج ويوديد البوتاسيوم (أو

البيود). توضع هذه العجينة في قناة عنق الرحم حيث يحدث المركب الهالوجيني الموجود بها تهيج مما يؤدي إلى طرد محتويات الحمل.

نقسم الأدوية المجهضة التي تؤخذ بالفم أو الحقن إلى:

(أ) أدوية تؤثر تأثير مباشر على الرحم يؤدي إلى انقباض عضلة الرحم مثل الأرجوت والكينين والبيتوبرين والرصاص والأبيول. يجب أخذ جرعة كبيرة من هذه الأدوية لكي يحدث الإجهاض ، وهذا قد يؤدي إلى وفاة الأم.

(ب) أدوية تؤثر تأثير سام عام على الجسد ومن ضمنه الرحم. هذه الأدوية تحدث تأثير سام أولاً يظهر على الحامل ثم يؤدي إلى موت الجنين ، ولكنه قد يؤدي إلى وفاة الأم أيضا. أهم هذه الأدوية هي السموم المعدنية مثل الزرنيخ والزنبق والرصاص.

(ج) أدوية مسببة للإسهال الشديد عن طريق تهيج الأمعاء. تهيج الأمعاء يحدث فعل منعكس على عضلة الرحم مما يؤدي إلى تقلص شديد بالرحم. أهم هذه الأدوية الحنظل وزيت الخروع وزيت حب الملوك.

(د) أدوية منظمات الطمث وهي عبارة عن هرمونات المبيض.

(٤) الإجهاض الطبيعي في العيادات السرية

بعد أن تفشل الفتاة في إنهاء الحمل بأي طريقة من الطرق السابقة تبدأ في البحث عن العيادات المشبوهة والأطباء سيئي السمعة من أجل إنهاء الحمل عندهم. عادة في تلك العيادات يتم إعطاء الحامل أدوية تحدث انقباض في عضلات الرحم واتساع عنق الرحم مما يؤدي للإجهاض والذي قد يستدعي التداخل الجراحي لاستكمال الإبهاض ، أو يتم التداخل الجراحي مباشرة عن طريق عملية التوسيع والكحت الأكثر استخداما.

يحدث هذا الإجهاض سرا ولا يصل لجهات التحقيق إلا عند حدوث مضاعفات جسمية. عادة ينكر الطبيب قيامه بإجهاض الفتاة بدون مبرر طبي ، وينكر أن الحامل وصلت له في حالة إجهاض غير كامل أو إجهاض محتم مما استدعي التداخل الجراحي لوقف النزيف وإنقاذ حياتها.

### وسائل الإجهاض الطبي

تحتاج طريقة إنهاء الحمل باختلاف فترة الحمل ، فالطرق التي تستخدم في بداية الحمل قد تكون غير مناسبة في الحمل المتأخر والعكس صحيح. عادة تقسم تلك الطرق إلى ثلاثة أقسام حسب فصل الحمل.  
طرق الإجهاض في الفصل الأول من الحمل (الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل):-

#### الامتصاص الخوائي Suction aspiration

\* تجري هذه الطريقة (شكل ٢٢) لإجهاض الجنين الذي لم يبلغ الأسبوع الخامس عشر من الحمل. تتم هذه الطريقة بحقنة يدوية حيث تسمى طريقة الامتصاص الخوائي اليدوي Manual vacuum aspiration أو باستخدام مضخة كهربائية حيث تسمى طريقة الامتصاص الخوائي الكهربائي Electrical vacuum aspiration.

\* يتم تطهير عنق الرحم بالبيتين ويُوسع عنق الرحم قليلا ، ثم تدخل أنبوبة بلاستيكية مجوفة من خلال عنق الرحم إلى داخل الرحم وتمتص محتويات الرحم بالحقنة اليدوية أو المضخة الكهربائية. الامتصاص يؤدي إلى تمزيق جسد الجنين إلى أجزاء صغيرة (شكل ٢٣) ثم يفصل المشيمة من الجدار الداخلي للرحم ويجمعهم داخل زجاجة. بعد ذلك يفحص النسج الممتص للتأكد من خروج محتويات الحمل (شكل ٢٤ ، شكل ٢٥).

\* قوة الامتصاص بهذه الطريقة تفوق ٢٩ مرة قدرة الشفط المكنسة الكهربائية المنزلية.

### مميزات هذه الطريقة

\* تحتاج زيارة واحدة فقط للطبيب.

\* تستغرق العملية دقائق قليلة.

\* نسبة نجاحها عالية جداً (تصل إلى ٩٩%).

### التوسيع والكحت

\* تماثل طريقة الامتصاص الخوائي ولكنها تختلف في إدخال أداة معدنية ملعقية الشكل داخل الرحم. يكحت جدار الرحم بهذه الأداة فتفصل الجنين والمشيمة من جدار الرحم وتمزقهم ثم يتم كشطهم داخل حوض.

\* التزيف المصاحب لتلك العملية يكون غزير ، ولذلك تم الاستعاضة عن هذه الطريقة بطريقة الامتصاص الخوائي.

### طرق الإجهاض في الفصل الثاني من الحمل

#### اجهاض التسمم الملحي Saline poisoning abortion

\* تجري هذه الطريقة بعد الأسبوع السادس عشر من الحمل.

\* في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي كانت هذه الطريقة هي أشهر طريقة مستخدمة في الفصل الثاني من الحمل. أصبحت هذه الطريقة غير مستخدمة نظراً لخطورتها على الحامل.

\* يتم إدخال حقنة طويلة خلال جدار بطن الحامل ومنها إلى داخل كيس السائل الأمينيوسي المحيط بالجنين ، ثم يحقن محلول ملح مركز في السائل الأمينيوسي. يعني الجنين من تشنجات وتسمم بعد ابتلاعه للملح المركز. التسمم الملحي يحدث اتساع عام في الأوعية الدموية ووذم

واحتقان ونزيف وصدمة ثم يقتل الجنين في غضون ساعة من الحقن.  
عندما ينجح الحقن وتحدث وفاة الجنين تدخل الأم في مرحلة الولادة بعد  
يوم تقريباً من الحقن لتلد جنين ميت (شكل ٢٦).

### طريقة التوسيع والتفرغ (D&E)

\* تستخدم هذه الطريقة (شكل ٢٧) بعد الأسبوع ١٢ من الحمل.  
\* هي عملية تقطيع أوصال الجنين أرباً أرباً (شكل ٢٨ ، شكل ٢٩)  
باستخدام أداة مثل الكماشة لهرس عظام الجنين (غالباً تكون عظام الجنين  
متكلسة) وإزالتها تدريجياً من أسفل.

\* تدخل الكماشة في الرحم وتطبق على القدم أو أي جزء من الجنين  
مع تحريك الكماشة والجزء داخلها حركة لوبية لنزع الجزء الموجود بين  
فكى الكماشة عن باقي أجزاء الجنين. يكرر ذلك مع باقي أجزاء الجنين  
لفصلها جزئياً وإزالتها.

\* يتم إجهاض حوالي ١٠٠ ألف امرأة في أمريكا باستخدام هذه  
الطريقة في فترة الحمل ١٣ - ٢٤ أسبوع. حوالي ٥٠٠ امرأة من هؤلاء  
تعاني مضاعفات خطيرة ، ومع ذلك تعتبر هذه الطريقة أكثر أماناً للحامل  
عن طريقة إجهاض التسمم الملحى.

### الحقن داخل قلب الجنين

\* زادت نسبة التوائم الثلاثية (والتوائم أكثر من الثلاثية) بنسبة ٢٠٠٪  
منذ بداية السبعينيات بسبب استخدام أدوية زيادة خصوبة المرأة. نظراً لأن  
ذلك الأجنة تولد عادة قبل موعدها وناقصة النمو فإنها تعاني من مشاكل  
صحية عديدة ، لذا تم التوصل لطريقة الحقن داخل قلب الجنين لتقليل  
عدد الأجنة أو لقتل طفل معاً.

\* عندما يبلغ الحمل حوالي أربعة أشهر يتم إدخال حقنة داخل جدار البطن للحامل ومنه لصدر وقلب أحد الأجنة ثم تحقن المادة السامة بقلب الجنين. إذا نجحت طريقة الحقن يتم امتصاص جسد الجنين الميت ، لكن في بعض الأحيان يؤدي الحقن لفقد كل الأجنة.

### طرق الإجهاض في الفصل الثالث من الحمل

#### إجهاض الولادة الجزئي

\* تسمى أيضا طريقة شفط المخ Brain suction أو D&X.

\* تجري هذه العملية بعد الشهر الرابع أو الخامس من الحمل.

\* في هذه العملية يتم ولادة الجنين عدا الرأس ، ثم تدفع المقصات الجراحية بقوة داخل قاعدة الجمجمة ، ثم يتم إدخال أنبوبة داخل الجمجمة لشفط المخ ، ثم يشد الجنين الميت بالكامل للخارج (شكل ٣٠ ، شكل ٣١).

#### مضاعفات عملية إجهاض الولادة الجزئي

— سدة السائل الأمينوسي والتي قد تكون مميتة للألم.

— فقد كفاءة عنق الرحم بعد العملية الذي يؤدي إلى الإجهاض المتكرر في الحمل اللاحق.

— انفجار الرحم بسبب تدوير الجنين داخل الرحم ، والذي قد يؤدي لنزيف الأُم حتى الوفاة في خلال ١٠ دقائق. إن تفتيت عظام جمجمة الجنين قد تؤدي إلى اصطدام أجزاء منها بجدار الرحم وتتب الرحم.

#### مضاعفات الإجهاض الجراحي الطبي

بالرغم من ندرة مضاعفات الإجهاض الجراحي الطبي ، إلا أن المضاعفات محتملة الحدوث وخاصة إذا أجريت في وقت متاخر من الحمل. معدل حدوث المضاعفات يتوقف على عوامل عده وتشمل طول

مدة الحمل ، ونوع التخدير المستخدم ، وصحة الأم الحامل العامة ، وطريقة الإجهاض ، ومهارة وكفاءة القائم بالإجهاض. تشير الإحصائيات أن حوالي ٩٧٪ من الخاضعات للإجهاض الجراحي لا يعانين من أي مضاعفات ، وأن حوالي ٢,٥٪ يعانين من مضاعفات بسيطة يسهل علاجها ، وأن حوالي ٠,٥٪ يعانين من مضاعفات شديدة تتطلب تدخل جراحي عاجل. المضاعفات تشمل:-

- (أ) تجمع جلط دموية داخل الرحم في حوالي ٢٪ وهي تحتاج إلى إجراء الامتصاص الخوائي لاستكمال الإجهاض.
- (ب) التقيح (اللتلوث) يحدث في حوالي ١٪ - ٠,٢٪ وهو يسهل تشخيصه وعلاجه.
- (ج) تمزق عنق الرحم يحدث في حوالي ٦٪ - ١,٢٪ ويمكن إصلاح هذا التمزق.
- (د) انتقام الرحم أو الأعضاء الحوضية يحدث في حوالي ٤٪. انتقام الرحم قد يشفى بمفرده أو قد يحتاج لتدخل جراحي ، ونادرًا ما يحتاج لاستئصال الرحم. أثناء الحمل تكثر الأوعية الدموية بالرحم ويتضخم الرحم وتليين عضلاته مما يسهل نقبه وأختراقه بواسطة الأدوات الجراحية عند إجراء الإجهاض. أي إن نقب الرحم في حالات الإجهاض هو من المضاعفات المحتمل حدوثها ، وبالتالي لا يسأل عنها الطبيب إذا كانت من المضاعفات لحالة الإجهاض القانوني.
- (هـ) إجهاض غير كامل (وفيه تظل بقايا الحمل داخل الرحم) يحدث في حوالي ٣٪ - ٢٪ ويحتاج للامتصاص الخوائي لاستكمال الإجهاض.

(و) نزيف مهبلي شديد يتطلب نقل دم ويحدث في حوالي ٠٠٢ - ٣% من الحالات.

(ز) وفاة الحامل وتحدث بمعدل حالة في كل ١٦٠ ألف حالة إجهاض. الوفاة تحدث بسبب التخدير ، التقيح (التلوث) ، السدة الأمينوسية ، أو النزيف الذي لا يمكن السيطرة عليه.

### الإجهاض بعد مشاجرة

من أكثر حالات الإجهاض التي تعرض على الطبيب الشرعي هي ادعاء امرأة تعرضها للضرب بالبطن أو الظهر في مشاجرة مما أدى إلى إسقاطها. عادة لا يمكن للطبيب الشرعي الجزم بحدوث الإجهاض بهذه الكيفية للأسباب التالية:-

(١) جدار البطن جدار رخو وبالتالي فهو يمتص معظم الضربات دون ترك أثر يدل على الضرب ، وبالتالي لا يمكن التحقق من صدق روایتها من عدمه.

(٢) للإجهاض أسباب عديدة مثل الإجهاض التلقائي (الذي يحدث نتيجة حالة مرضية بالحامل أو الجنين أو المشيمة أو أسباب نفسية بالحامل) أو الإجهاض الجنائي الناتج من الضرب.

يختلف هذا الوضع إذا صاحب الضرب الإجهاض ثم وفاة الأم حيث تظهر الصفة التشريحية للألم وجود مظاهر إصابية بجدار البطن من الداخل وبالأحشاء البطنية ونزيف بالتجويف البطني مما يجعل الطبيب الشرعي يستطيع أن يؤكد تعرضها للضرب وحدوث الإجهاض بصورة جنائية.

## الإجهاض الكيميائي

تستخدم هذه الطريقة في إنهاء حوالي ١٠٪ من حالات الإجهاض في أمريكا وأوروبا. يتميز الإجهاض الكيميائي بالآتي:-

- \* يتم تناوله عن طريق الفم.
- \* يمكن استخدامه في مرحلة مبكرة من الحمل. تشير معظم الدراسات إلى كفاءته العالية في إنهاء الحمل حتى الأسبوع السابع ، بينما تشير دراسات أخرى إلى صلاحيته حتى الأسبوع التاسع من الحمل.
- \* تجنب مشاكل ومضاعفات الإجهاض الجراحي مثل نقب عنق الرحم أو الرحم أثناء استخدام الأدوات الجراحية.
- \* لا يحتاج لتخدير وبالتالي تتجنب الحامل مشاكل التخدير.
- \* نسبة نجاحه عالية وتصل إلى ٩٥ - ٩٨٪ باستخدام عقارين معاً.
- \* يماثل الإجهاض التلقائي.

## عيوب الإجهاض الكيميائي:-

- \* نقل أو تلاشي فاعليته بعد الأسبوع التاسع من الحمل.
- \* لا تصلح طريقة الإجهاض الكيميائي للحامل التي تعاني من فقر دم (أنيميا) ، أو ارتفاع ضغط الدم ، أو مرض بالكليتين أو الغدة الكظرية ، أو حساسية للعقاقير المستخدمة ، أو أي ميكروبات وعدوي بالمهبل ، أو الحامل التي يكون عمرها أكبر من ٣٥ سنة ، أو الحمل خارج الرحم المؤكد أو المشتبه به في حالة استخدام طريقة الميفبرستون والميسوبروستول ، أو في حالة وجود لولب ، أو كانت الحامل تعاني من أمراض تجلط الدم أو تعالج بموانع التجلط ، أو كانت مدخنة.
- \* تأخذ أياماً ونادراً أسابيع لكي تتم عملية الإجهاض.

\* النزيف بعد الإجهاض الكيميائي يمكث فترة أطول من الإجهاض الجراحي.


\* بعد استعمال العقار الأول لا يمكن التراجع عن فكرة الإجهاض والتمسك بالحمل ، وذلك لأن العقار الأول يحدث عيوب خلقية بالجنين إذا استمر الحمل.

\* بفشل الإجهاض الكيميائي في ١ - ٥% من الحالات ويستمر الحمل ، وبالتالي يتطلب التداخل الجراحي لإحداث الإجهاض.


\* قد يؤدي إلى إجهاض غير كامل (أي عدم خروج كل محتويات الرحم) في ١% من الحالات ، وبالتالي يحتاج لتدخل جراحي لاستكمال الإجهاض.

### (أ) مزيج Mifepristone/Misoprostal

\* عقار ميفيرستون Mifepristone (كذلك يسمى حبة الإجهاض أو ميفيريكس Mifeprex أو RU-486) تم الترخيص للعمل به في فرنسا لأول مرة (أول دولة في العالم) عام ١٩٨٨م. تم السماح باستعمال عقار ميفيرستون في حالات الإجهاض الكيميائي لاحقاً فيما يزيد عن عشرين دولة أخرى في كل أنحاء العالم من ضمنها النمسا ، بلجيكا ، الصين ، الدنمارك ، فنلندا ، بريطانيا ، اليونان ، إسرائيل ، لوکسمبورج ، هولندا ، نيوزيلندا ، النرويج ، روسيا، جنوب أفريقيا ، إسبانيا ، السويد ، سويسرا ، تايوان ، تونس ، أوكرانيا ، والولايات المتحدة. تم بيع أكثر من ٤٦٠ ألف جرعة من ميفيريكس لمزودي خدمات الإجهاض في أمريكا منذ أن تم السماح به عام ٢٠٠٠م. استخدمت حوالي ٥٠٠ ألف امرأة في معظم دول



شكل (٢١) أخطار الإجهاض الجنائي



شكل (٢٢) الإجهاض بطريقة الامتصاص الخوائي

شكل (٢٣) →



تمزق جسد الجنين لأجزاء عديد  
نتيجة الإجهاض بطريقة  
الامتصاص الخوازي

← شكل (٢٤)



فحص الجنين المجهض للتأكد من  
نزوله بالكامل


← شكل (٢٥)



فحص الجنين المجهض للتأكد  
من زواله بالكامل



شكل (٢٦)  
جنين تم إجهاضه بطريقة  
التسمم الملحى



شكل (٢٧) الإجهاض بطريقة التوسيع والتفریغ



شكل (٢٨)

تمزيق الجنين إرباً نتيجة الإجهاض بطريقة التوسيع والتفریغ



شكل (٢٩)

تمزيق الجنين إرباً نتيجة الإجهاض بطريقة التوسيع والتفریغ

العالم حبة الإجهاض لإنها الحمل ، لكن لا تتوفر أية بيانات عن معدلات الوفيات. يتوفر ميفبرستون في بلاد أخرى من خلال السوق السوداء.

كificية عمله: يحدث هذا العقار الإجهاض عن طريق:-

\* **ميفبرستون (منشط صناعي)** هو مضاد للبروجيستين، فهو يعيق عمل البروجسترون (هرمون ضروري للمحافظة على الحمل) مما يسبب ترقق في بطانة جدار الرحم وانفصال الجنين من الرحم. أي إن هذا العقار يؤدي إلى ذبول التربة التي يتلحم بها الجنين (يقصد بها بطانة الرحم) ، وبالتالي فهو يؤدي إلى ذبول الجنين ووفاته.

\* **ثليبين واسع عنق الرحم.**

\* **زيادة إنتاج البروستاجلاندين** الذي يسبب انقباض الرحم وطرد محتوياته.

طريقةتناول العقار:— تحتاج هذه الطريقة لزيارة الطبيب أربع زيارات:

\* **الزيارة الأولى**: يأخذ الطبيب تاريخ الحمل ويجري فحص جسدي عام وفحص مخبري للتأكد من عدم وجود موائع طبية لاستخدام هذه الطريقة. بعد ذلك يتم الفحص بالموجات فوق الصوتية لتحديد عمر الجنين واستبعاد الحمل داخل أنبوبة فالوب (الحمل خارج الرحم). أخيراً تؤخذ موافقة الحامل كتابياً على الإجهاض بهذه الطريقة ، وتفضل معظم الدول الانقطاع يوم أو أكثر لتأخذ المرأة قرارها النهائي قبل الإجهاض.

\* **الزيارة الثانية**: تأخذ الحامل قرص ٦٠٠ مجم ميفبرستون بالفم.

\* **الزيارة الثالثة**: بعد ٤٨ ساعة من تناول العقار الأول تأخذ قرص ٤٠٠ ميكروجرام من عقار ميسوبرستول بالفم أو لبوس بالمهبل. هذا

العقار شبيه البروستاجلاندين يحدث انقباض بالرحم ويطرد محتويات الرحم في غضون حوالي ٤ ساعات.

\* الزيارة الرابعة: الغرض منها التأكيد من حدوث الإجهاض ، واستبعاد استمرار النزيف المهبلي. في حالة عدم حدوث الإجهاض أو استمرار النزيف يتم إجراء الفحص بالموجات فوق الصوتية.

#### (ب) مزيج Methotrexate/Misopristol

\* يستخدم عقار ميثوتريكسات Methotrexate في أمريكا منذ عام ١٩٥٣م لعلاج بعض أنواع مرض السرطان ، ويستخدم ميثوتريكسات أيضاً منذ الثمانينيات لمعالجة الحمل خارج الرحم. بدأ استخدام جرعات قليلة من ميثوتريكسات وميسوبروستول للإجهاض أثناء الحمل المبكر في عام ١٩٩٣ بعدما أكتشف العلماء فاعلية هذا العقار في إنهاء الحمل.

\* يؤخذ عقار ميثوتريكسات بالحقن أو الفم فيمنع غرس الجنين بجدار الرحم في بداية الحمل. طريقة تناوله:—

— في اليوم الأول يحقن عقار ميثوتريكسات.

— في اليوم السادس أو السابع يوضع لبوس ميسوبروستول بالمهبل.

— في اليوم الثامن تراجع الحامل الطبيب للتأكد من حدوث الإجهاض. في حالة عدم حدوث الإجهاض تعطي جرعة أخرى من ميسوبروستول أو يتم الإجهاض جراحيا.

#### الأثار الجانبية للإجهاض الكيميائي

\* معظم مضاعفات الإجهاض الكيميائي تحدث من عقار ميسوبروستول وتمثل في التقلصات الشديدة والنزيف المهبلي وصداع وغثيان وقيء وإسهال وارتفاع حرارة الجسم ورعشة وإجهاد. تستمر

التكلسات مع بعض السيدات لساعات عديدة وقد يصاحبها نزول جلطات دموية أثناء الإجهاض. هذه التكلسات والأنزفة تهدأ بعد نزول أنسجة الجنين. أظهرت دراسة أن معدل كمية الدم أثناء التزيف كان حوالي ٧٥ ميليلتر بالمقارنة بـ ٥٠ ميليلتر من الدم أثناء الحيض. ترتبط كمية التزيف بفترة الحمل و يمكن أن تصل إلى مئات المليليترات. يمكن أن يستمر الطمث الخفيف والنزيف لمدة ١ - ٣ أسابيع ، ولكنه في المتوسط يستمر ١٣-٩ يوما. أشد فترة للنزيف تكون بعد الإجهاض ويستمر التزيف الشديد بعد الإجهاض لمدة ١ - ٤ ساعات.

\* حوالي ٥٢% من الحالات تحتاج لتدخل جراحي لعلاج التزيف الشديد أو المستمر. في أحيان قليلة قد تحتاج الحامل إلى نقل دم.  
\* سجلت حالة واحدة حدث لها انفجار بالرحم باستعمال طريقة الإجهاض الكيميائي.

### تشخيص الإجهاض

يختلف تشخيص الإجهاض من حالة لأخرى اعتماداً على مدة الحمل عند الإجهاض ، والوقت الذي مضى بين حدوث الإجهاض وعرض الحالة على الطبيب الشرعي ، وما إذا كانت المرأة المجهضة على قيد الحياة أم توفيت. عادة يسأل المحقق الطبيب الشرعي عما إذا كانت هذه المرأة كانت حامل وأجهضت من عدمه ومدة الحمل وتاريخ وسبب الإجهاض.

### أولاً: تشخيص الإجهاض بالأحياء

(١) يطلع الطبيب الشرعي على المعلومات الواردة بمذكرة النيابة ، ثم يطلع على الأوراق الطبية المرفقة في أوراق القضية عن واقعة الإجهاض. في حالة وجود أي قصور في الأوراق الطبية يجب أن يرسل الطبيب

الشرعى للنيابة لاستيفاء الإجابات التى يريد أن يستقرر عنها من الجهة العلاجية. يجب أن تشمل أوراق العلاج الحالة الإكلينيكية للمذكورة وقت دخولها المستشفى والفحوص التى أجريت لها. كذلك يجب على الجهة المعالجة التحفظ على متحصلات الإجهاض وتحريزها وإرسالها للنيابة التى ترسلها إلى الطبيب الشرعى مع أوراق القضية.

(٢) يؤخذ التاريخ الشخصى للحامل ويشمل:-

(أ) حالتها الاجتماعية (سبق لها الزواج أم لا، متزوجة حالياً أم لا ، تاريخ الزواج).

(ب) عدد مرات الحمل والولادة ، وعدد الأطفال الأحياء وأعمارهم ، وعدد الأطفال المتوفين وأعمارهم عند الوفاة وسبب الوفاة.

(ج) عدد مرات الإجهاض السابق ، ومدة الحمل في كل مرة حدث فيها الإجهاض.

(د) روایة المذكورة عن سبب الإجهاض الحالى ، وسؤالها عن موعد آخر طمث نزل عليها لتحديد مدة الحمل حسب روایتها.

(٣) يفحص الطبيب الشرعى المذكورة عن:-

(أ) مظاهر العنف بالجسد عموماً مع التركيز على جدار البطن والظهر (مثل الكدمات والسعفات) وبيان مدى توافق تاريخها وتاريخ الواقعه الواردة بالمذكرة.

(ب) مظاهر العنف الموضعي حول منطقة التناسل والحوض.

(ج) الحالة الصحية العامة وتشمل النبض والضغط ودرجة الحرارة.

(د) فحص الثديين للبحث عن علامات الحمل التي تشمل:-

\* كبر حلمة الثدي في الحجم وتحولها للون داكن ، وتصبح نتوءات مونتجمري أكثر وضوحا.

\* عند عصر الثديين قد يخرج منها اللبأ وهو سائل أصفر اللون.

(هـ) فحص جدار البطن للبحث عن علامات الوضع الحديث مثل:-

\* تجدد جدار البطن وارتخاء عضلاتها.

\* وجود خطوط بيضاء (تنتج من التئام خطوط الحمل الحمراء).

\* وجود خط أسود بين السرة والعانة.

(و) فحص المهبل للحالة خروج أي إفرازات مهبلية مدممة أو أي أجسام غريبة.

(ز) فحص عنق الرحم للحالة خروج أي إفرازات مدممة أو أي أجسام غريبة.

(ح) فحص الرحم لبيان حجمه ووضعه ووجود انتفاء خلفي أو أمامي به من عدمه.

(ط) أخذ عينة دم للبحث عن أمراض السكر والزهري ووظائف الكليتين.

(ي) أخذ عينة بول للبحث عن الصديد والبروتين والسكر ، وكذلك البحث عن العقاقير والمواد المجهضة.

(ك) إجراء اختبار الحمل لإثبات الحمل حيث تظل نتيجة اختبار الحمل إيجابية لمدة حوالي أسبوعين بعد إتمام الإجهاض.

(ل) فحص متطلبات الإجهاض بالعين المجردة لبيان ما إذا كانت فعلا متطلبات إجهاض من عدمه. أحيانا يكون الجنين نما ويمكن تحديد

عمره والكشف عليه وتشريحه لبيان سبب وفاته وما إذا كان به تشوهات خلقية من عدمه ، وكذلك تفحص المشيمة والحبل السري. غالبا تكون متحصلات الإجهاض قليلة ولا يكفي فحصها بالعين المجردة لذا ترسل إلى مختبر الباثولوجي بمصلحة الطب الشرعي لفحصها مجهريا عن وجود متحصلات إجهاض آدمية من عدمه ، وبيان ما إذا كانت أغشية الجنين بها أي مظاهر مرضية من شأنها أن تؤدي للإجهاض التلقائي من عدمه.

### ثانياً: تشخيص الإجهاض بالأموات

إن تشخيص الإجهاض في الأموات يسهل التوصل إليه ، ولكن دائما يجب البحث بعناية عن سبب الوفاة. الوفاة في حالات الإجهاض تحدث بسبب التخدير ، التقيح (التلوث) ، السدبة الأمنيوسية ، الصمة الهوائية ، أو النزيف الذي لا يمكن السيطرة عليه. لذلك فإن تشريح تلك الحالات يقتضي طريقة خاصة للبحث عن تلك المضاعفات المحتملة للإجهاض.

#### (١) الكشف الظاهري

(أ) يلاحظ لون الرسوب الدموي:- قد يكون باهت بسبب النزيف ، أو يكون بلون برونزى بسبب التقيح ، أو يكون أصفر نتيجة ثقب وإصابة الكبد التي يتربى عليها حدوث اليرقان.

(ب) تلاحظ علامات الحمل السابق ذكرها (تغيرات الحمل بالبطن والثديين).

(ج) يفحص عموم الجسد عن مظاهر العنف العام على الجسد (مثل الكدمات والسعادات) وخاصة منطقة البطن والظهر.

(د) فحص المهبل للاحظة خروج أي إفرازات مهبلية مدممة أو أي أجسام غريبة. تؤخذ عينة من أي سائل خارج من المهبل بماصلة لفحصها عن الصابون أو الكيماويات والمطهرات.

(هـ) يجري فحص شعاعي للجثمان على الصدر والبطن لاستبعاد الصمة الهوائية. الصمة الهوائية تظهر بالفحص الشعاعي على هيئة فقاعات هوائية في القلب والأوردة الكبيرة بالصدر والوريد الأجوف السفلي بالبطن.

## (٢) الصفة التشريحية

(أ) البحث عن الصمة الهوائية بالقلب. تترع عظمة القص مع مراعاة عدم فتح أي وريد من أوردة أعلى الصدر. تفتح فتحة متوسطة بغضاء التامور المحيط للقلب بحرص شديد ويملاً التامور بالماء ، ثم يشق على تجويف القلب وهو مغمور تحت الماء فإذا تصاعدت فقاعات الهواء دل ذلك على وجود صمة هوائية. لا يمكن الاعتماد على هذا الاختبار إذا كانت مظاهر التعفن الرمزي قد بدأت في الجثمان ، حيث ستعطي غازات التعفن نتائج إيجابية خاطئة للصمة الهوائية.

(ب) تزال أعضاء الحوض كتلة واحدة. يتم ذلك من خلال تمديد النهاية السفلية للشق الرأسي الذي يجري في كل حالات التشريح من كل جانب حول الشرفين لأسفل حتى يلتقيا خلف الشرج. بعد ذلك يرفع الجلد والعضلات من فوق الارتفاع العاني ، ثم ينشر جانبي الارتفاع العاني كلا منهما على بعد حوالي ٥ سم من المنتصف وتزال عظام الارتفاع العاني التي نشرت. ثم يتم تعميق الشقوق التشريحية التي أجريت حول الشرفين

ويرفع المهبل والمستقيم والشرج والرحم وأنابيب فالوب والمبيضين كثة واحدة عن البنة لفحصها بمفردها خارج الجنة.

(ج) يفتح المهبل طولياً بالشق على أحد جانبيه ، ويفحص المهبل داخلياً عن السحجات والخدمات والتهتكات والأجسام والسوائل الغريبة والتقوب حيث توصف تلك الإصابات في حالة وجودها وصفاً دقيقاً وتؤخذ عينات من الأجسام والسوائل الغريبة للفحص المعملي.

(د) يلاحظ وجود أي تمزقات أو سحجات أو خدمات بعنق الرحم ، والتي تنتج من استخدام الأدوات الجراحية مثل الملاقط العادية أو الملاقط المسننة. كذلك يبحث عن التقوب عن الرحم التي تنتج من الأدوات الغير طيبة. تلاحظ درجة توسيع عنق الرحم.

(هـ) يفتح الرحم بعد ذلك من أحد جانبيه ، وتقاس أبعاد الرحم ثم يفحص الرحم عن التقوب والخدمات والتهتكات. إن تهتك الرحم قد يكون نتيجة حالة مرضية أو ولادة مبكرة عسرة أو نتيجة حالة إصابية. التهتك المرضي يمكن التوصل إليه من خلال الفحص المجهرى للعينات المأخوذة من الرحم. التهتك الناتج عن حالات الولادة المبكرة العسرة يكون مستعرض الوضع بأسفل الرحم ، أو يكون طولياً ممتد من عنق الرحم متوجهاً لأعلى بأسفل جنبي الرحم نتيجة استعمال الجفت بطريقة خاطئة أثناء الولادة. التهتك الإصابي يكون على شكل ثقب بقاع الرحم نتيجة إدخال أداة أو يكون تمزق غير منتظم الشكل نتيجة ضرب الحامل على بطنها.

في حالة وجود الكيس المشيمي تلاحظ سلامته واتصاله بالغشاء الساقط. إذا لم يكن هناك جنين يفحص جدار الرحم عن أي أجزاء من

الجنين أو المشيمة ومكان المشيمة. في حالة وجود الجنين يفحص فحصاً مستقلاً لتحديد عمره كما سيلي وصفه لاحقاً ، وتحديد حالته المرضية والإصابية.

(و) تفتح قناتاً فالوب ويجمع أي سائل غريب للفحص المعملي ، ثم يفحص المبيضان والجسم الأصفر.

(ز) عند فتح البطن يجب البحث بالتجويف البريتوبي عن الأنفحة والنقحريات التي قد تنتج عن نقب الرحم أو انفجاره أو من جراء انفجار أنبوبة فاللوب. يفحص الكبد والأمعاء عن أي تقويب أو تهتكات أو كدمات. يفحص الغشاء المخاطي المبطن للمعدة عن الاحتقان الذي قد ينشأ عن تناول عقاقير مجهرضة.

(ح) تؤخذ عينات من كل الأعضاء السابق ذكرها حسب المشاهدات. وتؤخذ من الجهة عينات دم وبول وأحشاء (كبد ، معدة ومحوياتها ، كليتين) للتحليل الكيماوي.

#### سدة السائل الأمنيوسي (Amniotic fluid embolism)

يحيط السائل الأمنيوسي بالجنين طوال فترة الحمل ويقدر بحوالي (٦٠٠ - ١٠٠٠) مللي في فترة الحمل الأخيرة ، ويعمل على حفظ الجنين من الصدمات والرضاوض الخارجية ، ويؤمن حركته بصورة حرة ومستمرة.

في ظروف معينة قد يؤدي دخول السائل الأمنيوسي إلى دم الأم إلى وفاتها أثناء الولادة أو أثناء الإجهاض في الفصل الأول والثاني من الحمل أو نتيجة إصابة البطن. يحتوي السائل الأمنيوسي على الخلايا الحرشفية للجنين (lanugo) وزغب الجنين (fetal squamous) ودهون من الطلاء

الدهني (vernix) وعقي (meconium) وخلايا من المشيمة (chorion) والسائل (amnion) والمخاط وبقايا خلايا أخرى. يجب أن تتوافر ثلاثة شروط حتى تحدث سدة السائل الأمينيوسي وهي:-

\* نقب السلي والمشيمة: التداخلات الميكانيكية في أواخر الحمل تفتح جيوب السرير المشيمي مما يؤدي لهروب السائل الأمينيوسي.

\* وجود وريد مفتوح في الرحم أو عنق الرحم. يؤدي انفصال حافة المشيمة وتهتكات الرحم وعنق الرحم أثناء الولادة إلى إحداث فتحة في أوردة رحم الأم خاصة في الولادات السريعة أو المضطربة.

\* وجود فرق في الضغط يكفي لدفع السائل الأمينيوسي نحو الدورة الدموية للأم.

غالباً تتحشر عناصر السائل الأمينيوسي الصلبة في الشعيرات الدموية الرئوية للأم ، ونادراً ما تنتشر بالجهاز الدوري وتتحشر بالكلبيتين والكبد والمخ. تزداد قدرة السائل الأمينيوسي القاتلة داخل دم الأم كلما زادت محتوياته من المواد الصلبة وتصل إلى أقصى مداها عندما يكون السائل غنياً بالعقي السميك. انسداد الأوعية الرئوية بالمواد الصلبة أو الفيبرين (الذى يتكون داخل الأوعية الدموية) يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية الرئوية وارتفاع ضغط الشريان الرئوي وفشل قلبي رئوي حاد ، حيث يحدث فجأة نقص في الأكسجين وانخفاض في ناتج القلب. هذا قد يؤدي إلى وفاة الأم في الساعة الأولى من حدوث السدة في حوالي ٥٥٪ من الحالات ، وإذا لم تتوفى فإنها تتزلف بشدة من الأوعية الدموية المفتوحة بالرحم أو من أي جرح آخر بسبب قصور شديد في قدرة الدم على التجلط الناتج من نقص الصفائح الدموية. سدة السائل الأمينيوسي يمكن علاجها في



شكل (٣٠)

الإجهاض بطريقة الولادة الجزئية



شكل (٣١)

الإجهاض بطريقة الولادة الجزئية



شكل (٣٢) سدة السائل الأمنيوسي تحت المجهر



شكل (٣٣)  
خروج الجنين من الرحم في  
نهاية المرحلة الثانية من  
الولادة

حالات قليلة جداً حيث تصل نسبة الوفيات لها حوالي ٨٠ - ٨٥% من الحالات ، وتعتبر من أهم أقوى مسببات التخثر المنتشر داخل الأوعية الدموية DIC.

كما سبق أن ذكرنا فإن السائل الأمينيوسي تسبح به الخلايا الحرشفية للجنين المنفصلة من جلد الجنين. يعتمد تشخيص سدة السائل الأمينيوسي شرريحاً على فحص نسج الرئتين مجهرياً (شكل ٣٢) للبحث عن هذه الخلايا الحرشفية باستخدام صبغة H&E ، أو الصبغات الخاصة. كذلك يجب في تلك الحالات البحث عن الفيبرين المترسب في أعضاء الجسم المختلفة نتيجة التخثر المنتشر داخل الأوعية الدموية باستخدام صبغات الفيبرين.

في دراسة أجريت على ١٥ حالة وفاة نتيجة سدة السائل الأمينيوسي أثناء وبعد عمليات الإجهاض أظهرت:-

- \* حدوث الوفاة في ٥ حالات قبل نزع الجنين من الرحم.
- \* حدوث الوفاة في ٩ حالات بعد ٤ ساعات من الإجهاض.
- \* حدوث الوفاة في الحالة الأخيرة بعد ٢٤ ساعة من الإجهاض.
- \* ظهرت مظاهر التخثر المنتشر داخل الأوعية الدموية في ٧٥% من الحالات التي عاشت أكثر من ساعة بعد الإجهاض.

\* نادراً ما تحدث تلك السدة في حالات الإجهاض للأجنحة تحت ١٢ أسبوع. تزداد فرصة حدوث السدة في حالات الإجهاض عندما يكون الجنين جاوز ٢٠ أسبوعاً رحميًّا ، ويرجع ذلك لكون حجم السائل الأمينيوسي عند الأسبوع ١٢ من الحمل يكون ٥٠ مللي ويصل إلى ٤٠٠ مللي عند الأسبوع ٢٠ من الحمل.



.



## **الفصل الرابع**

# **الوضع (الولادة)**



## الفصل الرابع

### الولادة (الوضع)

الولادة هي خروج جنين حي كامل الأشهر الرحيمية من الرحم. الولادة الطبيعية هي التي تحدث دون تداخل جراحي بعد حوالي ٤٠ أسبوع حمل. تتم الولادة الطبيعية نتيجة انقباض عضلات الرحم وبمساعدة انقباض عضلات جدار البطن والحجاب الحاجز. الولادة المبكرة هي التي تتم بين الأسبوع ٢٨ - ٣٧ من الحمل. تمر الولادة بثلاثة مراحل وهي:-

- (١) المرحلة الأولى تستمر حوالي ١٤ - ١٦ ساعة للمرأة التي تلد أول مرة وحوالي ٧ - ٨ ساعات للمرأة التي سبق لها الولادة. في هذه المرحلة يتسع عنق الرحم ليصل إلى حوالي ٠ ١ سم في نهاية هذه المرحلة.
- (٢) المرحلة الثانية تستمر ١ - ٢ ساعة للمرأة التي تلد أول مرة وحوالي نصف تلك المدة للمرأة التي سبق لها الولادة. في هذه المرحلة يخرج الجنين من الرحم إلى الحياة (شكل ٣٣).
- (٣) المرحلة الثالثة تستمر حوالي ١٠ دقائق وفيها تخرج المشيمة من الرحم.

### الولادة من الوجهة الطبية الشرعية

أحياناً تعرض امرأة على الطبيب الشرعي بطلب من النيابة العامة وذلك لتحديد ما إذا كانت المذكورة بها علامات تشير للولادة الحديثة من عدمه ، وتشمل تلك الحالات:-

- (١) تحديد علاقة تلك المرأة بطفل حديث الولادة عثر عليه (لقط)، وذلك لبيان ما إذا كانت تلك المرأة ولدت في تاريخ يتفق مع عمر الطفل.

(٢) ادعاء أرملة بأنها ولدت عقب وفاة زوجها وذلك للحصول على ميراث لهذا الطفل من تركة والده.

(٣) في حالات الزنى عندما يكون الزوج بعيداً عن زوجته ويتهماها بالولادة حديثاً.

### علمات الولادة

تُقسم علمات الولادة إلى علمات الولادة الحديثة وعلمات الولادة القديمة. تكون علمات الولادة أكثر وضوحاً كلما قصرت الفترة بين توقيع الكشف الطبي الشرعي وبين الولادة. تختلف قليلاً مشاهدات الولادة بين الأحياء والأموات كالتالي:-

#### أولاً: علمات الولادة الحديثة

يقصد بعلمات الولادة الحديثة العلامات التي تشاهد في الأسبوعين التاليين للولادة.

#### (١) علمات الولادة الحديثة في الأحياء

(أ) الحالة الصحية العامة: تكون الأم التي ولدت حديثاً في حالة إعياء شديد وشاحبة اللون ، ويكون النبض ضعيف وسريع ، مع ارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم.

(ب) الثديان: تظهر بالثديين علامات الحمل السابق وصفتها ، مع ضخامة حجم الثديين التي تقل بعد ٣ أيام من الوضع ، وتمدد الأوعية الدموية السطحية بهما ، ونزول لبن أصفر سميك (اللبا).

(ج) جدار البطن: يتبع جدار البطن وترتخى عضلاته ، وتظهر به خطوط بيضاء (تنتج من التئام خطوط الحمل الحمراء) ، وكذلك يظهر خط أسود بين السرة والعانة.

(د) المهبل والشفران الغليظان: يشاهد بهم تورم وتكلم واحتقان ، وارتخاء بجدار المهبل ، وأحياناً تمزقات و خاصة في الولادة الأولى والتي قد تصل لمنطقة العجان (منطقة العجان هي المنطقة التي تقع بينخلفية المهبل وفتحة الشرج). نزول الجنين خلال المهبل يؤدي إلى تمزق كامل بغشاء البكارة الذي يتبقى به الزوائد الآسية فقط. ينساب سائل النفاس من فتحة المهبل الذي يكون أحمر اللون لمدة ٥ أيام ثم يصبح أصفر اللون لمدة ٥ أيام أخرى إلى أن يختفي تدريجياً في حوالي أسبوعين بعد الولادة.

(هـ) عنق الرحم: تكون متورمة ومتسبة حيث تسمح بمرور إصبعين بعد الولادة مباشرة. أحياناً يشاهد بها أيضاً تمزق سطحي وتكلم. يقل اتساع فتحة عنق الرحم تدريجياً بمرور الوقت حيث تسمح بمرور إصبع بعد حوالي أسبوع من الولادة ، إلى أن تصبح مغلقة ومستعرضة الوضع بعد حوالي أسبوعين من الولادة. فتحة عنق الرحم بالفتاة العذراء أو المرأة التي لم تلد تكون ضيقة ومستديرة.

(و) الرحم: يكون الرحم بعد الولادة كبير الحجم وجاف القوام ثم يبدأ حجمه في الانكماش بمقدار حوالي اسم يومياً ، وبالتالي يصغر حجم الرحم بمرور الوقت ويتغير مكان الإحساس به من خلال جدار البطن كالتالي:-

\* يحس في مستوى السرة بعد الولادة مباشرة.

\* يحس في منتصف المسافة بين السرة والعانة بعد حوالي أسبوع من الولادة.

\* يختفي الرحم خلف العظم العاني بعد أسبوعين من الولادة.

\* يعود إلى حجم يقترب من الطبيعي بعد ستة أسابيع من الولادة.

(ز) اختبار الحمل: يظل اختبار الحمل ايجابي لمدة حوالي أسبوعين بعد الولادة.

## (٢) علامات الولادة الحديثة في المتوفيات

تكون علامات الولادة في المتوفيات تماثل تلك المشاهدة بالأحياء ، ولكن يضاف إليها المشاهدات التشريحية وخاصة بالرحم كما يلي:-

### (أ) وزن الرحم وطوله

- \* عقب الولادة يزن الرحم حوالي ١٠٠٠ جرام وطوله حوالي ٢٥ سم.
- \* بعد أسبوع من الولادة يصبح وزن الرحم حوالي ٥٠٠ جرام وطوله حوالي ١٢ سم.
- \* بعد أسبوعين من الولادة يصبح الوزن حوالي ٣٠٠ جرام وطوله حوالي ١٠ سم.
- \* بعد شهر يصبح وزن الرحم ١٠٠ جرام وطوله حوالي ٨ سم.
- \* وزن رحم العذراء والمرأة التي لم تلد يكون ٤٠ - ٥٠ جرام وطوله حوالي ٦ سم ، أي إن رحم الحامل لا يعود لحجمه الطبيعي كما كان عند العذراء.

### (ب) قطر مكان انفصال المشيمة بجدار الرحم

- \* بعد الولادة مباشرة يكون قطر مكان انفصال المشيمة بجدار الرحم حوالي ٠ سم.
- \* بعد أسبوع من الولادة يصبح قطره حوالي ٦ سم.
- \* بعد أسبوعين من الولادة يصبح قطره حوالي ٤ سم.
- \* بعد شهر من الولادة يصبح قطره حوالي ٢ سم.

## ثانياً: علامات الولادة القديمة

### (١) علامات الولادة القديمة في الأحياء

بالرغم من اختفاء التورم والتورم والاحتقان والانتزفة والتكمدات المصاحبة للولادة الحديثة بمرور الوقت فإن الولادة تترك آثار مستديمة بالمرأة لا تزول وهي ما تسمى علامات الحمل القديمة وتشمل:-

\* يتدلى الثديان ويصبح جلادهما متكرماً ، مع تضخم الحلمة وجود حالة سوداء داكنة حولها ، ووضوح حبيبات مونتجمي.

\* يرتخي جدار البطن ، وتظهر تشققات الحمل بجوانب وأسفل البطن ، ووجود خط أسود رأسى الوضع على الخط المنصف للبطن بين السرة والعانة.

\* في الأعضاء التناسلية يتسع المهبل ، ويتبعده الشفرين الغليظين ، ويزول غشاء البكارة ويتبقى منه فقط بقايا قليلة تسمى زوائد آسية ، وتصبح فتحة عنق الرحم مستعرضة الوضع ، وقد تشاهد أثر التئام للتمزقات التي حدثت أثناء الولادة.

### (٢) علامات الولادة القديمة في المتوفيات

تكون علامات الولادة في المتوفيات تماثل تلك المشاهدة بالأحياء ، ولكن يضاف إليها المشاهدات التشريحية وخاصة بالرحم كما يلي:-

\* وزن الرحم حوالي ١٠٠ جرام وطوله حوالي ٨ سم.

\* طول جسم الرحم يبلغ ضعف طول عنق الرحم ، بينما يتساوى طول جسم الرحم مع عنقه في السيدات اللاتي لم تحمل.

\* فتحة عنق الرحم على هيئة شق مستعرض الوضع ، بينما تكون مستديرة ضيقة في السيدات اللاتي لم تلد.

- \* عنق الرحم يصبح أملس وتزول منه ثنيات الغشاء المخاطي الطبيعية المبطنة لعنق الرحم في السيدات اللاتي لم تلد.
- \* تجويف الرحم يصبح كروي الشكل بعد أن كان كمثري الشكل في اللاتي لم يحملن.
- \* مكان النصاق المشيمية بالغشاء المبطن للجدار الخلفي لتجويف الرحم يكون لونه أحمر قاتم ومرتفع قليلاً عن باقي جدار الرحم. بعد ستة أشهر من الولادة يصبح لونه مماثلاً للون الغشاء المبطن للرحم. الفحص المجهري لهذا الموضع يظهر آثار التهاب انسدادي بالشرابين يستمر لعدة سنوات بعد الولادة.

**الفصل الخامس**

**قتل المواليد  
حليثي الولادة**



## الفصل الخامس

### قتل المواليد حديثي الولادة Infanticide

اختلفت التشريعات العالمية في تحديد الفترة الزمنية التي يعتبر خلالها الطفل حديث الولادة: حيث اعتبرها القانون البلجيكي يوم واحد ، واعتبرها القانون الدنمركي يومين ، وحددها القانون الفرنسي بثلاثة أيام ، وحددها القانون السوداني بثمانية أيام ، بينما ذهب القانون الإنجليزي لأطول مدة حيث اعتبر الطفل حديث الولادة حتى نهاية العام الأول من عمره. يعتبر الطفل حديث الولادة في القانون المصري منذ ولادته وحتى خمسة عشر يوم ، وهو موعد سقوط الحبل السري وتكونين السرة. تزهق روح هذا الطفل بأي صورة من صور القتل سواء كانت إيجابية أم سلبية. تحدث هذه الجريمة في معظم أنحاء العالم وبين كافة الأوساط الاجتماعية ، سواء كانت أوساط فطرية أو أوساط رفيعة التقافة. هذه الجريمة تحدث غالباً بعد الفشل في إحداث الإجهاض للحامل سفاحاً. بعد انتشار العيادات السرية التي تجري عمليات الإجهاض بدأت هذه الجريمة تقل في المستويات المرتفعة الدخل المادي وذلك لقدرتها المادية على إجراء عملية الإجهاض مهما كانت تكلفتها باهظة.

الجريمة تمس الشرف والسمعة ولذلك فهي تحدث في سرية تامة وتم عن طريق أسرة الفتاة التي حملت سفاحاً أو الفتاة نفسها ، وتسمى Filicide إذا قام بها أحد الأبوين. غالباً تكون الأم عمرها أقل من ٢٥ سنة وغير متزوجة وغير متعلمة. مثلاً حدثت عملية القتل في سرية فإن إلقاء الطفل في مكان مهجور للتخلص منه يحدث أيضاً في سرية تامة. معظم الأسر تفضل قتل المولود بدلاً من تركه حياً وذلك لأن الطفل الحي قد

يصدر أصواتاً أثناء حمله في الطريق للتخلص منه ويلفت النظر إلى الجناة عند إلقائه.

لا يوجد بالقانون المصري تشريع خاص لجريمة قتل الطفل حيث الولادة حيث يعتبر القانون المصري هذه الجريمة مساوية لجريمة قتل البالغ ، ولا يفرق القانون بين قتل الوليد عن طريق الأم أو عن طريق أي شخص آخر.

### أسباب قتل المواليد حديثي الولادة

#### (١) التخلص من المولود الناتج من حمل السفاح

عند فشل الفتاة التي حملت سفاحاً في التخلص من الحمل الغير شرعي عن طريق الإجهاض فإنها قد تلجأ لقتل المولود ، مهما كان جنسه (ذكر أو أنثى) وذلك للتخلص من آثار وعارض الحمل الغير شرعي. بعض الدول مثل سوريا والكويت ولبنان وإيطاليا تخفف عقاب الأم القاتلة لإنقاء العار وذلك لحالتها النفسية السيئة لحظة الولادة حيث تكون واقعة تحت تأثير إكراه معنوي وتل أحدها لعنة العار فتتولد لديها رغبة ملحة للتخلص من الطفل قبل افتتاح أمرها وانتشار خبر ولادتها بين الناس.

#### (٢) إنقاء جنس المولود

جريمة قتل المواليد الأنثوية هي جريمة تقوم على أساس تفضيل المولود الذكر على الأنثى ، وهو ما كان يسمى وأد الإناث في الجاهلية والذي نهى عنه الإسلام. تحدث جريمة قتل الطفلة الأنثى حديثة الولادة في بعض أقطار العالم وخاصة في الهند والصين ، وذلك لأسباب كثيرة منها:-

## (أ) ضعف قدرة الأنثى على الكسب المادي

الرجال أكثر قدرة على جني المال لأنهم أكثر قابلية للعمل وأجورهم مرتفعة عن أجور النساء لنفس الوظيفة ، ولذلك فإن دخل الرجل المادي المتوقع الذي سوف يعود على العائلة في المستقبل يجعل المولود الذكر أقل عرضة للقتل من المولودة الأنثى. تعتبر هذه المجتمعات المولودة الأنثى كارثة اقتصادية تستنزف موارد الأسرة أثناء تربيتها دون فائدة اقتصادية مستقبلية متوقعة تعود عليها.

## (ب) عطاء الرجل لأسرته أكثر من المرأة

في العديد من المجتمعات يعتمد الآباء على أولادهم لرعايتهم عند بلوغهما الكبر. لكن في العديد من المجتمعات تترك البنت بعد زواجها عائلتها وترتبط ارتباطاً شديداً بعائلة زوجها ، فلا تساعد عائلتها مالياً أو صحياً نظراً لبعدها عن منزل العائلة. لذلك عندما تكون الأسرة ضعيفة الموارد المادية ولا تستطيع الإنفاق على عدة أبناء فإنها تفضل المولود الذكر وتتخلص من المولودة الأنثى ، لأنها تعتبر البنت وديعة تابعة لأسرة أخرى ستذهب إليها عند زواجهما.

## (ج) ارتفاع تكاليف زواج الإناث

في بعض الدول مثل الهند يقوم والد العروس بدفع مهر يتكون من مبلغ نقدي كبير وبضائع قيمة إلى العريس وأهله. عندما تكون الأسرة ضعيفة الموارد المادية ولا تستطيع دفع مهور عدة فتيات فإنها تفضل المولود الذكر وتتخلص من المولودة الأنثى تفادياً لدفع مهرها في المستقبل عند زواجهما. يشير تقرير الأمم المتحدة الصادر في ٢٧/١٠/٢٠٠٣م إلى أن نسبة البنات للبنين الذين نقل أعمارهم عن ست سنوات في الهند هي ٩٢٪

: ١٠٠٠ وذلك بسبب إجهاض الإناث أو الوأد الانتقائي لهن. كما ورد بهذا التقرير تدني تلك النسبة في بعض الولايات الهندية مثل بنجاب وهاريانا إلى ٨٠٠ أنثى : ١٠٠٠ ذكر.

#### (د) القوانين الحكومية

بعض القوانين الحكومية تساعد على التخلص من المواليد الإناث ، وذلك مثل قانون سياسة الطفل الواحد للأسرة الصينية. نظراً لكون الأسرة الصينية تفضل أن يكون المولود الوحيد ذكر ليحمل أسم الأسرة والحفاظ على أسم العائلة ، فإن هذا القانون أدي إلى موجة اندفاع نحو قتل الأجنة الإناث بعد تشخيصها بالأشعة التليفزيونية ، وهو ما دفع الحكومة الصينية إلى حظر إجراء تلك الأشعة أثناء الحمل إلا في الحالات الطارئة التي تستدعي ذلك. ترتب على هذا الحظر ظهور سوق كبير سري بين الأطباء في الصين لمعرفة جنس الجنين أثناء الحمل بمبالغ كبيرة وذلك للتخلص من الجنين الأنثى عن طريق الإجهاض. لكن الأسرة التي لا تستطيع تدبير المبالغ الكبيرة لتلك الأشعة فهي تنتظر الحمل ، فإذا كانت مولودة أنثى يتم التخلص منها.

#### (٣) الاعتقاد بالمولود الشرير

بعض المعتقدات عند بعض المجتمعات تدفعهم في ظروف معينة للتخلص من المولود ، مهما كان نوع جنسه. في شمال جمهورية بنين الأفريقية يتم قتل المولود للتخلص منه باعتباره روح شريرة في الأحوال التالية:—

\* نزول المولود بأي جزء من جسده عدا الرأس ، مثل نزوله بالقدم أو الأكتاف أو الآذنين.

- \* نزول المولود برأسه ولكن مع توجه الوجه ناحية الأرض.
- \* وفاة الأم أثناء الولادة.
- \* عدم بزوغ أول سنة للمولود حتى سن ثمانية أشهر.
- \* بزوغ أول سنة للمولود بالفك العلوي.

في كل الأحوال السابقة يعتبر هذا المولود ساحر وملعون وروح شريرة غير مألوفة انحرفت عن الأمور الطبيعية ويجب التخلص منها. إذا كان الأبوان رحيمين يتركا الطفل داخل أغصان شجيرة كثيفة ليموت من الجوع والبرد. أما إذا كان الأبوان ملتزمين بتطبيق المعتقدات يأخذوا الطفل شخص متخصص للقضاء على هذا الطفل من خلال ربط قدمي المولود ثم يدور هذا الشخص عدة مرات حول شجرة ثم يدفع رأس المولود بعنف بجذع الشجرة مما يؤدي إلى تحطيمها والوفاة. لا يوجد قانون في بنين يعاقب على هذه الجريمة.

#### (٤) التمييز الطيفي

أحياناً يتزوج رجل من وسط اجتماعي بسيط من فتاة من الطبقة الأرستقراطية دون علم أسرتها ، والعكس صحيح. لذا عند ولادة هذا الطفل غالباً تتخلص الأسرة الأرستقراطية من هذا المولود للتخلص من عار هذه الزبحة حسب رأيهما.

#### (٥) القتل الرحيم للأطفال

القتل الرحيم للطفل هو تسهيل موت الطفل الميؤوس من شفائه بناء على طلب أهله. أحياناً يولد طفل به تشوهات خلقيّة شديدة. التشوهات الخلقيّة عديدة وقد يكون فيها الجنين واحداً في الأصل وحدثت به تشوهات أنسنة نموه بالرحم ويولد ويعيش دون أمل في شفائه ، أو قد يكون هناك

اتحاد لأكثر من جنين مع بعضهم البعض وهو ما لا يتفق مع الحياة حيث يولد الطفل ميتاً أو يتوفى بعد الولادة مباشرة. لذا تحاول الآن بعض الدول (مثل هولندا) إصدار قوانين القتل الرحيم للأطفال الأحياء المشوهين. حالياً يقوم بعض الآباء والأمهات بالتخليص من هؤلاء المواليد ذوي التشوهات الخلقية سواء بالترك ( فعل سلبي ) أو القتل ( فعل إيجابي ).

#### (٦) اكتئاب بعد الولادة Postpartum depression

حوالي ٨٠٪ من السيدات تعاني من تغيرات مزاجية طفيفة بعد الولادة. حوالي ٢٢٪ من السيدات تعاني من اكتئاب بعد الولادة. في حالات نادرة (حالة واحدة لكل ٥٠٠ حالة ولادة) تعاني المرأة من اضطراب عقلي شديد (ذهان) ، الذي تزول أعراضه في معظم الحالات بعد عدة أيام من الولادة. في بعض تلك الحالات المرضية الشديدة قد تقتل الأم ولديها نتيجة الأضطرابات الهرمونية بجسدها المصاحبة للحمل والولادة والإرضاع.

توافق ٢٩ دولة على مستوى العالم على عدم مسؤولية الأم عن قتل ولديها لكونها تعاني من مشكلة طبية نفسية وهي اكتئاب بعد الولادة. من بين تلك الدول بريطانيا وكندا وإيطاليا واستراليا. في عام ١٩٣٨م صدر قانون في بريطانيا ينص على (عندما تسبب امرأة نتيجة عمل مقصود أو إهمال بموت طفلها الذي لم يبلغ عام من العمر ، ونظراً لأن التوازن العقلي عندها في حالة اضطراب ناجم عن كونها أنجبت ولدًا أو تحت تأثير الإرضاع تعامل كما لو أنها ارتكبت جريمة قتل غير مقصود).

قد يكون أحد الأبوين يعاني من اضطراب نفسي وتنولد لديه كراهية شديدة للطفل لأي سبب مثل بكاءه المتكرر فيقتل هذا الطفل. قد يقتل أحد الأبوين المضطرب نفسياً الطفل انتقاماً من شريكه الآخر ، لأن قتل الأم ولیدها انتقاماً من زوجها.

الأسئلة التي يجب أن يجيب عليها الطبيب الشرعي عند تشريح جثة طفل حديث الولادة تشمل:-

- \* هل توجد علامات استعراف بالجثة وما حولها.
- \* هل ولد حيا أم ميتاً.
- \* تحديد عمر الجنين.
- \* هل يمكن تحديد طبيعة عملية الولادة.
- \* مدة بقاء الجنين علي قيد الحياة بعد الولادة.
- \* سبب الوفاة.
- \* الزمن المنقضي بين حدوث الوفاة ووقت التشريح.

جثة اللقيط تعتبر من أصعب الجثث التي يتعامل معها الطبيب الشرعي وذلك لأنها تتطلب الرد على التساؤلات الهامة السابق ذكرها ، والتي غالباً يصعب الرد عليها نظراً للعثور على جثمان اللقيط في حالة تعفن رمي متقدم (شكل ٣٤).

#### أولاً: هل توجد علامات استعراف بالجثة وما حولها

علامات الاستعراف تستقي من التحقيقات والمعاينة والكشف الظاهري والصفة التشريحية للجثمان ، وتشمل:-  
(١) مكان وتاريخ العثور على اللقيط.

(٢) حالة القميط وقت العثور عليه: كان داخل كرتونة مثلاً (توصف الكرتونة وصف دقيق) أو لف بملابس أو أغطية (توصف أغطية القميط وصف دقيق من حيث ألوانها ونوعيتها وعدد طبقاتها وأي كتابة موجودة عليها وخاصة اسم مستشفى أو ما شابه ذلك). إذا كان ملفوف في ورق جرائد يبحث عن اسم الجريدة وتاريخ صدورها.

(٣) وصف الملابس الموجودة التي يرتديها القميط: غالباً تكون تلك الجثة عارية عن الملابس. في حالة وجود ملابس توصف وصف دقيق من حيث نوعها ، وألوانها ، وهل هي ملابس جاهزة أم تفصيل ، وأسم المصنع وأي علامة مميزة.

(٤) الكشف الظاهري للجثمان يمكن من خلاله تحديد ما يلي:-

- \* جنس القميط (ذكر أم أنثى).
- \* طول الجثة.
- \* وزن الجثة.
- \* لون شعر الرأس ولون البشرة.
- \* أي علامات مميزة.
- \* أي تشوهات خلقية أو مظاهر مرضية أو إصابية.
- \* طول الحبل السري المتبقى بالجثة ، وهل هو كامل ومرتبط بالمشيمة أم مقطوع. وفي حالة قطعه يحدد القطع هل هو قطع حاد أم غير منظم الحواف ، وهل هو مربوط أم لا (شكل ٣٥). إذا كان مربوط توصف أداة الربط (خيوط جراحية أم رباط شاش أم يوجد حوله مشبك حبل سري). قد نستطيع من خلال الفحص الجيد لطريقة ربط الحبل السري




شكل (٣٤) لقط عثر عليه متوفى وهو في حالة تعفن رمى متقدم يتضح على هيئة إسوداد البشرة وتفلس الجلد ونخر دودي بالإضافة لنهاش حيوانى بالفخذ الأيسر



شكل (٣٥)  
حبل سرى مقصول عن المشيمة وغير مربوط



شكل (٣٦)  
الطريقة الطبية لفصل وربط الحبل السرى



شكل (٣٧)  
تقرح مكان السرة يشير الى مرور حوالي أسبوع من ولادة الطفل

تحديد ما إذا كان الشخص الذي قام بالربط متخصص أو على الأقل لديه دراية طبية (شكل ٣٦).

\* توصف المشيمة في حالة تواجدها من حيث قطرها ، وما إذا كان بها أي مظاهر مرضية واضحة مثل الاحتشاءات المشيمية التي قد تسبب وفاة الجنين.

#### (٥) بصمة الحمض النووي:-

تؤخذ عينات من اللقيط لاستخلاص الحمض النووي تمهيداً لمقارنتها مع الأم المشتبه بكونها والدة هذه اللقيط. أصبح هذا الاختبار ضروري لكونه يعطي نتائج مؤكدة لا تحتمل اللبس.

#### ثانياً:- هل ولد حبا أم ميتا

تقسم علامات حياة اللقيط إلى أدلة غير طبية (أدلة ترجيحية) وأدلة طبية (أدلة تأكيدية).

#### الأدلة الغير طبية الدالة على الحياة:- تشمل ما يلي:

\* سماع بكاء الطفل أو مشاهدة حركة أطرافه أو عينيه عن طريق شهود رؤية لعملية الولادة.

\* غسل الجلد وإزالة الطبقة الدهنية التي تغطي الجسد عند الولادة.

\* مشاهدة براز أصفر في الملابس الداخلية للطفل.

#### الأدلة الطبية

بعد الولادة يتفسس المولود مما يحدث تغيرات بالرئتين ، وكذلك تشاهد آثار الرضاعة وتغيرات بالحبل السري والجلد والأوعية الدموية وهي دلائل جماعها تؤكد ولادة الطفل حيا. كذلك يمكن من خلال هذه العلامات تحديد الفترة الزمنية لحياة المولود.

## (١) مظاهر التنفس

تعتبر علامات التنفس أهم علامات تدل على الحياة لأن باقي العلامات تحتاج إلى بعض الوقت لمشاهدتها ، وغالبا يتم قتل المولود في الساعات الأولى بعد الولادة وقبل ظهورها. أما التنفس فلا بد من حدوثه (إذا ولد حيا) قبل الشروع في القتل. مظاهر التنفس تشمل:-

### (أ) النظر بالعين المجردة للرئتين

\* في حالة عدم التنفس (أي نزول الجنين ميت) تظهر الرئتين صغيرتين في الحجم ، ومنكمشتين بخلفية الصدر بجوار العمود الفقري ، ولا يملآن التجويف الصدري ، ولا تغطيان القلب وغدة التيموس (Thymus gland) ، وحوفيهما حادة ، ولهم لونبني محمر متجانس يماثل لون الكبد (متكتبات) ، وبالضغط عليها تكون صلبة القوام ولا يحس بأزيز الهواء (صوت فرقعة) في نسيجهما ، وزنها حوالي ٤٠ جرام وهو ما يمثل حوالي ١ : ٧٠ من وزن الجسم.

\* إذا ولد الطفل حيا وتتنفس تملئ أنسجة الرئتين بالهواء ويسير الدم بأوعيتها الدموية مما ينتج عنه تغيرات التنفس التي تشمل كبر حجم الرئتين بحيث تملآن التجويف الصدري وتغطيان القلب وغدة التيموس ، وتصبح حوفيهما مستديرة ، ولونهما يصبح مبقع يتكون من اللون الأحمر مع بقع بيضاء (أو لون فاتح) ، وبالضغط عليهما يحس بقوام إسفنجي وأزيز الهواء في نسيجهما ، ويزاد وزنها (بسبب زيادة الحجم الوعائي للرئتين) ويصبح حوالي ٨٠ جرام وهو ما يمثل حوالي ١ : ٣٥ من وزن الجسم.

\* التنفس الجرئي يعطي تغيرات وسطية بين حالي التنفس وعدم التنفس حيث تظهر الحواف الأمامية وأحيانا الحافة الحجابية الأمامية

والحافة الأنسيّة أكثر تمدداً وبلون أفتح من الحواف الخلفية مع سماع صوت الفرقعة في تلك الأجزاء فقط.

\* إنعاش المولود من فم لفم أو بالضغط على الصدر أو إعطاء الأوكسجين يؤدي إلى نفخ الرئتين بالهواء سواء ولد حياً أو ميتاً.

\* عند وجود أي شك في مظاهر التنفس (وهو شيء كثير الحدوث) يجب أن تفسر النتائج إلى عدم تنفس المولود.

#### (ب) الفحص المجهري للرئتين

\* في حالة عدم التنفس تكون خلايا الرئة مكعبة بينها عدد قليل من الشعب الهوائية. إذا حدث التنفس تتمدد الأسنان تتمدد تماماً وتصبح لها بطانة من الخلايا المسطحة.

\* ما زالت نتائج الفحص المجهري للرئتين مثيرة للجدل لوجود حالات تضرب بالقاعدة السابق ذكرها عرض الحائط حيث وجد أن التمدد التام للأسنان (alveoli) يمكن أن يحدث في فترة الحمل الأخيرة وقبل الولادة (أي أن مظاهر التنفس قد تشاهد في مولود ولد ميتاً ولم يتفس). لذلك يرى بعض العلماء أن التمدد التام للأسنان وعدم وجود خلايا مكعبة تعني فقط أن الجنين في الثلث الأخير من درجة نضجه ولا تعني أنه ولد حياً وتنفس.

#### (ج) اختبار تعوييم الرئتين (Hydrostatic test)

\* فكرة هذا الاختبار تعتمد على الكثافة النوعية للرئتين. الرئة المنتفسة للهواء تمتليء بالهواء فتقل كثافتها النوعية فتطفو على سطح الماء. أما الرئة التي لم تتنفس فإنها تغطس تحت الماء في قاع الإناء.

\* يرفع اللسان والمرئ والقصبة الهوائية والرئتين والقلب كتلة واحدة مع بعضها البعض ، وتوضع في وعاء عميق ممتئ بالماء وستشاهد أحد المشاهدات التالية:—

— طفو كتلة الأعضاء بأكملها فوق السطح الماء وهو دليل على حدوث التنفس الكامل.

— إذا غطست كتلة الأعضاء تحت سطح الماء تفصل الرئتين وتقطع إلى قطع صغيرة وتوضع في الإناء ، فإذا :—

# طفت بعض الأجزاء وغطست أجزاء أخرى دل ذلك على حدوث تنفس جزئي وهو ما يعني أن الجنين ولد حيا وعاش لحظات أو بضع دقائق ثم توفي.

# غطست كل الأجزاء دل ذلك على عدم تنفس الرئتين نهائيا ، وهو ما يعني ولادة الطفل ميت.

#### النتائج الخاطئة لاختبار تعويم الرئتين:—

\* إذا كانت جثة اللقيط ظهرت فيها بداية مظاهر التعفن الرمي فقد يعطي هذا الاختبار نتائج خاطئة. التعفن يملئ الرئتين بغازات التعفن الرمي مما يؤدي إلى طفوهما ، سواء كان اللقيط ولد حيا وتنفس أم ولد ميتا. لذا يفضل دائما وضع قطع الرئتين داخل قطعة شاش والضغط عليها بشدة بين اليدين (يجب عدم ضغطها تحت القدمين كما تذكر معظم مراجع الطب الشرعي حفاظا على آدمية اللقيط) قبل وضعها في الماء للتأكد من طرد أي هواء يكون ناتج من غازات التعفن الرمي. فإذا طفت قطع الرئتين بعد الضغط عليهما دل ذلك على حدوث التنفس ولو لادة الطفل حيا ، حيث إن الضغط يخرج غازات التعفن الرمي من الرئتين ولا يخرج هواء

التنفس. يجب عدم إجراء هذا الاختبار إذا كانت الجثة في حالة تعفن رمي متقدم مثل تفاس الجلد وانتشار الشجرة الرممية وانتشار الديدان الرممية على سطح الجثة لأنه سيعطي نتائج خاطئة. عموماً يجب عدم إجراء هذا الاختبار إذا مضي نصف يوم في الجو الحار على الوفاة أو مضي يوم كامل في الشتاء دون حفظ الجثة في الثلاجة لمنع دخول التعفن الرمي.

\* قد تكون الرئتين التي تنفست تعاني من حالة مرضية مثل الالتهاب الرئوي أو تليف خلقي ، مما قد يؤدي إلى غطس الرئتين بالرغم من كون اللقيط ولد حيا وتنفس تففس كامل.

\* نظراً لتلك النتائج العكسية الخاطئة لاختبار تعويم الرئتين التي قد تشاهد في بعض الحالات ، لذلك يجب عدم الاعتماد فقط على هذا الاختبار بل يجب أن نعتمد أساساً على التغيرات المشاهدة بالرئتين بالعين المجردة.

#### (د) تغيرات الحجاب الحاجز

قبل تنفس المولود تكون أعلى نقطة من تقرر الحجاب الحاجز في مستوى المسافة الضلعية الرابعة ، أما في حالة التنفس وامتلاء الصدر بالهواء تهبط أعلى نقطة من تقرر الحجاب الحاجز في مستوى المسافة الضلعية السادسة. إذا ظهرت علامات التعفن الرمي بالجثمان فتصبح تلك المشاهدة ليست ذات قيمة.

#### (٢) تغيرات الحبل السري

يعتبر الحبل السري حلقة الوصل بين الجنين وأمه ، إذ يتم عبره توصيل جزء كبير من تغذية الجنين وسحب فضلاته. يتكون الحبل السري من نسيج يضم أوعية دموية عبارة عن شريانين ووريد ، ومعدل طوله حوالي ٥٠ سنتيمتراً وعرضه حوالي سنتيمترتين عند ولادة المشيمة

وانفصالها عن بطانة الرحم. بعد الولادة يتم قطع الحبل السري على بعد حوالي ٤ - ٥ سم من موضع السرة ببطن المولود. إن قطع الحبل السري يؤدي إلى قطع الأوعية الدموية المغذية له ويحدث التغيرات التالية:-

(أ) توقف مرور الدم بالحبل السري يؤدي إلى جفافه. يبدأ الجفاف بطرف الحبل السري السائب بعد حوالي ٢٤ ساعة من قطعه ، ويتبعه جفاف باقي الحبل السري في غضون ٣ - ٤ أيام ليصبح ذابلاً داكن اللون مع تلاشي تجويفه والتصاق جدره ببعضها البعض.

(ب) نقطة التقاء الحبل السري ببطن المولود تسمى قاعدة الحبل السري. تحدث تغيرات بمرور الوقت بهذه القاعدة وهي علامات حيوية تدل على ولادة الطفل حيا ، وكذلك تساعد في تحديد الفترة الزمنية التقريبية لبقاء المولود على قيد الحياة وتشمل تلك التغيرات:-

\* تظاهر دائرة حمراء بالجلد تلتف حول قاعدة الحبل السري بعد حوالي يوم من الولادة.

\* تترفع هذه الدائرة الحمراء مع خروج إفراز مصلي قليل بعد حوالي يومين من الولادة.

\* يسقط الحبل السري بالكامل بعد حوالي أسبوع من الولادة ويترك مكانه السرة متقرحة (شكل ٣٧) وعارية من الجلد.

\* بعد ذلك تلتئم السرة في غضون حوالي أسبوعين من الولادة.

### (٣) تغيرات الجلد

جلد المولود يكون شديد الاحمرار بعد الولادة ومحاط بطبقة دهنية بيضاء لزجة. يزول الاحمرار بمرور الوقت ، بينما تجف الطبقة الدهنية وتبدأ في التنشير بعد حوالي يوم من الولادة. ينشر أولاً جلد الصدر والبطن

بعد يومين ، ثم ين Shr الجلد بباقي أجزاء الجسم ويكتمل في غضون أسبوعين من الولادة.

#### (٤) تغيرات الأوعية الدموية

أثناء وجود الجنين داخل الرحم لا تقوم رئتيه بأي وظيفة لتنقية الدم نظراً لاعتمادها على الدم النقي الوارد من الأم. يتم توزيع الدم النقي الوارد من الأم من خلال فتحتين بالجنين: الأولى عبارة عن قناة شريانية تصل بين شريان الأورطي والشريان الرئوي (*ductus arteriosus*) ، والثانية في الحاجز بين أذيني القلب وتسمى الفتحة البيضاوية (*foramen oval*). بعد الولادة ومع أول تنفس يبدأ المولود في الاعتماد على رئتيه في تنقية الدم ، وبالتالي تحدث التغيرات التالية:-

\* تغلق القناة الشريانية بعد حوالي ٦ ساعات من الولادة ، ثم تحول

إلي نسيج ليفي بعد حوالي أسبوعين من الولادة.

\* تبدأ الفتحة البيضاوية في الانغلاق تدريجياً ويكتمل إغلاقها بعد

حوالي أسبوع من الولادة.

#### (٥) علامات الرضاعة

علامات الرضاعة تظهر على هيئة وجود لبن أو لبأ في المعدة ، وهي

علامة أكيدة على ولادة الطفل حيا ، وتشخص من خلال:-

\* اللبن أو اللبأ يظهر بالعين المجردة على شكل كتل صغيرة متجبة.

يجب الحذر من اعتبار المخاط الذي قد يوجد في معدة بعض المواليد أمواطا على إنه لبن أو لبأ.

\* مجهرياً يظهر اللبن أو اللبأ على شكل نقط دهنية.

\* وجود براز أصفر بالأمعاء الغليظة.

(٦) وجود أي مظاهر إصابية حيوية حدثت للمولود أثناء عملية الولادة  
تشير إلى ولادته حيًا.

(٧) وجود مظاهر تعارض مع الحياة مثل:-

(أ) التعطن نتيجة وفاة الجنين داخل الرحم:

\* إذا توفى الجنين داخل الرحم وظل لعدة أيام ( حوالي أسبوع )  
متوفياً داخل الرحم تظهر عليه أعراض التعطن على هيئة تحول لون  
الجسم إلى لون أسمراً محمر ( مختلفاً عن اللون الأخضر المسمى المصاحب  
للتعفن ) ويصبح سطح الجثة لزجاً وبه فقاعات غازية ، وتصبح المفاصل  
مرتخية جداً وتترسخ على طاولة التشريب وتترافق عظام الجمجمة ( أي  
عند مسك الرأس باليدين تحس عظام قبوة الجمجمة فوق بعضها البعض )  
وهو ما يسمى عند مشاهدته شعاعياً عالمة سبولدينج Spaulding's sign  
التي تعتبر عالمة مميزة للتعطن .

\* بينما إذا ظل الجنين متوفياً داخل الرحم لمدة يومين أو ثلاثة أيام  
فقط فإن مظهراً يكون طبيعياً باستثناء وجود ليونة عامة بالجسد ظاهرياً  
وتحل عام بالخلايا مجهرياً .

(ب) التشوهات الخلقية:

بعض التشوهات الخلقية ( شكل ٣٨ ) تكون كفيلة بمفردها في إحداث  
الوفاة مثل غياب الرأس anencephaly ( شكل ٣٩ ) أو استنسقاء الدماغ  
( hydrocephalus ) أو الحالات المتقدمة من التشوه الخلقي المسمى الظهر  
المشقوق ( severe spina bifida ).



شكل (٣٨) —————  
تشوهات خلقية  
تتعارض مع الحياة



شكل (٣٩) —————  
تشوهات خلقية تتعارض  
مع الحياة



(ج) عدم اكتمال الأشهر الرحمية للجنين (شكل ٤٠ ، شكل ٤١):  
 إن ولادة جنين لم يبلغ الشهر السابع الرحمي (شكل ٤٢) يجعل فرصته في الوفاة عقب الولادة عالية جداً بسبب عدم نضوج أجهزة الجنين ووظائفه الحيوية. إن مشاهدة التعفن أو هذه التشوّهات الخلقية أو الجنين الذي لم يبلغ سبعة أشهر رحمية لا يتفق مع ولادة طفل حي.

### ثالثاً: تحديد عمر الجنين

تحديد عمر الجنين ضروري لتحديد ما إذا كانت هناك قضية قتل من عدمه ، وذلك لأن الجنين الذي يكون عمره الرحمي أقل من ٢٤ أسبوع هو جنين غير قابل للحياة ، وبالتالي فلا توجد إدانة بجريمة قتل إذا كان المولود عمره الرحمي أقل من ٢٤ أسبوع. يمكن من خلال إجراء الصفة التشريحية للجنين تحديد عمره الرحمي التقريري. سنحاول من خلال الجدول التالي توضيح الظواهر التي تحدد ذلك:-

تطورات النمو والمشاهدات التشريحية	طول الجنين ووزنه	الشهر الرحمي
يظهر الجنين بشكل كروي ملتصق بجدار الرحم. في الأسبوع الثالث يبدأ تكوين الجهاز العصبي المركزي والجهاز الهضمي والكلينين والكبد والأمعاء والقلب والعمود الفقري. يبدأ قلب الجنين ينبض في اليوم ٢١ من بداية الحمل.	طوله ١ سم ، ووزنه ١ أجم	الشهر الأول (شكل ٤٣ ، ٤٤)

<p>في الأسبوع الخامس يصبح المخ مكون من خمسة مناطق وتشاهد بعض الأعصاب الدماغية. يظهر الذراعان والساقان ، وت تكون العينان والشفتان والأنف وينفصل تجويف الفم عن الأنف ، وينمو الحبل الشوكي. وتبدأ المشيمة في تزويد الجنين بتغذيته.</p>	<p>طوله ٢ سم.</p>	<p>الشهر الثاني</p>
<p>في الأسبوع السابع (شكل ٤٥ ، شكل ٤٦) تكون فصيلة الدم الخاصة بالجنين ، وتنظر بصيلات الشعر وحتمي الثديين والركبتين والمرفقين. تبدأ ملامح الوجه في التشكّل ، وت تكون العدسات والشبکية بالعين. ت تكون معظم عضلات الجنين ويصبح قادر على الحركة.</p>	<p>وزنه ٢٠ - ١٠ جم</p>	
<p>في الأسبوع الثامن (شكل ٤٧ ، شكل ٤٨) يتحرك الجنين ، وت تكون اليadan والقدمان. تظهر نواة التعظم بالترقوة (بالصدر) والخذ والذراع والقصبة والأضلاع الستة الأخيرة ، وأخيراً بالفك السفلي والأضلاع الستة الأولى.</p>		
<p>تنتهي عملية تخلق معظم الأعضاء والأنسجة والقلب بالكامل ، ويمكن سماع دقات القلب بجهاز دوبлер. تنتهي عملية تخلق الأطراف والأصابع بالكامل (شكل ٤٩). تنتهي عملية تخلق الوجه والعينان بالكامل. تغلق جفون</p>	<p>طوله ٩ سم</p>	<p>الشهر الثالث (شكل ٥٠)</p>

شكل (٤٣) →  
جنين يبلغ أربعة أسابيع رحمية



← شكل (٤٤)  
جنين يبلغ أربعة أسابيع رحمية



شكل (٤٥) →  
جنين يبلغ سبعة أسابيع رحمية



شكل (٤٦) →

جنين يبلغ سبعة  
أسابيع رحمية



← شكل (٤٧)

جنين يبلغ ثمانية  
أسابيع رحمية



→ شكل (٤٨)

جنين يبلغ ثمانية  
أسابيع رحمية



شكل (٤٩) —————

نمو أصابع القدمين بالكامل  
في الأسبوع ١١ من الحمل



شكل (٥٠) —————

جنين يبلغ ١٢ أسبوعاً رحماً



شكل (٥١) —————

جنين يبلغ ١٦ أسبوعاً رحماً





شكل (٥٢)  
جنين يبلغ ٦ أسبوع رحمى

شكل (٥٣) →  
منظار جانبي لوجه جنين يبلغ أربعة  
أشهر رحمية



← شكل (٥٤)  
ملامح الوجه لجنين يبلغ أربعة  
أشهر رحمية

شكل (٥٥) →

جنين يبلغ ١٦ أسبوع رحمى  
يشاهد يمتص أصبعه



← شكل (٥٦)

جنين يبلغ ١٦ أسبوع رحمى يشاهد  
به ظهور الجفون والرموش



شكل (٥٧) →

منظار جنين يوضح آذن جنين يبلغ  
خمسة أشهر رحمية



شكل (٥٨) →

جنين يبلغ خمسة أشهر رحمية



← شكل (٥٩)

جنين يبلغ خمسة أشهر رحمية



شكل (٦٠) →

جنين يبلغ خمسة أشهر رحمية يظهر  
تكوين الأعضاء التناسلية بالأنثى (البظر  
والشفرين الغلبيتين)

شكل (٦١) →

جنين يبلغ ستة أشهر رحمية



← شكل (٦٢)

جنين يبلغ ستة أشهر رحمية



شكل (٦٣) →

جنين يبلغ ستة أشهر رحمية

شكل (٦٤) →

جنين يبلغ سبعة أشهر رحمية



← شكل (٦٥)

جنين يبلغ سبعة أشهر رحمية



شكل (٦٦) →

جنين يبلغ ثمانية أشهر رحمية



<p>العينين ولا تفتحان حتى الأسبوع ٢٨ من الحمل. تبدأ الأظافر وجذور الأسنان وصيوان الأذنين في النمو. تنتج كرات الدم الحمراء في الكبد. تتنفس الخصيتان هرمون تستوسستيرون في الجنين الذكر. يظهر البظر في الجنين الأنثى.</p>	<p>وزنه ٨٥ جم</p>	
<p>تنتهي عملية تخليق المخ بالكامل. يستطيع الجنين المص (شكل ٥٥) والبلع ويصدر أصوات تنفس غير منتظمة ويقوم بحركات مثل الرفس والشقلبة ، ويشعر بالألم. تستطيل أنسجة العضلات ، وتتصبح العظام أكثر مثانة. تظهر الجفون والرموش (شكل ٥٦). تظهر نواة التعظم بالفقرات السفلية للعجز .</p>	<p>طوله ١٥ سم، وزنه ٢٢٠ جم</p>	<p>الشهر الرابع (شكل ٥١، ٥٢، ٥٣) شكل ٥٤)</p>
<p>تظهر أظافر اليدين والقدمين ، ويغطي الجسد بشعر خفيف (زغب). يسمع الجنين ويميز صوت أمه. تشعر الأم بحركة الجنين ، وتظهر الأعضاء الجنسية (شكل ٦٠) بالموجات فوق الصوتية. تظهر نواة التعظم بالقصبة (بالساقي) وبالعظم العقبي بمؤخرة القدم (calcaneus). المشيمة تزن حوالي ٢٠٠ جرام.</p>	<p>طوله ٢٥ سم ، وزنه ٣٠٠ جم</p>	<p>الشهر الخامس (شكل ٥٧، ٥٨) شكل ٥٩)</p>

<p>يغطي جلد الجنين بطبقة شمعية لحمايته ، تزول معظمها بالولادة. تتكون بصمات أصابع اليدين والقدمين. يترب الجنين على التنفس باستنشاق السائل الأمنيوسي. تزن المشيمة حوالي ٣٠٠ جم.</p>	طوله ٣٠ سم ، وزنه ٧٥٠ جم.	الشهر السادس (أشكال ٦٢ ، ٦١ ) (٦٣)
<p>يصبح الجهاز العصبي قادر على التحكم في بعض وظائف الجسم. تفتح جفون العينين وتغلق. تزن المشيمة حوالي ٤٠٠ جرام ، ويصل طول الحبل السري إلى ٤٠ سم. توجد الخصيتان في القناة الأربية. تظهر أنوية التعظم مكتملة النمو بعظم العقب بكاحل القدم (talus). تصل قابلية الجنين للحياة حوالي ٦٦% إذا ولد في الأسبوع ٢٥ ، وتصل إلى حوالي ٩٩% إذا ولد في الأسبوع ٢٨.</p>	طوله ٣٥ سم ، وزنه ١٥٠ جم.	الشهر السابع (شكل ٦٤ ، ٦٥ )
<p>ينام الجنين حوالي ٩٠ - ٩٥ من ساعات الليوم. تزن المشيمة حوالي ٥٠٠ جرام. تصل الخصيتان إلى نهاية القناة الأربية. تصل الأظافر إلى حد الأنامل. تبدأ نواة التعظم بأسفل عظمة الفخذ في الظهور. تصل قابلية للحياة حوالي ٩٥ % إذا ولد في هذا الشهر.</p>	طوله ٤٠ سم. وزنه ٢٥٠ جم.	الشهر الثامن (شكل ٦٦ ، ٦٧ )

شكل (٦٧) →

جنين يبلغ ثمانية أشهر رحمية




← شكل (٦٨)

جنين يبلغ ثمانية أشهر رحمية



→ شكل (٦٩)

شعر الرأس يصبح سميك وكثيف  
في الشهر التاسع الرحمي



شكل (٧٠) →

إلقاء الطفل في الشارع العام



← شكل (٧١)

لقيط ملقى عاري عن الملابس  
وجد داخل قطعة قماش



شكل (٧٢) →

طفل عثر عليه مربوط الحبل  
السرى وبه جرح طعني بالبطن  
والنزيف الدموى يغطى معظم  
أجزاء جسده

يختفي معظم الزغب من جسد الجنين عدا أعلى الذراعين والكتفين. محيط الرأس يتراوح بين ٣٣ - ٣٨ سم. شعر الرأس يصبح سميك ومتعرج ويصل طوله حوالي ٢ سم (شكل ٦٩). تزن المشيمة حوالي ٦٠٠ جرام وقطرها نحو ١٦ - ١٨ سم ، ويصل طول الحبل السري حوالي ٥٠ سم. تتخطى الأظافر حد الأنامل. تنزل الخصيتان في كيس الصفن. يصل قطر نواة التعظم بأسفل عظمة الفخذ إلى حوالي ٥٥ مم. تظهر نواة التعظم بأعلى عظمة القصبة بالساقي وبالعظم النردي (المكعبى - cuboid) بال القدم. تتصفح الرئتان. يغلق البيافوخ الخلفي بالرأس. بعد الولادة وقطع الحبل السري يأخذ المولود أول تنفس للهواء مما يحدث تغيرات بالقلب والشرايين ويدفع كل الدم عبر الرئتين.	٤٠ سم.	الشهر التاسع (شكل ٦٨)
	وزنه - ٣٠٠	
	٣٥٠ جم.	

### ملاحظات على تحديد عمر الجنين

- \* الحقائق والأرقام السابق ذكرها بالجدول السابق لا تحدث بالدقة الشديدة السابق ذكرها ولكنها تمثل الغالبية العظمى من الأجنة ، وذلك لأنها تختلف باختلاف جنس الجنين وعرقه ودرجة تغذيته.
- \* وزن المولودة الأنثى غالبا يكون أخف حوالي ١٠٠ جرام عن وزن المولود الذكر. وزن كل مولود من المواليد التوأم يكون أقل من وزن المولود الوحيد.

\* لفحص نواة التعظم بأسفل الفخذ ثني ركبة القبيط ثم يشق طوليًا على جانبي مقدم الفخذ من منتصف الفخذ وحتى أسفل الركبة ، ثم يشق شق مستعرض بالأنسجة الرخوة بأسفل الركبة ، ثم ترفع الأنسجة الرخوة لأعلى بحيث يصبح النصف السفلي من عظمة الفخذ عاري عن الأنسجة الرخوة. تؤخذ شقوق مستعرضة بكامل محيط عظمة الفخذ من أسفل لأعلى للبحث عن نواة التعظم وتحديد قطرها. تظهر نواة التعظم بلون أسمر محمر وتقاوم مرور السكين فيها ، وغالبا تكون نواة التعظم في السنتيمترات الثلاثة السفلية من العظمة. لعدم الوقع في الخطأ باعتبار النسيج الإسفنجي للعظمة هو نواة التعظم ، يلزم الاستمرار في شق العظمة أعلى بعد اختفاء نواة التعظم لمشاهدة النسيج الإسفنجي مما يؤكد أن الجزء السابق كان يمثل نواة التعظم بالفعل. ثم تطبق نفس الخطوات للبحث عن نواة التعظم بأعلى عظمة القصبة بالساقي ولكن يكون الفارق هو الشق من أعلى مفصل الركبة لأسفله.

\* لفحص نواة التعظم بانعulum النردي (المكعبى) يتم الشق طوليًا بباطن القدم بين الإصبع الثالث والرابع.

\* لفحص نواة التعظم بالعظم العقبي بكاحل القدم ومؤخرة القدم يتم الشق طوليًا بظاهر القدم.

#### رابعاً:- هل يمكن تحديد طبيعة عملية الولادة ؟

في بعض الأحيان يمكن تحديد بعض أنواع الولادات الغير طبيعية مثل الولادة العسرة أو الولادة السريعة.

(أ) في بعض حالات الولادة العسرة المصحوبة بالوفاة ونظراً لأن حشائط الرأس بالحوض تشاهد حدبة ولادة بفروة الرأس مع تراكب عظام الجمجمة

، وأحياناً نشاهدكسور شرخية بالجمجمة لكن دون حدوثكسور منخفة بالجمجمة. قد يضطر الطبيب إلى استخدام جفت الولادة في بعض الولادات العسرة مما قد يؤدي إلى حدوثكسور منخفة على جنبي الرأس. معظم حالات الولادة العسرة تكون رأس المولود كبيرة نسبياً.

(ب) يقصد بالولادة السريعة (precipitate labor) السقوط المفاجئ للجنين أثناء وقوف الأم فيصطدم بالأرض. نسبة حدوثها نادرة جداً وتحتفي بعض السيدات اللاتي سبق لهن تكرار الولادة عندما يكون رأس الجنين صغيراً مقارنة بحوض الأم المتسع. في هذه الحالة قد يحدث كسر شرخي بجمجمة المولود (إذا كان كسر منخسف أو كانتكسور متعددة فإن ذلك يؤكّد حدوث فعل جنائي) ، وغالباً يكون الكسر بالعظم الجبهي أو الجداري. نظراً لكون الولادة سهلة وتحتفي بدون انحسار لرأس الجنين بالحوض فلا تشاهد حبة الولادة ولا يحدث تراكب لعظام الججمة. قد ينقطع الحبل السري نتيجة السقوط السريع للمولود ، وقد ينزل الحبل السري مع المولود والمشيمة دفعة واحدة.

في تلك الحالات يجب قياس الحبل السري وخاصة إذا كان ما زال ملتصقاً بالمشيمة. يبلغ متوسط طول الحبل السري حوالي ٥٠ سم ولكنه قد يطول أو يقصر عن ذلك. بقياس طول الحبل السري وطرحه من المسافة بين فرج المرأة الولادة والأرض أثناء وقوفها يمكن معرفة المسافة بين رأس الجنين والأرض لتقدير إمكانية حدوث الإصابات نتيجة الولادة السريعة بالمقارنة مع الكسور المشاهدة بالرأس.

خامساً: هل يمكن تحديد مدة بقاء المولود على قيد الحياة ؟

الكشف الظاهري والصفة التشريحية تعطي فكرة تقريبية عن مدة بقاء

المولود على قيد الحياة من خلال:-

(١) درجة نقشر الجلد

\* نقشر جلد الصدر والبطن يعني أن عمر المولود حوالي يومين.

\* نقشر جلد كل الجسم يعني أن عمر المولود جاوز أسبوعين.

(٢) التغيرات بقاعدة الحبل السري

\* وجود حلقة حمراء تحيط بها يعني أن عمر المولود يوم.

\* بداية تقيح الحلقة الحمراء يعني أن عمر المولود حوالي يومين.

\* سقوط الحبل السري بالكامل ووجود جرح مكانه يعني أن عمر

المولود حوالي أسبوع.

\* التئام الجرح بالكامل وتكون السرة يعني أن عمر المولود حوالي

أسبوعين.

(٣) انغلاق الفتحة البيضاوية الموجودة بالحاجز بين الأذنين بالقلب يعني

أن عمر المولود حوالي أسبوع.

(٤) قفل القناة الشريانية التي تصل بين شريان الأورطي والشريان الرئوي

كالتالي:-

\* انغلاق وظيفي بالتكلصات العضلية المنعكسة يعني أن عمر المولود حوالي ٦ ساعات.

\* انغلاق بنسيج ليفي يعني أن عمر المولود جاوز ٤ أسابيع.

(٥) طفو المعدة والأمعاء نتيجة دخول هواء التنفس. يربط طرفي المعدة

على حدة ، وطرف الأثني عشر والصائم (الجزء الأوسط من الأمعاء

الحقيقة) معا ، وطرفى اللفافى (الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة) ثم يتم وضعوم في إناء عميق ممتنع بالماء للاحظة الطفو:-

\* طفو المعدة فقط يعني أن المولود تنفس فقط.

\* طفو الأنثى عشر والصائم يعني أن عمر المولود جاوز ٣ ساعات.

\* طفو اللفافى يعني أن عمر المولود جاوز حوالي ٦ ساعات.

(٦) وجود براز أصفر داخل الأمعاء أو بملابسه الداخلية يعني أن عمر المولود جاوز حوالي ٦ ساعات.

(٧) درجة التئام أو تقيح أي جرح حدث أثناء الولادة يمكن من خلالها تحديد عمر المولود.

#### سادساً: تحديد سبب الوفاة

قتل المولود حديث الولادة قد يتم بفعل سلبي أو فعل إيجابي:-

##### (١) الفعل السلبي (الإهمال أو الترك)

تنص المادة ٢٨٥ من قانون العقوبات المصري على ((كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين)).  
كما تنص المادة ٢٨٧ من قانون العقوبات المصري على ((كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالأدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصرى)).

عادة يترك الطفل الحي في مكان تتوقع معه الأم أن يعثر عليه أحد مثل شارع عام (شكل ٧٠) أو أمام مسجد أو محطة ركاب كبيرة أو دورة مياه

عامة ، وذلك ليغترر عليه أي شخص ويذهب به لمكان إيواء اللقطاء وينقذه من الموت. هذا المولود يكون عرضة للمشاكل التالية:-

\* عدم إرضاع المولود بعد ولادته ، سجلت حالات عديدة لمواليد عاشوا حوالي ٧ - ١٠ أيام بدون رضاعة أو ماء.

\* ترك المولود في العراء عرضة للتغيرات الجوية المختلفة مثل البرد والأمطار أو الشمس الحارقة ، وكذلك يكون عرضة للنهش الحيواني.

\* ترك المولود بدون ملابس (شكل ٧١). عادة يوضع المولود داخل كرتونة أو كيس قamaة أسود. إن وضع المولود في كيس قاماة أسود وإلقائه في الشارع حيا قد يجعله عرضة لحدوث إصابات حيوية قبل وفاته مثل الدهس بأقدام المارة أو المرور عليه بإطارات السيارات.

\* عدم ربط الحبل السري الذي يؤدي إلى تقييده والموت من التلوث والالتهابات. لا تحدث وفاة المولود في تلك الحالة من التزيف لأن أوعية الحبل السري تتقبض بالفعل المنعكس عقب تنفس المولود مباشرة ، وبالتالي تمنع حدوث التزيف.

## (٢) الفعل الإيجابي

أشهر الطرق المستخدمة في قتل المواليد هي كتم النفس والخنق والتغريق والإصابات الرضية بالرأس. هذا المولود بالطبع ليست لديه القدرة على المقاومة ، وبالتالي فهو لا يحتاج إلى استخدام عنف شديد في القتل وبالتالي فإن الموجودات التشريعية تكون قليلة وقد تتعدم نهايتها.

(أ) كتم النفس عادة يتم بالضغط بوسادة أو فوطة مبللة أو قطعة ملابس مبللة على فتحات الأنف والفم. قد تشاهد في تلك الحالات انسكابات دموية طفيفة بالسطح الداخلي للشفتين ، وبالخدرين والأنف والفم من الخارج. بالرغم من أن المولود لا يحتاج لعنف شديد لكتم نفسه ، لكن الأم أحياناً أو مساعدوها في القتل يضطروا لاستخدام عنف زائد لمنع الطفل من الصياح مما يترك أثر واضح

لكتم النفس. لكن في أحيان كثيرة لا يترك كتم نفس المولود أي أثر يدل عليه. عموماً يجب تحري مظاهر كتم النفس بدقة بتشريح السطوح الداخلية للجم والشفتين والألف والخدین وأعلى الفكين للبحث عن الانسكابات الغائرة بهذه الأنسجة.

أحياناً يحدث كتم النفس بطريقة عرضية نتيجة وضع المولود على وجهه أثناء النوم. المولود النائم على سرير مستوي في تلك الفترة المبكرة من حياته لا يستطيع الانقلاب من النوم على ظهره للنوم على بطنه. إن العثور على المولود الرضيع النائم على وجهه متوفياً في سريره أمر مثير للجدل ، حيث تشاهد بهاته في الأنسجة حول فتحات الأنف والجم. في تلك الحالة يبرز التساؤل هل هذه البهاته ناشئة عن الضغط المتعمد لإحداث كتم النفس ( فعل جنائي) أم ناشئة عن الرسوب الدموي بالوجه (بعد الوفاة) الذي منع من الظهور حول فتحات الجم والألف نتيجة انضغاط تلك المنطقة بالفراش. إذا لم تشاهد سحاجات أو كدمات حول تلك البهاته فلا يمكن الجزم بجناحية الوفاة. في بعض الأحيان تضع الأم حلمة ثديها في فم الرضيع ثم يغلبها النوم وقد يسد ثديها المترهل فتحات الأنف والجم للرضيع ويؤدي إلى كتم النفس العرضي.

(ب) إصابات الرأس بدفع رأس المولود في الحائط أو إلقائه بعنف على الأرض الصلبة أو ضرب الرأس بأداة صلبة راضة. إصابة الرأس تحدث كدمات أو جروح رضية بفروة الرأس ، وكسور منخسفة أو شرخية متشعبية بقوبة الجمجمة وتصل إلى قاعدة الجمجمة ، وتهتك بالمخ والسحايا وتزيف دماغي. هذه الحالات يجب أن تؤخذ بحذر ويجب تمييزها من حالات الولادة العسرة والولادة السريعة كما سبق ذكره.

(ج) الخنق أقل حدوثاً من كتم النفس لأنه يترك آثار تدل عليه. في تلك الحالات تشاهد سحاجات الأظافر أو الرباط المستخدم في الضغط على العنق. مشاهدة سحاجات الأظافر حول عنق المولود لا يعني بالضرورة الوفاة خنقاً لأن

المرأة الحامل قد تكون ذهبت لمنطقة بعيدة عن أعين الناس للولادة بمفردها في سرية ، وتكون تلك السحاجات ناتجة عن أظافرها أثناء محاولتها مساعدة نفسها على الولادة وشد الطفل بيديها من العنق لينزل.

(د) التغريق أقل حدوثاً من كتم النفس والخنق وإصابات الرأس ويحدث بغير رأس المولود تحت الماء مثل دلو أو بانيو أو حتى المرحاض. في تلك الحالة قد تظهر أعراض قليلة تنافق مع الغرق.

(هـ) كذلك قد تحدث الوفاة في حالات نادرة جداً عن طريق الطعن (شكل ٧٢) أو الذبح أو الحرق أو التسمم. كذلك سجلت وفيات حدثت بإدخال إبرة طويلة رفيعة مثل إبرة التجيد أو سرنجة الحقن للمخ من خلال اليافوخ الأمامي أو للقلب من بين الأضلاع أو للحبل الشوكي من بين الفقرات ، ولذلك يجب البحث جيداً عن مظاهر الوخز الإبرى. كذلك قد يتم إحداث الوفاة بالاختناق عن طريق وضع قطعة قطن أو قماش أو عجين داخل الفم والحنجرة والمريء لذا يجب التأكد من عدم وجود تلك الأجسام الغريبة وعدم وجود أي انسكابات دموية بمنطقة المسالك الهوائية من الداخل.

#### سابعاً: تحديد المدة التي مضت بين الولادة والوفاة

تطبق القواعد العادلة التي تطبق على جثث الكبار في تحديد زمن الوفاة من خلال ملاحظة درجة حرارة الجثة والتبيس الرمي والرسوب الرمي والتعفن الرمسي. لكن يجب أن نضع في اعتبارنا وجود بعض الفروق الجوهرية التي تتمثل في:-

(أ) تبريد جثة المولود حديثاً بسرعة كبيرة بالمقارنة بالبالغين.

(ب) ضعف عضلات المولود يجعل مدة بقاء التبيس الرمي بالمولود حديثاً قصيرة فيظهر التبيس سريعاً بالجثمان وبالتالي يختفي سريعاً.

(ج) عدم وجود ميكروبات بالجهاز الهضمي للمولود يجعل التعفن الرمسي يتأخر في الظهور عن الشخص البالغ.

الفصل السادس

**متلازمة الوفاة  
الضجائية للأطفال**



## متلازمة الوفاة الفجائية للأطفال

### Sudden infant death syndrome (SIDS)

تحمل هذه المتلازمة العديد من الأسماء الأخرى مثل الموت المفاجئ الغير المتوقع sudden unexpected death ، وتسمى في بريطانيا الموت في السرير الهزاز cot death ، وتسمى في أمريكا الشمالية موت المهد .crib death

#### تعريف المتلازمة

هي الموت المفاجئ الغير متوقع لأي وليد أو طفل صغير لم يتجاوز عمره عام واحد بدون سبب واضح بالرغم من الفحص الدقيق للحالة الذي يشمل معاينة مكان الوفاة وإجراء الصفة التشريحية للجثمان ومراجعة أوراقه الطبية طوال فترة حياته وأخذ تاريخه الصحي من أسرته. هذه المتلازمة تحدث وفاة الأطفال في كل الأجناس والأعراق والمستويات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة بدون سابق إنذار ، ولكنها أكثر حدوثاً في المستوى الاجتماعي المنخفض. وفيات هذه المتلازمة لا يتوقعها الآباء ولا الأطباء لكون هذا الطفل كان بصحة جيدة قبل الوفاة مباشرة.

#### معدل حدوثها

تراجع معدل وفيات الأطفال عموماً في الدول المتقدمة تراجعاً كبيراً بعد السيطرة على العديد من أمراض الالتهابات والعيوب الخلقية ونقص التغذية. من بين كل ألف طفل يولدون أحياً فإن ٦ من هؤلاء الأطفال يموتون خلال عامهم الأول نصفهم تتطبق عليه شروط هذه المتلازمة. في عام ١٩٩٠ كان معدل هذه المتلازمة في بريطانيا حوالي ٢ لكل ألف ولادة لمولود حي ، ثم انخفضت تلك النسبة إلى ١,٤ في عام ١٩٩١

، ثم انخفضت إلى ٠,٧ في عام ١٩٩٣م ، وهو ما يمثل ١٠٠٠ حالة وفاة سنويا. تزامن انخفاض تلك النسب مع الحملة الدعائية التي دعت إلى نوم الطفل على ظهره وليس على وجهه ، وتجنب تعرضه الزائد للحرارة ، وتجنب التدخين بجوار الطفل.

تؤدي هذه المتلازمة إلى وفاة سبعة آلاف طفل أمريكي في السنة الواحدة بمعدل طفل كل ساعة تقريبا ، وهو ما يفوق مجموع وفيات الأطفال في أمريكا مرضي السرطان والقلب والالتهاب الرئوي والتعذيب سنويا. في عام ١٩٨٠م كان معدل هذه المتلازمة في أمريكا حوالي ١,٥٣ لكل ألف ولادة لمولود حي ، ثم انخفضت تلك النسبة إلى ١,٣ في عام ١٩٩٠ ، ثم انخفضت إلى ٠,٥٦ في عام ٢٠٠٠م.

معظم الوفيات تحدث للأطفال التي تتراوح أعمارهم بين الشهر الثاني والسابع ، وتزداد ذروتها حول الشهر الثالث ، وتتدر بعد الشهر التاسع. تزداد نسبة حدوث هذه المتلازمة في الأطفال الذكور عن الإناث بنسبة حوالي ١,٣ : ١. تكرر وفاة طفل ثانٍ في نفس الأسرة بنسبة ٤ حالات لكل مليون طفل مولود حي ، وسجلت وفيات ٣ – ٤ أطفال لنفس الأسرة في عدة عائلات.


### عوامل الخطورة المؤثرة في المتلازمة

بالطبع لن يستطيع العالم القضاء على وفيات هذه المتلازمة قبل أن نفهم أسبابها جيدا ، ولكن إلى أن يأتي هذا اليوم يجب العمل على تقليل تلك الوفيات من خلال تجنب الواقع في عوامل الخطورة التي وردت في الدراسات المختلفة والتي تشمل:-

شكل (٧٣) →


نوم الطفل على ظهره هو الوضع  
الصحيح للنوم (الصورة العلوية)

ونوم الطفل على بطنه هو الوضع  
الخاطئ للنوم (الصورة السفلية)



← شكل (٧٤)

لتقليل نسبة حدوث متلازمة وفاة الأطفال  
الفجائية يجب أن ينام الطفل في سرير  
خالي ولا تغطي البطانية وجهه



← شكل (٧٥)

لتقليل نسبة حدوث متلازمة وفاة الأطفال  
الفجائية يجب أن ينام الطفل في سرير  
مستقل في نفس حجرة الأم





شكل (٧٦) طفل مبترس



شكل (٧٧) بهادة حول الفم والأنف من تأثير منع تكوين الرسوب الدموى بهم لكونهم مكان  
إنقاء لطفل توفى وظل نائما على وجهه



← شكل (٧٨)  
تقیحات والتھابات حول غشاء  
التامور المحيط بالقلب

## (١) النوم على البطن

في مقارنة بين النوم على الظهر والنوم على البطن تفيد الدراسات أن الطفل النائم على بطنه يستغرق وقت أكبر عند إيقاظه (بنام بعمق)، وجسده يصبح أكثر حرارة؛ ويتنفس بمعدل أكثر نظراً لضغطه على الحجاب الحاجز وقلة حجم الهواء الداخل في كل نفس، وبالتالي تزداد نسبة ثاني أكسيد الكربون في دمه، وتزداد فرصة توقف التنفس لديه مقارنة بالطفل الذي ينام على ظهره، وبالتالي تزداد فرصة حدوث المتلازمة مع الطفل النائم على بطنه عن الطفل النائم على ظهره. كذلك يرى بعض العلماء أن نوم الطفل على ظهره بمقدار الضعف، حيث إن وضع الوفاة مقارنة بالطفل النائم على ظهره غير مستقر وقد يتدرج ويستقر للنوم على بطنه. بعد شروع تلك النظرية بدأت حملة إعلامية كبيرة في أمريكا وبريطانيا تدعوا الأمهات لوضع الطفل على ظهره أثناء النوم فانخفضت نسبة الأطفال الذين ينامون على البطن من ٧٠٪ إلى ٢٪ وهو ما صاحبه انخفاض نسبة الوفيات بهذه المتلازمة بنسب تتراوح بين ٤٠ - ٥٠٪. لذا يجب وضع الطفل على ظهره عند النوم (شكل ٧٣).

## (٢) النوم على فراش طري

تشير الدراسات أن وضع الطفل على فراش طري يجعل هذه المتلازمة أكثر حدوثاً بالمقارنة بالنوم على فراش قاس. لذا يجب أن ينام الطفل على مرتبة قاسية مقطأة بملاءة سرير فقط.

### (٣) المخدرات الطيرية في سرير الطفل

تشير الدراسات أن وجود المخدرات أو المساند أو ألعاب الأطفال الطيرية مثل الدببوب على سرير الطفل أو تغطية وجه الطفل بأي جسم من مثل البطانية تجعل هذه المتلازمة أكثر حدوثاً بالمقارنة بالسرير الذي لا يوجد فيه هذه الأشياء. تربط حافة البطانية السفلية عند نهاية السرير من ناحية قدمي الطفل بحيث تغطي البطانية الطفل حتى أسفل عنقه فقط ، ولا تصل لوجهه. لذا يجب أن ينام الطفل في سرير خالي وألا تغطي البطانية وجهه (شكل ٧٤).

### (٤) حرارة الطفل الزائدة

تشير الدراسات أن هذه المتلازمة تزيد مع الحرارة الزائدة للطفل أثناء النوم. لذا يجب تجنب ارتفاع حرارة الغرفة التي ينام فيها الطفل ، وتجنب ارتداء الطفل لملابس كثيرة أو تغطيته بأغطية كثيرة.

### (٥) التدخين أثناء الحمل وبعد الولادة

معظم الدراسات تشير إلى ارتفاع نسبة حدوث هذه المتلازمة عند الطفل الذي كانت أمه مدخنة أثناء الحمل أو بعد الولادة ، أو التي كانت تتغذى مواد مخدرة مثل الكوكايين أو الهيروين أثناء الحمل أو بعد الولادة. أظهرت إحدى الدراسات أن الأم المدخنة أثناء الحمل تزيد فرصة حدوث المتلازمة ولوليدتها ثلاثة أضعاف الأم الغير مدخنة ، وأن الطفل الذي يتعرض للتدخين السلبي من المحيطين بالأم أثناء الحمل أو المحيطين بالطفل بعد ولادته تزيد فرصة حدوث المتلازمة ضعفين مقارنة بالطفل الذي لم يتعرض للتدخين السلبي. لذا يجب امتناع الأم الحامل عن التدخين

أو تعاطي المخدرات أثناء الحمل وبعد الولادة ، كما يجب إبعاد الطفل عن تواجد المدخنين وخاصة في الأماكن المغلقة.

#### (٦) نوم الطفل في سرير مشترك وبعيد عن الأم

تشير الدراسات إلى أن نوم الطفل في نفس السرير مع إخوته أو مع أبيه ( وخاصة إذا كان أحد الآبوبين يعاني من وهن شديد أو يتعاطى مواد مخدرة تؤثر على درجة وعيه ) يجعله أكثر عرضة لهذه المتلازمة . لذا يجب أن ينام الطفل في سرير مستقل ( شكل ٧٥ ) ولكن في نفس غرفة الأم .

#### (٧) عدم استخدام السكاته (البزازة)

تشير الدراسات إلى انخفاض نسبة حدوث هذه المتلازمة عند الأطفال الذين يستخدمون السكاته ، لذلك يجب استخدام السكاته في العام الأول للطفل وفق الضوابط الآتية:

- (أ) توضع السكاته في فم الطفل عند بداية وضعه في السرير للنوم ، ولا يعاد وضعها مرة أخرى في حالة استغراقه في النوم .
- (ب) لا يجب الطفل على إدخال السكاته في حالة رفضه لها .
- (ج) يجب تنظيفها واستبدالها بانتظام .
- (د) عدم وضعها في أي محلول حلو المذاق .
- (هـ) عدم استعمالها قبل مرور شهر من الولادة للأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية من ثدي الأم .

## (٨) عدم التغذية الجيدة والمتابعة الطبية أثناء الحمل

انتغنية الجيدة والمتابعة الطبية أثناء الحمل من شأنها أن تقل ولادة الطفل المبتسر. لوحظ زيادة كبيرة في حدوث المتألمة في الأطفال المبتسرين (شكل ٧٦).

## (٩) الحمل المتتالي بدون راحة

لوحظ وجود زيادة في حدوث هذه المتألمة في الطفل المولود من حمل متتالي بدون فترة راحة بين الولادة والحمل التالي. لذا يجب تأخير الحمل التالي لمدة سنة على الأقل بعد الولادة.

## (١٠) رضاعة الألبان الصناعية

تشير الدراسات أن معدل حدوث وفيات هذه المتألمة يقل عند الأطفال الذين يرضعون طبيعيا مقارنة بالأطفال الذين يرضعون ألبان صناعية ، وذلك لأن الرضاعة الطبيعية تقل فرصة حدوث التهابات الجهاز الهضمي والجهاز التنفسى. لذا يجب تحفيز الأمهات على الرضاعة الطبيعية.

## (١١) الطقس البارد

تزداد فرصة حدوث هذه المتألمة في شهور السنة الباردة والطقس الممطر ، في الفترة ما بين شهرى نوفمبر ومارس.

هذه المتألمة ليست مرض معدى ولا تنتقل وراثيا وليس لها علاقة بتطعيمات الأطفال.

عوامل الخطورة السابق ذكرها لا تؤدي بمفردها إلى الوفاة بهذه المتألمة ولكنها لها تأثير سلبي على الصحة العامة للطفل ، وبالتالي قد تساعد على وفاة الأطفال بهذه المتألمة. عمليا حوالي ثلثي الأطفال الذين توفوا بهذه المتألمة لم يعانون من عوامل الخطورة هذه ، ومعظم الأطفال الأحياء لديهم عامل أو أكثر من عوامل الخطورة ومع ذلك فهم أحياء.

## كيفية حدوث الوفاة: حالة الطفل قبل الوفاة قد تكون:-

- \* نصف الحالات يكون الطفل طبيعيا ولا يعاني من أي أعراض ويوضع في سريره للنوم ، وعند إيقاظه يجدوه متوفيا.
- \* النصف الآخر من الحالات يكون الطفل يعاني من التهابات بسيطة في المسالك التنفسية العليا أو توعك بسيط بالأمعاء في اليوم السابق أو الأيام السابقة للوفاة ويوضع في سريره للنوم ، وعند إيقاظه يجدوه متوفيا.
- \* معظم الأطفال يموتون دون أن تشاهد عملية الموت ، وهناك حالات كان الطفل فيها سليما تماما ووجد متوفيا في خلال خمس دقائق فقط ، وبعض الحالات تتوفي فجأة أثناء كشف الطبيب عليها.

## معاينة مكان وفاة الطفل

- \* يفحص السرير الذي وجد فيه الطفل متوفيا للبحث عن آثار القيء أو أي افرازات أو نمو فطري (هناك بعض الجدل العلمي الدائر لتحديد ما إذا كان نمو الفطريات في سرير الطفل يؤدي للوفاة).
- \* تلاحظ الحالة العامة للمنزل ودرجة نظافته والمظاهر التي تدل على الحالة الاجتماعية والاقتصادية لساكنيه.
- \* البحث بالمكان عن أي أدوية أو عقاقير مخدرة أو سامة.
- \* قد تظهر المعاينة أن الطفل نائم علي وجهه مع بهاته حول الفم والأنف (شكل ٧٧) نتيجة بقاء الطفل بعد الوفاة فترة طويلة في هذا الوضع مما منع تكون الرسوب الدموي حول الفم والأنف لكونهم موضع إنقاء ، وهي لا تعني حدوث كتم نفس الطفل ما لم يصاحبها آثار سحجات أو كدمات حول الفم والأنف.

## الكشف الظاهري

- \* أحيانا يشاهد سائل مدمم يخرج من الفم والأنف ، وهذا ليس له أي دلالة تحدد سبب الوفاة فقد يكون ناتج من احتقان الفم أو من الأوعية الدموية للبلعوم.

- \* أحياناً تكون يد الطفل قابضة على ألياف من فرش السرير ، ربما يرجع ذلك لحدوث حركات تشنجية قابضة لحظة الوفاة.
- \* أحياناً تشاهد آثار قيء على فتحتي الأنف أو الفم أو الوجه. هذا لا يعني حدوث الوفاة نتيجة استنشاق القيء ، وذلك لكون القيء جائز الحدوث لحظة الوفاة أو حتى بعد الوفاة.
- \* قد يكون الوجه محظق أو باهت اللون أو بلون مزرق ، ولكن لا توجد أي أنزفة نمشية بالوجه أو العينين.

- \* في معظم الأحيان لا يظهر الكشف الظاهري لجسد الطفل المتوفى أي مظاهر غير طبيعية.

#### الصفة التشريحية

- \* لا توجد علامة تشريحية مميزة تخص هذه المتلازمة فقط.
  - \* أحياناً تشاهد أنزفة نمشية بالبلورا وغدة التيموس وخلفية القلب.
  - \* قد يظهر الفحص المجهرى وجود التهابات بالغشاء المخاطي للحنجرة أو البلعوم أو القصبة الهوائية أو حول القلب (شكل ٧٨).
  - \* يجب أن يفحص الجثمان بالأشعة ثم تفحص كل فتحات وسطوح الجسم بعناية لاستبعاد علامات الطفل المضطهد.
  - \* تؤخذ مسحات من المسالك الهوائية العليا ومن الرئة ومن الدم والصائم والأذن الوسطي للزرع الجرثومي والفيروسي لاستبعاد الحالات المرضية. وكذلك تؤخذ عينات للتحليل السمي.
- إن مهمة الطبيب الشرعي هي استبعاد الشق الجنائي والشق المرضي قبل الإعلان عن متلازمة الوفاة الفجائية للطفل.

## **الفصل السابع**

**المشاكل الاجتماعية  
العلاقات الجنسية غير شرعية**



المشاكل الاجتماعية للعلاقات الجنسية الغير شرعية

أولاً: جرائم الشرف

شرف المرأة في المجتمعات العربية والإسلامية مسألة لا تعنيها أو تعني أسرتها فقط بل تعني العائلة عموماً. مفهوم شرف المرأة مفهوم واسع ، فلكي تحافظ المرأة على شرفها لا يتطلب الأمر عدم ممارسة العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج فقط ، بل عليها أيضاً ألا تختلط بالرجال ، وألا تدخل في علاقات عاطفية قبل الزواج.

الممارسات الجنسية الغير شرعية تفتح الباب علي مصراعيه لجرائم الشرف للتخلص من المرأة التي تنتهك قواعد ومعايير الشرف وتنسبب في العار للأسرة والعائلة وهو ما يسمى غسل عار العائلة الذي يتم علي يد الأب أو الأخ أو الابن أو العم أو الخال ، وهو ما يشير إلي أن جرائم الشرف هي جرائم عائلية في المقام الأول. العنف ضد المرأة علي خلفية الشرف ما زال ظاهرة واسعة الانتشار في العالم العربي والإسلامي ، وتزداد نسبته في الوقت الحاضر. يمثل الشك في سلوك المرأة السبب الرئيسي لممارسة العنف ضدها عموماً أو محاولة قتلها أو قتلها.

مفهوم الشرف يعطي الرجل في العالم العربي والإسلامي حق إصدار حكم الإعدام وتنفيذه على المرأة التي تنتهك قواعد ومعايير الشرف من قريبياته دون تمكينها من الدفاع عن نفسها بالوسائل القانونية ، حيث يتم هذا القتل دون محاكمة وخارج نطاق القانون ودون أدلة شرعية واضحة. هذه التقاليد العربية لا تنسق مع الشريعة الإسلامية ولا مع أبسط حقوق الإنسان في الحياة التي لا يجوز حرمان أحد منها بدون الرجوع للقانون والشرع.

في العالم العربي والإسلامي عموماً لا توجد إحصاءات واضحة عن معدل جرائم الشرف ، وحتى في حالة تواجهها فإنها تكون غير دقيقة لكون معظم قضایا الشرف لا يتم التبليغ عن سببها الأساسي خشية الفضيحة والعار للأسرة والعائلة. تشير بعض الدراسات أن ما بين ٨٠%-٨٥% من قضایا العنف ضد النساء تكون مرتبطة بقضایا الشرف ، وإن لم يعلن عن ذلك رسمياً في الأوراق. تشير بعض الإحصاءات الصادرة من منظمة هيومن رايتس ووتش عن معدل العنف ضد المرأة على خلفية الشرف إلى ما يلي:-

- \* في مصر قتلت ٥٢ امرأة عام ١٩٩٧ م.
  - \* في الأردن قتلت ٣٠ امرأة عام ١٩٩٨ م ، وقتلت ٢٢ امرأة عام ٢٠٠٢ م ، وقتلت ١٧ امرأة عام ٢٠٠٣ م.
  - \* في لبنان قتلت ٣٦ امرأة بين أعوام ١٩٩٦-١٩٩٨ م.
  - \* في فلسطين قتلت ٣٣ امرأة بين أعوام ٢٠٠٤-٢٠٠١ م.
  - \* في اليمن كان قتل الزوجات حسب الأعوام كالتالي:  
٢١ (١٩٩٩ م)، ٢١ (٢٠٠٠ م)، ١٥ (٢٠٠١ م)، ١٨ (٢٠٠٢ م).
  - \* في باكستان قتلت ٨٥٠ امرأة في الفترة بين عامي ١٩٩٨-١٩٩٩ م في إقليم البنجاب فقط ، وحرقت بماء النار ٥٦٠ امرأة في نفس الإقليم عن ذات الفترة.
  - \* في بنجلاديش تعرضت ٢٠٠ امرأة لهجوم بماء النار (حمض الكبريتิก) في الفترة من عام ١٩٩٦-١٩٩٨ م.
- في دراسة شیقة أجرتها الصحفية/ کریمة کمال نشرت بشبکة الانترنت بموقع مركز قضایا المرأة المصرية تناولت ١٢٥ جريمة شرف نشرت في

الصحف المصرية جاء بها أن أسباب القتل وعلاقة القاتل بالمجني عليهما كانت كما هو موضح بالجدول التالي:

%٢٩	قتل الزوجة للشك في سلوكها
%٢٤	قتل الابنة للشك في سلوكها
%١٣	قتل الأخت للشك في سلوكها
%٥	قتل احدى القربيات للشك في سلوكها
%٤	شروع في قتل الزوجة للشك في سلوكها
%٤	قتل الزوجة للاعتراف بالخيانة
%٣	قتل الأخت للحمل سفاح
%٣	قتل عشيق الزوجة لاكتشاف العلاقة
%٢	قتل الابنة للحمل سفاح
%٢	شروع في قتل الابنة للشك في سلوكها
%٢	شروع في قتل الأخت للشك في سلوكها
%٢	قتل العشيقة لإخفاء السر
%٢	قتل الأم لزواجهما عرفيًا أو عدم الرغبة في إتمام زواجهما
%٢	قتل الأخ لاعتدائه على أخيه جنسياً
%١	قتل عشيقة أحد الأقارب لاكتشاف العلاقة
%١	قتل الابنة بعد أن اغتصبها الأب وعلم بحملها منه
%١	قتل أحد العاملين لديه لاكتشافه علاقته بابنته

من الجدول السابق يتضح أن الأسباب الرئيسية للجريمة حسبما ترى الكاتبة كانت كالتالي:

%٧٩	الشك في السلوك
%٩	اكتشاف الخيانة
%٦	منع إظهار العلاقة مع العشيقه
%٦	أسباب أخرى

إن القانون المصري تعامل مع جرائم الشرف معاملة مخففة عن الجرائم العادية حيث جعل قتل الزوجة في جريمة الشرف جنحة وليس قتل عمد وذلك حسبما ورد بالمادة ٢٣٧ من قانون العقوبات المصري على أن (من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلاً من العقوبات المقررة في المادتين ١٣٤ ، ٢٣٦). وميز القانون المصري تمييز شديد بين الرجل والمرأة حيث لم يعطي الزوجة هذا التخفيف في العقوبة إذا فاجأت زوجها بيرتكب الزنا. كما ميز القانون المصري تمييز شديد بين عقاب الرجل والمرأة في حالة الزنا مثلاً مخالف ذلك الشريعة الإسلامية التي تساوي بين الرجل والمرأة في هذه الجريمة ، ولبيان ذلك سنلقي نظرة سريعة على ذلك.

### الزنا

الزنا هو اتصال شخص متزوج سواء كان رجلاً أو امرأة اتصالاً جنسياً بغير شريك الزواج. وسنوضح لاحقاً تمييز القانون المصري بين الرجل والمرأة عند تعامله مع قضية الزنا:-

شكل (٧٩) →

غشاء بكارة هلالى الشكل




← شكل (٨٠)

غشاء بكارة حلقى الشكل



شكل (٨١) →

غشاء بكارة مسن الحواف



شكل (٨٢) →



تمزق حديث بغشاء البكاره

← شكل (٨٣)

تلاشى غشاء البكاره نتيجة تكرار  
الممارسة الجنسية والولادة



## (١) من حيث العقوبة

تنص المادة رقم ٢٧٤ من قانون العقوبات المصري على ((المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت)). أما إذا كان الزاني هو الزوج فقد وردت عقوبته في المادة ٢٧٧ من قانون العقوبات التي تنص على ((كل زوج زني في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازي بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر)).  
أي إن عقوبة المرأة الزانية الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وعقوبة الرجل الزاني لنفس الجريمة هي الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر.

## (٢) من حيث أركان الجريمة

اشترط القانون لكي تقع جريمة زنا الزوج أن يكون الزوج قد ارتكب الجريمة في منزل الزوجية ، ولم يتطلب هذا الركن في جريمة زنا الزوجة مما يعني أن الزوجة ترتكب جريمة الزنى إذا توافرت أركانها في أي مكان تقع فيه ولا تشترط منزل الزوجية. يقصد بمسكن الزوجية كل مكان للزوج سواء كان مكان دائم أو غير دائم مثل مكان المصيف أو مسكن الريف أو المصيف.

مما سبق يتضح لنا مخالفة القانون المصري للشريعة الإسلامية التي ساوت بين الرجل والمرأة في عقوبات جريمة الزنا وذلك في قوله سبحانه وتعالى في الآية الثانية من سورة النور ((الزانية والزاني فلاجدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين)). بل إن القانون المصري أعطى للرجل تخفيف في عقوبة قتل زوجته قبل التأكيد من حدوث

جريمة الزنا مخالفًا بذلك أيضًا الشريعة الإسلامية في إثبات جريمة الزنا التي اشترطت وجود أربعة شهود أو اعتراف الزوجة.

إن الشريعة الإسلامية لم تعطي الرجل حق قتل زوجته أو ابنته أو أخيه أو أمه على خلفية قضايا الشرف حيث وضعت قواعد لإثبات الجريمة أولاً ثم العقوبة التي تكون من خلال منفي القانون ولم تعطي هذا الرجل حق القصاص بنفسه بداعي الدفاع عن شرفه أو شرف عائلته. أي إن النساء التي ترتكب ضدهن جريمة القتل على خلفية قضايا الشرف هن ضحايا ثقافة المجتمع ولسن ضحايا الدين. إن المجتمع مطالب بعدم التمييز القانوني بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بقضايا الشرف ، وتغيير التوجهات الثقافية للناس وتعديل النصوص القانونية المتعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية. هذا الرجل القاتل على خلفية قضايا الشرف لابد أن يحاكم على ارتكابه جريمة القتل ولا يخفى له أبدا لأي اعتبارات لأنه قاتل.

### ثانياً: ترقيع غشاء البكارة

غشاء البكارة عبارة عن ثنية في غشاء المهبل المخاطي وهو غشاء رقيق يقع ما بين الفرج والمهبل علي بعد ٢ - ٤ سنتيمتر من فتحة المهبل. فتحة غشاء البكارة للبنت قبل سن البلوغ يبلغ قطرها حوالي ٧ ملليمتر. يتراوح سمك غشاء البكارة عند البالغين ما بين ١ - ٢ سنتيمتر ويوجد به فتحة أو أكثر ، ولا يسد المهبل إلا نادراً جداً في حالة غشاء البكارة عديم الفتحات. يختلف غشاء البكارة من حيث النوع والحجم والعمق والسمك والاتساع من فتاة لأخرى. وستتكلم بإيجاز عن أنواع غشاء البكاره.

## أنواع غشاء البكارة

### الغشاء الهلالي

هذا الغشاء هو أكثر أنواع غشاء البكاراة شيوعاً (حوالى ٧٥٪ من الحالات) وهو ذو فتحة هلامية الشكل ، دائمًا مع زيادة السمك بخلفية الغشاء ولذلك فإن المنطقة الخلفية لغضاء البكاراة (من الساعة ٣ حتى الساعة ٩) هي أكثر المناطق عرضة للتمزق عند الجماع الجنسي. هذا الغشاء رقيق ويتمزق مع أول ممارسة جنسية (شكل ٧٩).

### الغشاء الحلقى

هذا الغشاء له فتحة مركبة ، غالباً متعددة وقابلة للتعدد لدرجة تسمح بإيلاج عضو ذكري منتصب لمرات عديدة دون أن يتمزق وبالتالي قد يسبب هذا الغشاء مشاكل للمرأة عندما يتهمها زوجها إنها لم تكن عذراء لعدم نزول دم عند أول جماع بينهما (شكل ٨٠).

### الغشاء المسنن

حافة هذا الغشاء مسننة (مشرشرة) وبها ثنيات تبدو لغير المتمرس في فحص غشاء البكارة على إنها تمزقات قديمة ، إلا إن الطبيب الشرعي المتمرس من خلال مشاهدة تماثل الثنيات على الجانبين وعدم وصولها إلى جدار المهبل وعدم وجود مظاهر التئام يستطيع أن يؤكّد عدم وجود تمزقات وإن هذه الثنيات هي ثنيات طبيعية (شكل ٨١).

### الغشاء ذو الحاجز

هذا الغشاء به حاجز طولي أو عرضي أو مائل ، كامل أو ناقص ، يقسم فتحة الغشاء إلى فتحتين قد تكونا متساويتين أو غير متساويتين. هذا

الغشاء من أكثر الأنواع التي يكون فضها مصحوباً بنزيف دموي غزير يجعل ملابس الفتاة مشبعة بالدماء.

### الغشاء الغربالي

هذا الغشاء تكون به فتحات صغيرة متجاورة.

### الغشاء المسود (عديم الفتحات)

هذا الغشاء ليس له فتحة وبالتالي فهو يحجز خلفه دماء الحيض فيتجمع دم الحيض شهرياً حتى يمتليء المهبل بالدم ثم يمتليء الرحم وتنتفخ البطن مما يجعل البعض يعتقد إنها حامل وقد يقتلها أهلها اعتقاداً منهم أنها حملت سفاحاً. لابد من عمل شق جراحي بهذا الغشاء لتصريف دم الحيض ومنع تجمعيه مرة أخرى وتعطى هذه البنت شهادة بالأجراء الجراحي الذي اتخذ ليثبتت عذريتها وقت الجراحة.

يحدث تمزق غشاء البكاره الطبيعي عند أول جماع جنسي وغالباً يكون التمزق بالجزء الخلفي (ما بين الساعة الثالثة إلى الساعة التاسعة). تظهر حواف غشاء البكاره المفضوض حديثاً بمنطقة التمزق مدممة ومتورمة ومؤلمة (شكل ٨٢) وتشفى في خلال أسبوع تاركة به مظاهر التئام واضحة ولكن لا يعود إلى حالته الأولى. مع تكرار الجماع الجنسي ترداد تمزقات غشاء البكاره، بينما تحدث الولادة الطبيعية تمزقاً كاملاً بغشاء البكاره ولا يبقى منه إلا قطع صغيرة تسمى الزواائد الآسية (شكل ٨٣).

فض غشاء البكاره بالإصبع أو بأي أداة أخرى غالباً يحدث التمزق بأمامية غشاء البكاره بينما فض غشاء البكاره بالعضو الذكري غالباً يحدث التمزق بخلفية غشاء البكاره على أحد الجانبين. دائماً يكون فض غشاء البكاره مصحوباً بآلم ونزيف ، ولكن معدل حدوث النزيف يكون أقل بكثير من معدل حدوث الألم. سبب غياب التزيف أثناء فض غشاء البكاره هو حدوث التمزق في نسيج خالي من التروية الدموية الطبيعية أو نسيج مرن يحدث به الشد دون تمزق.

سجلت حالات نادرة جداً كان فض غشاء البكارة فيها مصحوباً بنزيف غزير أدي إلى الموت. إن حجم وقابلية الفرج للتمدد لدرجة تسمح بحدوث الجماع الجنسي دون فض غشاء البكارة هو شيء متكرر الحدوث.

مما سبق يتضح أن فض غشاء البكارة يحدث نتيجة الجماع الجنسي أو إدخال أي جسم غريب بالفرح أو الإصبع أثناء الاستمناء ، وكذلك قد يحدث نتيجة الإصابات الموضعية الشديدة لمنطقة الفرج مثل الحوادث المرورية أو السقوط على شيء بارز ، ولكن يجب توخي الحذر في ذلك لأنه لكي يحدث تمزق للغشاء من الحوادث أو السقوط على شيء بارز يجب أن تحدث إصابات شديدة بمنطقة الحوض عامة ومنطقة الفرج خاصة. أي إنه يستحيل حدوث تمزق غشاء البكارة في الحوادث والسقوط بمفرده دون حدوث إصابات بالأنسجة الرخوة المحيطة به أو بعظام الحوض.

تلحظ لي في العديد من المؤلفات القديمة والحديثة ذكرها أن القفر الشديد والرياضة العنيفة وشدة الطمث وركوب الخيل والدراجات وتمارين فتح الحوض تحدث تمزق بغضاء البكارة ، إلا إنني أرى إنه لا توجد أي أدلة علمية على ذلك ولا توجد حالات مسجلة عالمياً تشير إلى حدوث تمزق بغضاء البكارة فقط دون حدوث إصابات بالأنسجة الرخوة والعظام المحيطة بغضاء البكارة.

إن فقد غشاء البكارة ليس دليلاً على الزياني لكونه قد يحدث أثناء استمناء الفتاة وإدخالها لإصبعها أو أي جسم غريب إلى منطقة غشاء البكارة خطأ فتحدث التمزق ، كما إن سلامه غشاء البكارة ليس دليلاً على العذرية فقد تمارس الفتاة الجنس مرات عديدة دون تمزق غشاء البكارة إذا كان الغشاء من النوع المطاطي المرن. بل إن هناك العديد من الفتيات اللاتي حملن دون فض غشاء البكارة من خلال الاحتكاك الخارجي ونزول السائل المنوي على الفرج من الخارج ثم دخوله إلى الفرج والرحم وتتفريح البويضة بالرغم من سلامه

غشاء البكاره. أي إن غشاء البكاره هو مجرد علامة مادية لا ترقى إلى مستوى القرينة على عذرية أو انحراف المرأة.

إن نزول الدم بعد الجماع من الفرج لا يعني سلامه غشاء البكاره قبل تلك الممارسة الجنسية معها وذلك لاحتمال أن يكون الغشاء قد تم ترقيعه جراحياً أو تكون الفتاة لجأت لحيلة بوضع دماء من أي طائر داخل الفرج قبل الجماع مباشرةً وعند إخراج الرجل قضيبه من الفرج يجده ملطخاً بالدماء. كذلك فإن عدم نزول الدم أثناء الجماع لا يعني عدم العذرية لاحتمال أن يكون الغشاء من النوع المطاطي المرن.

فض غشاء البكاره يترك آلاماً بسيطة ل الفتاة تحتاج ل يومين أو ثلاثة للشفاء ، ويفضل ترك الجماع فيهم. لا يحتاج فض الغشاء لمجهود شاق من الرجل حيث ينفض بمجرد إدخال قضيب الرجل المنتصب وبدون عنف. كما سبق أن ذكرنا أن فض غشاء البكاره لا يتطلب نزول كمية كبيرة من الدماء بل قد تنزل بضع نقاط فقط وأحياناً لا يحدث نزيف نهائياً. وهذه النقاط القليلة من الدم تخليط بالإفرازات المهبلية الناتجة عن الإثارة الجنسية ، فيكون الناتج هو بقعة من الإفرازات ذات لون أحمر خفيف جداً (أي لون أحمر وردي) ، وهي ليست بقعة داكنة من الدم. إذا نزلت هذه النقاط القليلة على فرش السرير الوردي أو الأحمر اللون فقد يتذكر رؤيتها. إن الثقافة الجنسية ضرورية للشبان المقبلين على الزواج لمعرفة كل شيء عن غشاء البكاره وخصوصاً موضوع النزيف حيث إن كثيراً من الشبان يعتقد أن فض غشاء البكاره هو منبحة ينتج عنها دماء كثيرة وينتظر الدم الخارج من الفرج فلا يجده فتئور شكوكه حول عذرية الفتاة. مع ازدياد الممارسات الجنسية خارج نطاق الزواج ، ولخشية الفتاة من افتضاح أمرها عند الزواج أمام زوجها ، زادت هذه الأيام عمليات ترقيع غشاء البكاره في العيادات المشبوهة ووصلت تكلفتها إلى حوالي ٢٠٠٠ جنيه مصرى على الأقل. تعتمد طريقة عملية ترقيع غشاء البكاره علي عدد التمزقات

الموجودة به وعمقها ، وعلى الكمية المتبقية من الغشاء. تتم عملية الترقيع عن طريق خياطة الجزء المتبقى من غشاء البكاراة (إذا كان الجزء المتبقى كبير) أو عن طريق عمل غشاء صناعي يؤخذ من بعض الأنسجة من جدران المهبل.

إن موضوع غشاء البكاراة معقد ويجب أن يؤخذ بروية فكم من جرائم القتل وحالات الطلاق التي حدثت للفتيات لاعتقاد الزوج أنها ليست بكراء ، وأنصح لنا عند الكشف الطبي عليها أو عند تشريح جثمانها سلامة غشاء بكارتها. لذلك نحن ننصح بالتروي وعدم التسرع ونود أن تكون دراسة أخلاق الفتاة وأهلها خلال فترة الخطوبة هي الفيصل في الحكم على أخلاقيات الفتاة قبل الواقع في مشاكل غشاء البكاراة التي لا حصر لها.

### رأي الدين في البكاراة

شجع الدين في الزواج من البكر، فروي عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((تزوجوا الأبكار ، فإنهن أذنب أفواها ، وأنفق أرحاماً ، وأرضى باليسير)). ولقد وضح لنا الله أن جزاء المتقين من عباده أزواجاً من الحور العين ، أبكاراً لم يمسسهن أحد من قبل ، تتجدد إليهن البكاراة في كل مرة يجامعن فيها ، فقال سبحانه وتعالى في وصفهن: (إنا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً . فَجَعَلْنَاهُنَّ أَنْكَارًا) كما قال تعالى: (فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الْطَّرْفِ لَمْ يَطْمِنْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ).

### رأي الدين في ترقيع غشاء البكاراة

البكاراة ليست من أركان الزواج ، وليس من شروط صحته باتفاق العلماء والمذاهب إلا إذا اشترط هذا الشرط في صلب العقد ويصبح الالتزام به واجباً ، فإذا ثبنت أن الزوجة ليست بكرأً انفسخ عقد الزواج. ويجمع علماء الدين على إن زوال غشاء البكاراة يحيز للرجل أن يطلق زوجته مادامت لم تخبره بذلك قبل العقد ولم يخبره الولي به.

هناك رأيان للعلماء في عملية ترقيع غشاء البكاراة: الأول يرى عدم جواز رتق غشاء البكاراة مطلقاً ، والثاني يرى جواز ذلك في بعض الأحوال مثل

تعرض الفتاة للاغتصاب أو حادث. مبررات الفريق الأول الذي يرى عدم جواز رتق غشاء البكاراة هي:-

- (١) أن رتق غشاء البكاراة قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب ، فقد تحمل المرأة من الجماع السابق ، ثم تتزوج بعد رتق غشاء بكارتها ، وهذا يؤدي إلى إلحاد ذلك الحمل بالزوج واختلاط الحال بالحرام.
- (٢) أن رتق غشاء البكاراة فيه إطلاع على عورة الفتاة.
- (٣) أن رتق غشاء البكاراة يُسهل للفتيات ارتكاب جريمة الزنى لعلمهن بإمكان رتق غشاء البكاراة بعد الممارسات الجنسية الغير شرعية.
- (٤) أن من ثوابت الشريعة الإسلامية أن الضرر لا يزال بضرر وبالتالي لا يجوز للفتاة أن تزيل الضرر عنها برتق الغشاء وتلحقه بالزوج.
- (٥) أن مبدأ رتق غشاء البكاراة مبدأ غير شرعي لأنه نوع من الغش والكذب ، والغش والكذب محظيين شرعاً.
- (٦) أن رتق غشاء البكاراة يفتح الباب للأطباء لإجراء عمليات الإجهاض ، وإسقاط الأجنة بحجة الستر.

أما شيخ الأزهر د. محمد سيد طنطاوي فإنه يمنح الفتاة المغتصبة حق إخفاء قصتها عن زوج المستقبل وجواز رتق غشاء البكاراة ، إذ إن كل فعل تم عن طريق الاغتصاب مهدى، وكأنه لم يحصل.

إنني أرى أن فتح الباب أمام رتق غشاء البكاراة سيفتح الدعوة للتحلل الخلقى والتردى في الرذيلة ، إذ يوسع الأنثى المستهترة أن تمارس الفاحشة قبل الزواج ما شاعت وأن تعدد من علاقاتها الجنسية لاسيما إذا انعدم الوازع الدينى عندها ، لأنها تدرك أن ترقيع غشاء البكاراة سهل وفي متناول يدها متى شاعت.

من أهم المشكلات التي تجم عن الممارسات الجنسية الغير شرعية هي إنكار الأب علاقته بالطفل المولود وهو ما يدفع الأم لإقامة دعوى قضائية للاحاق المولود بأبيه. بالرغم من التقدم العلمي الرهيب في بصمة الحمض النووي التي يمكن من خلالها إثبات النسب دون أدنى شك ، لكن ذلك قد يتعارض مع الوسائل الشرعية المقررة لإثبات النسب. لذلك كان لابد لنا من إلقاء نظرة سريعة علي طريقة الشريعة الإسلامية في إثبات النسب قبل أن نتكلم عن البصمة الوراثية.

#### إثبات النسب في الشريعة الإسلامية

الأصل في النسب في الشريعة هو الانساب للأب وذلك في قوله تعالى في الآية ٥ من سورة الأحزاب ((ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوا لكم في الدين ومواليكم)). ينسب للرجل كل مولود له من علاقة شرعية ، ولكن ينسب للمرأة كل ما تلده سواء كان ذلك من زواج شرعي أو علاقة جنسية غير شرعية. نهت الشريعة الإسلامية عن إنكار النسب حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أيما رجل جد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله تعالى عنه ، وخصمه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيمة)). إثبات النسب في الشريعة يشمل الفراش ، والإهرار ، والبينة ، والقيافة ، والقرعة.

#### (١) إثبات النسب بالفراش

يقصد بالفراش الزوجية وهي التي تعني وجود عقد زواج صحيح مكتمل الأركان والشروط بين رجل وامرأة ، ولذلك أي طفل يولد من خلال هذا الزواج ينسب للزوج. الدليل علي ذلك قوله سبحانه وتعالى في الآية ١٨٧ من سورة البقرة ((هن لباس لكم وأنتم لباس لهن)) ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ((الولد للفراش وللعاهر الحجر)). العاهر هو الذي لا يقصد بالحجر أي لا شيء

له وقيل إن الحجر يشير إلى شدة العقوبة وهي الرجم بالحجر. وعلى ذلك فإن شروط نسب الفراش تشمل ما يلي:-

(أ) وجود زواج صحيح نتج عنه هذا المولود. أي إنه لا يمكن إثبات النسب للولد الناتج من علاقة جنسية غير شرعية مهما كان اسمها.

(ب) أن تلد المرأة بعد سنة أشهر على الأقل من الزواج ، وهي أقل مدة حمل كما سبق أن ذكرنا. فإذا ولد طفل بعد أربعة أو خمسة أشهر من الزواج لا يمكن نسبة للفراش لأنه يقل عن سنة أشهر.

(ج) أن لا تكون هناك أي موانع تمنع الاتصال الجنسي بين الزوجين مثل سفر الزوج للخارج أو وجود موانع صحية بالرجل تمنعه من المعاشرة الجنسية.

(د) أن يكون هناك تيقن منطقي من حدوث اتصال جنسي بين الزوج وزوجته بعد عقد الزواج.

نصت المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصية المصري علي ما يلي ((لا تسمع عند الإنكار دعوى نسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ، ولا لولد زوجة أنت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ، ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أنت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة)).

## (٢) الإقرار

الإقرار في الشرع يعني الاعتراف ، وهو من أقوى الأدلة لإثبات النسب ، فإذا أقر الرجل بأن هذا ولده ثبت النسب ، ولكن بالشروط التالية:-

(أ) أن يكون المقر بالغا وعاقلا.

(ب) ألا يسرح المقر بأن الولد جاء من زنا ، لأن الزنا لا يكون سببا في ثبوت النسب.

(ج) ألا ينزعه أحد في النسب.

- (د) معمولية الإقرار فإذا كان المقر عمره ٢٥ سنة فلا يجوز له ان يقر بابوة ولد عمره ١٥ سنة لاستحالة أن ينجب وعمره ١٠ سنوات.
- (هـ) ألا يكون الولد منسوب لأب غيره قبله.

### (٣) البينة

البينة شرعا هي الشهود العدول أي شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول بأن هذا الرجل هو الأب لهذا الابن ، وهو دليل قوي لإثبات النسب. دليل مشروعية البينة هو قوله تعالى في الآية الثانية من سورة الطلاق ((وأشهدوا نوبي عدل منكم وأقيموا الشهادة)).

### (٤) القيافة

القائم هو الشخص الذي يعرف شبه الرجل بأبيه ، والقيافة هي طريقة من طرق إثبات النسب. القيافة عن طريق الأقدام هي أن ينام مجموعة من الرجال بينهم الأب المتنازع عليه والطفل المتنازع عليه وتغطي أجسادهم بالكامل عدا الأقدام ثم ينظر القائم لأسفل الأقدام ويقول قدم هذا الولد من قدم هذا الرجل. لجأ الرسول صلى الله عليه وسلم للقيافة لحل بعض خلافات البنوة ومن أشهرها التشكيك في بنوة أسامة بن زيد لأبيه زيد بن حارثة. اشترط الفقهاء أن يكون القائم أهلا للشهادة وهي الإسلام والحرمة والرشد ، وأن يكون له تجربة.

### البصمة الوراثية

يبدأ خلق الإنسان بخلية واحدة أصلها حيوان منوي من الأب يحمل ٢٣ كروموسوم وبويضة من الأم تحمل ٢٣ كروموسوم ، وبالتالي فإن الجنين الناتج سيحمل نصف الصفات الوراثية من الأب ونصف الصفات الوراثية من الأم. هذه الصفات الوراثية للكائن الحي تستقر على جزيء الحمض النووي منذ بداية تكوينه وحتى موته. تعتبر بصمة الحمض النووي دليلاً نفي وإثبات قاطعاً بنسبة .٩٦٠%

بشأن استخدام تقنية البصمة الوراثية في إثبات النسب أوصي مجلس المجمع الفقهـي الإسلامي بمكة المكرمة الذي عقد عام ٢٠٠٢ م بما يلي ((تبين من ذلك كله أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين أو نفيهم عنهم ، فهي أقوى بكثير من القيافة العادـية وأن الخطأ في البصمة الوراثية ليس واردا من حيث هي ، وإنما الخطأ في الجهد البشـري أو عوامل التلوث ونحو ذلك ، وبناء على ما سبق قرر ما يأتي:ـ

(أ) إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد أن يحاط بمتنهـي الحذر والحيطة والسرية ، ولذلك لابد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعـية على البصمة الوراثية.

(ب) لا يجوز شرعا الاعتمـاد على البصمة الوراثـية في نـفي النـسب ، ولا يجوز تقديمها على اللـعان.

(ج) لا يجوز استخدام البصمة الوراثـية بقصد التأكـد من صـحة الأـنسـاب الثـابـنة شـرعا ، ويـجب على الجهات المـختـصـة منـعه وفـرض العـقوـبات الـزـاجـرة ، لأنـ فـي ذلك المـنـع حـمـاـية لأـعـراض النـاس وصـونـا لأـنسـابـهم.

(د) يـجوز الـاعـتمـاد على البصـمة الـورـاثـية في مـجال إـثـبـات النـسب فيـ الحالـات التـالـية:ـ

- \* حالات التـناـزع على مـجهـولـ النـسـب بـمـخـتـلـف صـورـ التـناـزعـ التي ذـكـرـهاـ الفـقهـاء ، سـوـاءـ أـكـانـتـ تـناـزعـ علىـ مـجهـولـ النـسـب بـسـبـبـ اـنـقـاءـ الـأـدـلـةـ أوـ تـساـويـهاـ ،ـ أمـ كـانـ بـسـبـبـ الـاشـتـراكـ فـيـ وـطـءـ الشـبـهـةـ وـنـحـوـهـ.

- \* حالاتـ الاـشـتـباءـ فـيـ الـموـالـيدـ فـيـ الـمـسـتـشـفـيـاتـ وـمـرـاكـزـ رـعـاـيةـ الـأـطـفـالـ وـنـحـوـهـ ،ـ وـكـذـاـ الاـشـتـباءـ فـيـ أـطـفـالـ الـأـنـابـيبـ.

- \* حالـاتـ ضـيـاعـ الـأـطـفـالـ وـاـخـتـلاـطـهـمـ بـسـبـبـ الـحـوـادـثـ أوـ الـكـوارـثـ أوـ الـحـرـوبـ ،ـ وـتـغـزـلـ مـعـرـفـةـ أـهـلـهـمـ ،ـ أوـ وـجـودـ جـنـثـ لمـ يـمـكـنـ التـعـرـفـ عـلـيـ هـوـيـتـهـ ،ـ أوـ بـقـصـدـ التـحـقـقـ مـنـ هـوـيـاتـ أـسـرـيـ الـحـرـوبـ وـالـمـفـقـدـيـنـ)).ـ

إن لجوء الرسول صلي الله عليه وسلم لمبدأ القيافة (مع احتمال خطنه لاته نوع من الفراسة ، ولاحتمال كذب القائل لأنه غير معصوم) يعني قبوله لمبدأ التوجّه لأهل العلم والخبرة ، ولما كانت القيافة هي آخر مداهم العلمي في ذلك العهد فهل نقف عندها الآن أم نستعين بالآيات التي أودعها الله فينا. إن علماء الدين وسط تلك الأجواء يجب أن يبحثوا نعمة الحمض التنجيتي التي أودعها الخالق فيما بروج منفتحة على علوم العصر ودون الإخلال بمبادئ الشريعة ، وذلك مصداقاً لقوله تعالى في الآية ٥٣ من سورة فصلت ((سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَقِيَ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوْلَمْ يَكُفِّ بِرِبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ)).

إنني أطالب رجال الدين بدراسة فوائد البصمة الوراثية والاجتهاد للزمن الذي يعيشون فيه ، فمما هو ثابت اختلاف الفتوى باختلاف الزمان والمكان ، ولما كان الزمان ليس كما كان منذ ١٥ قرن ومع المستجدات في التقدم العلمي والانحطاط الأخلاقي يجب أن ندرس موضوع إثبات النسب بعناية. إن الإمام علي بن أبي طالب أجري قرعة بين ثلاثة رجال ليلحق نسبه بمن يكسب القرعة بعد أن أنجيبت امرأة ولد وأدعت معاشرتها لثلاثة رجال ، فهل خالف الإمام علي الشرع في اجتهاده. إننا لا نريد أن تشجع الفساد ، ولا نريد أن نخالف الشرع ، وندرك أننا لا نملك الاجتهاد مع وجود نص شرعي ، ولكننا ندرك أن الشرع مشوق لإثبات النسب حفاظاً على الأبناء والأمة ومنعاً لاختلاط الأنساب وضياعها بين الناس. لذا فإننا ندق ناقوس الخطر لزيادة أعداد هؤلاء المواليد وخطورتها الشديدة على كيان وأمن الوطن.

كما سبق أن ذكرنا أن المُصل في النسب أن ينتسب الشخص لوالده ، ولكن تعلّت الآن صيحات غريبة في مصر تناادي بأن يكتب أسم الشخص ثم أسم أمه ثم أسم أبيه مخالفة لأحكام الشريعة ، وهو ما يعني نسب الشخص إلى الأم

والأب وذلك تكريماً للأم حسب رأي تلك الأفكار الشاذة التي تخرج علينا تباعاً تحت مسمى حقوق المرأة؟.

#### **رابعاً:- الأطفال للقطاء الأحياء**

الأطفال للقطاء هم الأطفال الذين يولدون نتيجة علاقة جنسية غير شرعية يحرص أصحابها على أخفاء نتائجها بأية طريقة ، فيلقون بهم في الأزقة والشوارع وأمام المساجد والمؤسسات ويغادرون المكان مسرعين ليتركوهن لل المصير المجهول.

نسبة كبيرة من هؤلاء الأطفال يلقون حتفهم نتيجة تركهم في ظروف مناخية سيئة بدون رضاعة وتعرضهم لنهاش الحيوانات كالكلاب والقطط ، وبافي هؤلاء الأطفال يعثر عليهم أحياe ويتم إيداعهم ملاجيء الأيتام.

تشير الدراسات أن عدد اللقطاء ليس قليلاً في شتى أنحاء الوطن العربي. في مصر كان عدد الأطفال للقطاء الأحياء المعثور عليهم في التسعينيات في تزايد مستمر كالتالي: عام ١٩٩٦م (١٥٠٤ طفل) ، عام ١٩٩٧م (١٧٢٢ طفل) ، وعام ١٩٩٨م (٢١١٥ طفل). ثم بدأ عدد الأطفال للقطاء يتناقص في بداية القرن كالتالي: عام ٢٠٠٠م (١٣٥٣ طفل) ، عام ٢٠٠٢م (١٤٢٨ طفل) ، عام ٢٠٠٤م (١٣٠٨ طفل) ، وعام ٢٠٠٥م (١٣١٢ طفل).

في دراسة أجريت في السودان أظهرت أن عدد اللقطاء الأحياء عام ١٩٩٨ كان ٣٨٩ طفل ، وفي عام ١٩٩٩م وصل إلى ٤٦٠ طفل ، ثم ارتفع عام ٢٠٠٠ إلى ٥٢٢ ، ووصل عام ٢٠٠١ إلى ٥٣٨ طفل. أظهرت هذه الدراسة السودانية أن أماكن العثور على اللقطاء كانت كالتالي: في الشارع العام (%٦٠) ، والمستشفيات (%١٨) ، والمنازل (%١١) ، ومواقع أخرى بلغت النسبة فيها (%١١). تكشف الإحصاءات الرسمية لوزارة الشئون الاجتماعية السعودية أن عدد اللقطاء الذين دخلوا دار الملاحظة الاجتماعية في عشرين عاماً منذ عام

١٩٨١م حتى ٢٠٠١م بلغ ٦٤١٩ طفل ، وان هناك ٥١٥٩ طفل اخر تسلتمهم أسر لرعايتهم بنظام الأسرة البديلة. تشير دراسة أخرى أن مجمع الرياض الطبي يتسلم ٣٣٦-٢٤٠ طفلاً سنوياً وهو ما يمثل كل مجموع القطاعات في المنطقة الوسطى للسعودية.

أول شيء تتطلع إليه الحكمرات هو إيواء هؤلاء الأطفال. معظم أماكن إيواء هؤلاء الأطفال تخلي من المرافق الرياضية المنظمة والقاعات المغلقة وقاعة المسرح والورش المهنية للتدريب والمشاغل الفنية وجميع وسائل الترفيه.

إن حضن الأسرة لا يمكن أن تعوضه دور الإيواء أو الجمعيات الخيرية مما بلغت مثاليتها في تقديم خدماتها ، حيث تعزل تلك الدور الأطفال عن المجتمع في رعاية مؤسساتية لا يشعر الفرد من خلالها بأي علاقة خاصة كتلك القائمة بين الطفل وأمه وأسرته ، مما يفقد الطفل إشباع احتياجاته الطبيعية كالحب والاستقرار النفسي ، وبالتالي تظهر المشكلات النفسية والاجتماعية لدى القطاعات عندما يكبرون ويبدأون في التعامل مع العالم من حولهم.

عندما يعرف هذا اللقيط حقته تدور أسئلة في ذهنه يحاول أن يجد لها إجابة وهي: من أنا ؟ ومن هي أمي ؟ وأين أسرتي ؟ وهل تبحث أمي أو أسرتي عنني؟. عندما لا يجد أجوبة شافية على أسئلته يلجأ إلى الانطواء والعزلة ، ويعاني من مشاكل اجتماعية ونفسية كبيرة مثل الشعور بالحرمان ، والقلق والاكتئاب ، والإحساس بالذنب ، والشروع الذهنـي ، والشعور بالنقص ، والشعور بالاضطراب ، والعزلة والانسحاب ، وعدم الثقة في النفس ، والبحث عن تأكيد الذات بحب التعدي والميل للتخييب والعدوانية وحب الانتقام ، والخوف من المجتمع والنقطة عليه ، وممارسة الكذب ، والشعور بالضيق الشديد لوجوده في دار الإيواء ، والخجل عند التعامل مع الآخرين ، والاضطرابات أثناء النوم ، والتبول اللاإرادـي ، والتعثر في الدراسة وتركها بدون هدف ، وانعدام الطموح.

ترجع تلك المشاكل النفسية والاجتماعية إلى افتقار الأطفال للجو الأسري والحرمان العاطفي من الأبوين ، ونظارات الازدراء والشفقة التي قد تصل لحد الاحتقار والاشمئزاز أو الرفض وعدم القبول من بعض أفراد المجتمع (بعض أفراد المجتمع ترى اللقيط أصله بذرة ملوثة غير نظيفة ، أو كما يقولون ابن حرام) ، والقصور في الخدمات التربوية والاجتماعية المقدمة لهم منذ السنوات الإيوائية الأولى.

تعاملت الشريعة الإسلامية مع اللقيط على أنه نفس محترمة في الإسلام تستحق الحفظ والعناية والرعاية ، والتقاطه من الأرض لحفظه على حياته فرض كما قال سبحانه وتعالى ((ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً)) ، وقال عليه الصلاة والسلام: (من لم يرحم صغيراً، ولم يوفر كبيراً فليس منا). ويرى علماء الدين أن المرأة أو الرجل الذي يلقى بولده للتخلص منه ويتوافق نتيجة لذلك فهو قاتل نفس محترمة. كما أفتلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية بأن مجھولي النسب في حكم اليتيم لفقدهم لوالديهم ، بل هم أشد حاجة للعناية والرعاية من معروفي النسب لعدم معرفة قريب يلجأون إليه عند الضرورة. وعلى ذلك فإن من يكفل طفلاً من مجھولي النسب فإنه يدخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ((أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطي وفرج بينهما شيئاً)). عند رجم امرأة تنفيذاً لحد الزنا فيها، أعطي الرسول صلى الله عليه وسلم ابنها إلى أحد الصحابة ليكفله ويرعايه بعد أن تموت الأم التي سيقام عليها حد الزنا ، وذلك من مبدأ قول الله تعالى ((فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ)).

يرى علماء النفس أن شخصية الطفل اللقيط لا يمكن أن تكون سوية ، فمهما علت شخصيته سيسشعر أنه لا نسب له وأنه مجھول الهوية ، مما سيضطره إلى أن يظلم المجتمع كله ويصبح متشدداً مع الجميع وعواناته للجميع لها جذور

متصلة داخل نفسه المعتمة والمظلمة. إن هذا الطفل اللقيط لا يمكن أن يشعر بالأمان وحبه ومحبته للآخرين لأنه لم يعش لحظة حنان واحدة منذ أن ولد.

لتلافي مشكلات اللقطاء في مؤسسات الإيواء بدأت الحكومات والجمعيات الأهلية في التفكير في إيداع الطفل لدى أسرة وهو ما يسمى بالأسرة البديلة أو الأسرة الحاضنة التي تقوم باحتضان الطفل لتعويضه عن أسرته الطبيعية التي حرر منها ودمجه في المجتمع. إن نظام الأسر البديلة جاء ليحل مشكلة قصور الخدمات في مؤسسات الإيواء ، وتزايد أعداد الأطفال في الدور ، وينشأ علاقة حميمة بين الطفل والأسرة عكس دور الإيواء التي تكون المربية مسؤولة عن عشرة أطفال على الأقل. هناك نظام آخر تعمل به بعض الدول وهو ما يسمى **الأسرة الصديقة** وذلك من خلال تبادل زيارات جزئية بين الطفل والأسرة الصديقة في نهاية الأسبوع وأيام الأعياد والأجازات المدرسية عند عدم توفر فرصة الأسرة البديلة.

نظرًا لعدم تقبل بعض اللقطاء واقعهم الذي وجدوا فيه ونتيجة لحالتهم النفسية السيئة فإن نسبة كبيرة منهم تهرب من مؤسسات الإيواء إلى الشارع ليصبح الشارع مأوي لهم ، وبذلك نصف طفل جديد إلى قائمة أطفال الشوارع. في الشارع يبقى هؤلاء الأطفال تحت رحمة الظروف ويفهمون في الشوارع بلا وجهة أو مقصد للبحث عن الطعام ومكان يأويهم للنوم. يعمل هؤلاء الأطفال في بيع المنايد والأكياس البلاستيكية ومسح الأحذية وغسل السيارات أو بعض ورش السيارات للحصول على قوت يومهم ، وإن كان معظم هؤلاء الأطفال لا يجدون عملاً ويمتهنون التسول حرفة. نسبة كبيرة من الإناث تعملن خادمات في المنازل. هؤلاء الأطفال قد يجدوا وجبة طعام واحدة في اليوم أو لا يجدوا نهايًّا وبحصلوا على غذائهم من صناديق القمامه. ينام هؤلاء الأطفال بالشارع في ظروف قاسية معرضين للبرد دون غطاء وفي أماكن غير آمنة وغير مرية أمام مداخل العمارت أو الإدارات الحكومية أو أسفل الكباري.

إن تواجد هؤلاء الأطفال دون حماية في الشارع يجعلهم عرضة لإيمان المواد الرخيصة مثل الكلة والبنزين والبانجو ، و يجعلهم عرضة للتحرش والاعتداءات الجنسية والاغتصاب والشذوذ الجنسي ، وقد تستقطبهم شبكات الدعارة للعمل كأعضاء فيها وخاصة الأطفال الإناث ، أو تستقطبهم عصابات التسول للعمل لحسابهم في المياضين والشوارع العامة ، أو تستقطبهم عصابات سرقات المنازل والسيارات والأشخاص للاشتراك في هذه العصابة ، أو تستقطبهم عصابات سياحة الجنس مع الأطفال الرائجة عالميا الآن وذلك نظراً لكون مصر يدخلها عدد كبير من السائحين. خلاصة القول إن هروب هذا اللقيط من مؤسسة الإيواء وبال عليه و وبال أشد على المجتمع الذي سيستقبل مشروع مجرم جاهز لكونه حاقد ونافق على المجتمع ووجد في ظروف حياتية صعبة في الشارع.

#### خامساً— زيادة عدد ممارسي الدعارة في المجتمع

المارسات الجنسية الغير شرعية تؤدي إلى زيادة عدد ممارسي الدعارة من خلال:-

(أ) الفتاة التي تحمل حمل سفاح قد لا تستطيع أن تجهض نفسها ثم تخشى على نفسها من القتل إذا علم أهلها ، فتهرب من المنزل وتخرج إلى الشارع لتبث عن مأوي. في الشارع تصبح الفتاة عرضة لأهوال لا حصر لها وأهمها هي استقطابها من قبل شبكات الدعارة ، وفي النهاية تجد نفسها سلعة رخيصة وتنتهن مهنة الدعارة.

(ب) الطفل اللقيط الذي يهرب من مؤسسة الإيواء وخاصة الإناث ، وتستقطبهم شبكات الدعارة للانضمام لها.

#### سادساً— انتقال الأمراض التناسلية

بعض الأمراض التناسلية قد تنتقل بين الذكر والأخرى عن طريق الاتصال الجنسي ، إذا كان أحدهم يعاني من أحد هذه الأمراض التناسلية. معظم هذه

الأمراض بسيطة وسهلة التشخيص والعلاج ، ولكن القليل منها خطير وله مضاعفات جسيمة قد تؤدي لعقم المرأة. تزداد نسبة حدوث هذه الأمراض بين الفتيات الغير متعلمات والفقيرات لممارستهن الجنس بدون استخدام واقي ذكري وعدم توجيهن للعلاج عند وجود أي شكوى صحية.

تشمل الأمراض التي يمكن انتقالها عن طريق الاتصال الجنسي داء الوحدات المشعرة Trichomoniasis ، والقرحة الرخوية ، والحرافش البرعمية Chlamydia ، والسيلان Gonorrhea ، والزهري ، والهربس ، والسنطة ، والجرب ، وقمل العانة ، والالتهابات الفطرية ، والبريماء الباهنة Treponema pallidum ، وفيروس الكبد B ، والإيدز. الأعراض الدالة على حدوث أحد أمراض الاتصال الجنسي تظهر بعد حوالي أسبوعين من الممارسة وتشمل:-

- \* حرقان عند التبول وصعوبة التبول.
- \* هرش في المنطقة التناسلية.
- \* ظهور قرح أو نتوءات أو أورام على الأعضاء التناسلية.
- \* وجود إفرازات تناسلية نقحية لها رائحة أو لون غير طبيعي.
- \* وجود آلام بمنطقة الحوض وأسفل البطن.

#### سابعاً- زيادة نسبة المتسربين من التعليم

معظم حالات الحمل الغير شرعي حدثت في مصر للطلاب الجامعيات في عامهم الجامعي الأول. في دراسة أجرتها وزارة الشئون الاجتماعية في مصر أظهرت أن حوالي ٢٥٥ ألف طالب وطالبة جامعيين (بنسبة حوالي ١٧% من طلبة الجامعة) قد تزوجوا زواجا عرفيا. بل إن مجلة الأزهر ذكرت في عددها الصادر في يونيو ٢٠٠٦ أن عدد الحالات التي أعلنت عن زواجهما العرفي وصلت إلى ٤٠٠ ألف حالة هذا بخلاف الذين لم يبوحوا بزواجهم العرفي.

إن تلك الممارسات الجنسية الغير شرعية وتوبعها (أهمها الحمل أو اكتشاف العلاقة من قبل الأهل) تعيق الفتاة عن مواصلة الدراسة الجامعية سواء نتيجة العيوب النفسي الواقع عليها ، أو تخلفها عن حضور المحاضرات من أجل تلك العلاقة ، أو نتيجة منع الأهل لها من الذهاب للجامعة بعد اكتشاف العلاقة أو ظهور توبعها كالحمل. تشير دراسة أمريكية أن حوالي ٣٣٪ فقط من الطالبات الأمريكيات اللاتي يحملن خارج نطاق الزواج أثناء الدراسة الجامعية هن اللاتي يستطيعن إنهاء دراستهن الجامعية ، بينما تفشل الباقيات في استكمال الدراسة الجامعية.

إن الأطفال اللقطاء أيضا لديهم مشكلة كبيرة في التعليم نظرا للظروف النفسية والاجتماعية التي يمررون بها بعد علمهم بحقيقةهم. معظم هؤلاء الأطفال لا يحصلون على تعليم جامعي ، والكثير منهم يهرب من مؤسسات الإيواء ولا يحصلون إلا على جزء يسير من التعليم قبل هروبهم. كذلك "اب النشط جنسياً" الممارس للعلاقات الجنسية الغير شرعية دائما لا يرقى إلى المستويات العليا من التعليم. أي إن الممارسات الجنسية الغير شرعية تؤثر تأثيراً شديداً على درجة التعليم للفتاة والشاب والطفل الغير الشرعي الناتج من تلك العلاقة.

#### ثماناً- زيادة نسبة الجريمة في المجتمع

العلاقات الجنسية الغير شرعية تؤدي إلى زيادة الجريمة في المجتمع من خلال:-

\* جرائم الشرف التي قد تشمل قتل الفتاة أو قتل الشاب أو قتلهما معاً أو قتل الطفل الناتج من تلك العلاقة.

\* هروب الفتاة من المنزل واستغلالها بالدعارة وما يتبعها من جرائم.

\* هروب الطفل من مؤسسات الإيواء واحترافه السرقة أو التسول أو الدعارة أو سباحة الجنس أو تجارة المخدرات ، أضف إلى ذلك عدوانيته للمجتمع التي قد تجعله عنصر من عناصر الإرهاب.

## المراجع

### أولاً: المراجع العربية

- دكتور/إبراهيم صادق الجندي ، مقدم/حسين حسن الحصيني (٢٠٠٢):  
تطبيقات تقنية البصمة الوراثية D.N.A في التحقيق والطب الشرعي  
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية – الرياض.
- دكتور/حسني فتوح والي (٢٠٠٦):  
الإسلام ومستقبل البشرية  
مجلة الأزهر – الجزء (٢) السنة (٧٩) – مارس ٢٠٠٦.
- دكتور/صلاح الدين مكارم وآخرون (١٩٨٤):  
الطب الشرعي في خدمة الأمن والعدالة  
مكتبة الخدمات الحديثة – جدة.
- دكتور/عدنان خالد التركماني (١٩٩٤):  
المعايير الشرعية والنفسية في التحقيق الجنائي (الجزء الثاني)  
دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب – الرياض.
- الشيخ/عمر الدبيب (٢٠٠٦):  
تكريم الإسلام للمرأة  
مجلة الأزهر – الجزء (٢) السنة (٧٩) – مارس ٢٠٠٦.
- : مجموعة من أساتذة الطب الشرعي في كليات الطب بالجامعات العربية (١٩٩٣):  
الطب الشرعي والسموميات  
منظمة الصحة العالمية – القاهرة.
- دكتور/ محمد الدريج (٢٠٠١):  
أشكال استغلال الأطفال وسوء معاملتهم في المجتمع المغربي: سوء معاملة  
الأطفال واستغلالهم غير المشروع.  
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية – الرياض.

- دكتور/ محمد رجب البيومي (٢٠٠٦) :  
من مآسي الزواج العرفي  
مجلة الأزهر - الجزء (٥) ، السنة (٧٩) ، يونيو ٢٠٠٦.
- دكتور/ محمد شحاته ربيع ، دكتور/ جمعه سيد يوسف ، دكتور/ معتز سيد عبد الله (١٩٩٤) :  
علم النفس الجنائي  
دار غريب للطباعة والنشر - القاهرة.
- دكتور/ محمد فريد الشافعي (٢٠٠٥) :  
البصمة الوراثية ودورها في الإثبات  
دار البيان للطباعة والنشر - القاهرة.
- دكتور/ محمود أحمد طه (١٩٩٩) :  
الحماية الجنائية للطفل المجنى عليه  
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية - الرياض.
- دكتور/ مساعد إبراهيم الحديثي (١٩٩٥) :  
مبادئ علم الاجتماع الجنائي  
مكتبة العبيكان - الرياض
- مستشار/ معرض عبد التواب ، دكتور/ سينوتو حليم دوس (١٩٩٩) :  
الطب الشرعي والتحقيق الجنائي والأدلة الجنائية  
القاهرة.
- دكتور/ هشام عبد الحميد فرج (٢٠٠٥) :  
الجريمة الجنسية  
مكتبة نادي القضاة - القاهرة.

دكتور/هشام عبد الحميد فرج (٢٠٠٥):

الاختناق (أسفكسيا)

مكتبة نادي القضاة — القاهرة.

### ثانياً: موقع بالإنترنت

دنيا الوطن

لقطاء من الذكور والإإناث على أرصفة الطرقات السعودية.

### صحة

القرآن والطب — دكتور/فواز القاسم

محلية حسور

سلسلة تعرفوا على أنفسكم — دكتور/لؤي خادم.

مركز قضايا المرأة المصرية

جرائم الشرف — أ/كريمة كمال.

ومينز اي نيوز

سلطة القانون والحقوق الإنجابية للمرأة الأمريكية — كيمبيرلي جاديت.

### ثالثاً: المراجع الأجنبية

Di Maio, D and Di Maio, V. (1993):

Forensic pathology

CRC Press, Boca Raton.

Farg, A. (1982):

A short textbook of sexology

The scientific book centre, Cairo.

Faulk, M. (1994):

Basic forensic psychiatry

Blackwell science, Winchester.

Finkbeiner, W., et al., (2004):

Autopsy pathology

Churchill livingstone, California.

- Geberth, V. (1996):**  
Practical homicide investigation  
CRC Press, New York.
- Girardin, B., et al (1997):**  
Color atlas of sexual assault  
Mosby-year book, Inc. USA.
- Govindiah, D. (1999):**  
Colour atlas of forensic medicine  
Jaypee brothers, New Delhi.
- Knight, B. (1996):**  
Forensic pathology  
Edward Arnold, London.
- Knight, B. (1997):**  
Simpson's forensic medicine  
Edward Arnold, London.
- Mason, J. (1977):**  
The pathology of violent injury  
Edward Arnold, London.
- McLay, W. (1996):**  
Clinical forensic medicine  
Greenwich medical media, London.
- Sanbar, S., et al., (2001):**  
Legal medicine  
Mosby, USA.
- Siegel, J., et al (2000):**  
Encyclopedia of forensic sciences  
Academic press.
- Synder, L. (1977):**  
Homicide investigation  
Charles Thomas, USA.
- Vanezis, P. and Busuttil, A. (1996):**  
Suspicious death scene investigation.  
Edward Arnold, London.





## المؤلف في سطور

- بكالوريوس الطب والجراحة عام ١٩٨٧ م.
- ماجستير الطب الشرعى والسموم عام ١٩٩٦ م.
- دكتوراة الطب الشرعى والسموم عام ٢٠٠٤ م.

### إصدارات المؤلف السابقة

- معاينة مسرح الجريمة عام ٢٠٠٤ م.
- الجريمة الجنسية عام ٢٠٠٥ م.
- الاختناق (أسفكسيا) عام ٢٠٠٥ م.
- إصابات الأسلحة النارية عام ٢٠٠٦ م.

• مدير إدارة الطب الشرعى بمحافظة المنوفية  
بمصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل.



مطابع الولاء الكبيرة

٤٨/٢٢٣٥٩٠١