

ا نصيحة لنجاح
المعاشرة الزوجية
وزيادة الخصوبة
وفرصة الإنجاب

رسور أمين الحسيني

كيف تستعد للزواج وتستعد بالإنجاب ؟




- عيوب بجهازك التناسلي لها علاج .. لا تيأس !!
- أشياء تهدىء خصوبتك : جلد الدجاج ، والتدخين ، والإشعاع ؟
- انتبهوا يا شباب : حمامات الماء الساخن تضر بالخصوبة ؟
- نصيحة من خبير : تناولوا البيضين النين وزبالت
كبد الع霍ت ولا يعوالى ؟
- انتبه : الرجل أضعف سهلاً من المرأة .. وأقصر عمرًا منها ؟
- الأغذية المطلوبة للنكاح والخصوبة .. ما هي ؟

ماراللائعة



النشر والتوزيع والتوزيع

د / أيمن الحسيني



كيف تستعد للزواج وتسعد بالإنجاب؟

١٠٠ نصيحة لنجاح المعاشرة الزوجية وزيادة الخصوبة وفرص الإنجاب

- عيوب بجهة اذك التناسلي لها علاج .. لا تيأس !
 - أشياء تهدد خصوبتك ، جلد الدجاج ، والتدخين ، والإشعاع ؟
 - انتبهوا يا شباب ، حمامات الماء الساخن تضر الخصوبة ؟
 - نصيحة من خبير ، تناولوا البيض النبئ وزيت كبد الحوت وادعوا لي ؟
 - انتبه ! الرجل أضعف صحيبا من المرأة .. واقصر عمرها !!
 - الأغذية المطلوبة للنكاح والخصوبة .. ما هي ؟

دار الطلائع للنشر والتوزيع والتصدير

٥٩ شارع عبد الحكيم الرافعي ناسخة استاد مكرم عبيد وسمير فرجات

مدينة نصر - القاهرة - ت: ٢٧٤٤٦٤٢ - ٢٣٨٩٣٧٧ (٢٠٢) فاكس: ٢٣٨٣٠٤٩٣

Dar El-Talae For Publishing , Distributing and Exporting

59 Abdel Hakim El Refae St. Nasr City - Cairo

Tel : (202) 2744642 - 6389372 Fax : (202) 6380483

•• جميع الحقوق محفوظة للناشر

يحظر طبع أو نقل أو ترجمة أو اقتباس أي جزء من هذا الكتاب دون إذن كتابي سابق
من الناشر، وأية استفسارات تطلب على عنوان الناشر.

*No Part Of This Book May Be Reproduced By any Process Without
Written Permission. Inquiries Should Be Addressed To The Publisher .*

رقم الإيصال : ٢٠٠٢/٨٤٧١

الرقم الدولي : ٩٧٧-٢٧٧-٢٧٤-٤

تصميم الغلاف : إبراهيم محمد إبراهيم

★ تطلب جميع مطبوعاتنا بالمملكة العربية السعودية
من وكيلنا الوحيد : مكتبة الدار البيضاء للطبع والنشر والتوزيع
تليفون: ٩٦٦٤٣٥٩٠٦٦ - ٩٦٠٢٣٤٠٣٥٠ فاكس: ٩٦٠٢٣٥٧٠١

تم الطبع بمطبوع ابن سينا بالقاهرة تليفون: ٩٦٠٩٧٢٨

مقدمة

هناك عشرات الأسئلة تدور في ذهن كل شاب مقدم على الزواج :

هل سأوفق في ليلة الزفاف ؟

ما هو منظر هذا " الدم " الذي يقولون عنه ؟

كيف سأجتمع عروسي ؟

هل سأنجح في الإنجاب ؟ وما هي درجة خصوبتي ؟

هل جهازى التناسلى بخير ؟

هل هناك أغذية مفيدة للمتزوجين حديثا ؟

هل هناك استعدادات صحية معينة يجب الأخذ بها ؟

وغير ذلك من التساؤلات المقلقة ...

وفي هذا الكتاب ، أيها الأصدقاء ، تجدون إجابات صريحة وواافية عن أغلب تساؤلاتكم الحائرة حول المعاشرة الزوجية والخصوصية والإنجاب .

ولأنى أعتبر أن توضيح هذه الأمور شيء فى غاية الأهمية لتجنب كثير من المآزر والمواقف الحرجة التي تحتاج إلى فهم وتوضيح ، بشرط أن يكون الحديث عنها علمياً وموضوعياً .

فأرجو أن يضع هذا الكتاب النقط على الحروف ، ويصحح بعض الاعتقادات الخاطئة ، ويساعد كل زوج حديث في اجتياز الطريق الصحيح لنجاح المعاشرة الزوجية ، وتحقيق الإنجاب ، وبناء أسرة سعيدة .

مع تمنياتى بالتوفيق ،

المؤلف



صحتك قبل الزواج :

كيف ترفع كفاءتك الصحية والبدنية؟



- انتبه : الرجل أضعف صحيًا من المرأة !
- صحتك في غذائك فاعرف ماذا تأكل
- أغذية تخدم صحتك الجنسية والإنجابية
- الزواج يحتاج إلى عضلات قوية ولياقة بدنية ..
فاستعد من الآن !



الرجل أضعف صحياً من المرأة !

١٢٣٤٥٦٧٨٩٠

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

- إذا كنت تتصور أن الرجل هو الطرف الأقوى صحياً أو أنه " طرزان " الذي لا يقهر ، والنبي يُعمر أمدًا طويلاً من الدهر فأنت مخطئ !!
- فالإحصائيات تقول : إن رجل هذا العصر أضعف صحياً من المرأة وغالباً ما يموت قبلها !
- انظر حولك لكي تتأكد لك صحة هذه المعلومة .. فترى بيوتاً كثيرة خلت من رجالها بينما لا زالت تعيّرها نساء !
- وإليك نتائج بعض الإحصائيات التي أجريت حول هذا الموضوع :
 - تذكر إحصائية قامت بها إحدى الجامعات البريطانية أن جنس الرجل تتضاعف فرصته بالنسبة لجنس النساء للوفاة قبل سن ٦٥ عاماً .
 - وتذكر إحصائية بريطانية أخرى أجريت في سنة ١٩٩٥ أن العمر الافتراضي للمواليد الذكور لا يزيد على ٧٤ سنة في أغلب الأحوال أما المواليد الإناث فمن المتوقع أن يتجاوز عمرهن الافتراضي ٧٩ عاماً .
- تذكر الإحصائيات أن أغلب المعمرين في اليابان ينتمون لجنس الإناث.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

هناك عدة أسباب وراء ذلك ...

- إن هرمون الأنوثة المعروف باسم "استروجين" يوفر للمرأة حماية كبيرة .. ففضلاً عن هذا الهرمون لا تتعرض المرأة للإصابة بالأزمات القلبية قبل بلوغ سن اليأس ، وهي السن التي ينقطع عندها إنتاج هذا الهرمون من المبيضين ، بينما جنس الرجل لا تتوافر له مثل هذه الحماية ، ولذا فإن فرصة الإصابة بالأزمات القلبية الخطيرة المميتة تكون أكبر بكثير بين جنس الرجل بالنسبة لجنس النساء ، أما بعد بلوغ سن اليأس فإن فرصة الإصابة بالأزمات القلبية بين النساء بالنسبة للرجل تكون متساوية أو تكون أقل أحياناً .
- الرجل أكثر ميلاً للانتحار بالنسبة للنساء !! ذكرت هذه الحقيقة بعض الإحصائيات العالمية . ففي بريطانيا ، على سبيل المثل ، بلغت نسبة حالات الانتحار في سنة 1997 بين الشباب والرجل ثلاثة أضعاف نسبة الانتحار بين الفتيات والسيدات . وكان أغلب المتزوجين من المراهقين والشباب . وهذا يعكس من ناحية أخرى أن البناء النفسي كذلك للرجل قد يكون أضعف منه بالنسبة للمرأة بالإضافة للضعف الصحي الذي يتميز به الرجل بالنسبة للنساء .
- الرجل أكثر إقبالاً على التدخين وتعاطي المخدرات والمسكرات ، فبسبب هذا العامل يموت عند كبير من الشباب والرجل في سن مبكرة كضحايا للمضاعفات الخطيرة لهذه السموم ، كالآزمات القلبية ، والإصابة بالسرطانات .
- تتميز حياة كثير من الشباب بنوع من الاستهثار واللامبالاة بالنسبة للفتيات والنساء .. فهم لا يهتمون على سبيل المثل بممارسة الأنشطة الرياضية ، والالتزام بعدد كاف من ساعات النوم ، ويهملون أسس التغذية السليمة .
- تذكر بعض الدراسات أن الرجل أقل مقدرة عن المرأة بصفة عامة في التكيف مع الضغوط النفسية (stress) .. ولذا فإنه يتعرض بنسبة أكبر من المرأة للمضاعفات الوخيمة للضغط النفسي كالإصابة بمرض السكري ، وارتفاع ضغط الدم ، والإصابة بالسرطانات .

• يعتبر الرجل بصفة عامة أكثر عرضة للضغوط النفسية بالنسبة للمرأة لما تفرضه عليه ظروف الحياة العصرية من مسؤوليات جسمية كتوقف المسكن المناسب والتدخل الكافي إلى آخره . وهذا يجعله بالتالي فريسة للمضاعفات الناتجة عن هذه الضغوط النفسية إذا لم يتمكن من التكيف معها .

• بالنسبة للرجل في المجتمعات الغربية فإنه لا يعبأ في كثير من الأحيان بمخطورة الانحراف الجنسي والأخذ بالاحتياطات الكافية للوقاية من الإيدز وأمراض الاتصال الجنسي (الزنا) . ولذا فإنه ليس غريبا أن يرتفع عدد المصابين بالإيدز وأمراض الاتصال الجنسي سنة بعد الأخرى .. هذه الأمراض التي تفتكر سنويا بمناث الصحايا وأغلبهم من جنس الرجل .

لقد سجلت الإحصائيات في إنجلترا ومقاطعة ويلز زيادة في نسبة الإصابة بمرض السيلان بين الرجل بلغت ١٧% وتلك الفترة ما بين سنة ١٩٩٥ إلى سنة ١٩٩٦.

وما يعكس حالة عدم الاكتئاب بين الشباب والرجال في دول الغرب بمخطورة الإصابة بالأمراض الجنسية على الرغم مما تبنته وسائل الإعلام هناك من تحذيرات متكررة .

• وبالإضافة لكل ما سبق ، فإن الرجال عادة أقل اكتئانا من النساء ببحث مشاكلهم الصحية وعلاجها في وقت مناسب . فنذكر إحصائية أجرتها الكلية الملكية البريطانية للممارس العام أن حوالي ٣٢% من الرجل لا يذهبون للطبيب العام (GP) إلا بعد أن تسوء حالتهم الصحية بدرجة واضحة .

كما كشفت إحصائيات أخرى أن حوالي ٢٥% من الرجال الذين يعانون من اكتئاب شديد لا يذهبون للطبيب المختص بينما يكتفون بالتحدث لأصدقائهم أو زوجاتهم مما يحرّمهم من العلاج المناسب الذي يمكن أن يوفر لهم الوقاية من التأثيرات المخantine السلبية لحالة الاكتئاب .

كما وجد أيضا أن أغلب الرجال الذين يصابون بضعف الانتصاب لا يذهبون للطبيب المختص ويكتفون بالمعانة في صمت من هذه المشكلة مما يعرضهم من ناحية أخرى لتأثيرات نفسية سيئة !



صحتك في غذائك .. فاعرف ماذا تأكل

نظامك الغذائي العالى يحدد كفاءتك الصحية :

لأشك أن نظامك الغذائي يحدد بدرجة كبيرة مدى كفاءتك الصحية ، فإن كان هذا النظام متماشيا مع أسس التغذية السليمة زادت كفاءتك الصحية .. أما إذا كان نظاما خاطئا زادت قابليةك للتعب والإرهاق والعدوى المتكررة وهو ما لا يتفق مع استعدادك لبدء حياة زوجية جديدة تحتاج إلى صحة جيدة وبدن قوي .

دعنا نلقي الضوء على هذا الموضوع ، وهو : كيف نختار غذاءنا بشكل صحيح ؟

إننا نحتاج إلى الغذاء ليمد أجسامنا بالطاقة التي تجعل خلايا أجسامنا قادرة على الحياة والنشاط . كما يمدنا الغذاء بالمواد الخام الضرورية للنمو ولتجديد ما يهلك من أنسجة الجسم . وفضلاً عن ذلك ، فنحن نحتاج إلى الغذاء كله لأنواع المتعة فلاشك أن فيه لللة كبيرة لنا .

والحقيقة أن الالتزام بأسلوب صحي سليم للتغذية لا يعني أن نلتزم بمعايير دقيقة تجعلنا نحسب يوميا كمية السعرات الحرارية والمعذبات المختلفة التي تدخل أجسامنا مما يفقدنا وبالتالي جزءا من استمتاعنا بغذياناً وميلنا لأنواع معينة من الغذاء !

فالقاعدة الذهبية للتغذية السليمة هي ببساطة تحقيق التنوع والتوازن فيما تأكله بحيث تحصل على قدر كاف ومتوازن من الفيتامينات والمعادن وعنانصر الغذاء الثلاثة وهي البروتينات والكربوهيدرات (النشويات والسكريات) والدهون.

فكلا نواعت فى اختيار غذائك صرت على الطريق الصحيح للتغذية .

٦٩- كيف تختار غذائك ؟

ولكى تحقق ذلك ، يمكنك ببساطة أن تحرص يوما بعد الآخر على اختيار نوع من الغذاء من هذه المجموعات الغذائية الخمس :

- الخبز والخبوزات عموما والأرز والمكرونة .

- الفواكه .

- الخضراوات .

- الألبان ومنتجاتها كالزبادي والجبن .

- البروتينات النباتية مثل الحبوب (كالفاصوليا الناشفة واللوبيا والعدس والقرنفل) والبقول (مثل فول التميس) والبذور والمكسرات . والبروتينات الحيوانية (مثل الأسماك واللحوم والدجاج والبيض) .

(يمكن الجمع بين هذين النوعين من البروتينات بشكل متوازن أو الاكتفاء بتناول نوع منها يوما بعد يوم)

بالختيار غذائنا اليومى من هذه النوعيات المختلفة فإننا نحقق عنصر التنوع .

ولكى نحقق عنصر التوازن ، فهذا يعني ببساطة ألا نتناول كميات كبيرة من نوع محدد من الأغذية على حساب الآخر .. فلا يجوز مثلا أن نفرط فى تناول البروتينات على حساب الفواكه والخضراوات .

ولتحقيق هذا التوازن المقصود يجب أن تكون كمية السعرات الحرارية (الطاقة) المستخلصة من الغذاء موافقة لما نقوم به يوميا من جهد حتى نتجنب انخفاض أو زيادة الوزن .

وللحصول على قدر متوازن من السعرات الحرارية والمغذيات الضرورية فإن القاعدة الأساسية هي الحصول على كمية من السعرات الحرارية من العناصر الغذائية الثلاثة على النحو التالي :

- الكربوهيدرات ٥٥ - ٣٠ % أقل من الدهون

- البروتينات ٢٠ - ١٥ %

٦- كثير من الألياف :

يعتبر الاهتمام بتناول الألياف بوفرة أحد أسس التغذية السليمة ، فقد ثبت أن توافرها في الغذاء يقدم لنا فوائد عظيمة مثل الوقاية من الإمساك ، والسيطرة على مستوى الدهون (الكوليستيرول) بالدم ، كما تساعد أيضا على ضبط مستوى السكر بالدم . كما وجد أن فرصة الإصابة بسرطان القولون تقل بين الذين يداومون على توفير الألياف في غذائهم اليومي .

والألياف لا تعتبر عنصرا غذائيا بل إنها تخلو تماما من أية مغذيات مفيدة .. وهي تمثل مع الأجزاء التي تختلف عن الأغذية النباتية والتي لا تهضم ولا تمتلك وإنما تخرج مع البراز فتزيد من كتلة الفضلات .

وتوجد الألياف بوفرة في الفواكه والخضروات عموما وخاصية التفاح ، والكرنب ، والقطنبيط ، والخيار .. كما تعتبر الردة (النخالة) من أغنى مصادرها ، ولذا ننصح دائما بتناول الخبز والمخبوزات المصنوعة من الدقيق الكامل المحتفظ بالردة عن المصنوعة من الدقيق الأبيض .

٧- قليل من السكريات :

تحتوي الأغذية مثل الحلويات والجاتوهات والمربي على نسبة عالية من السعرات الحرارية بينما تفتقر للمغذيات الضرورية . ولذا تسمى السعرات الحرارية الناتجة عنها بالسعرات الحرارية الفارغة (Empty Calories) . وبؤدي الإفراط في تناول هذه النوعيات من الأغذية إلى السمنة وتسوس الأسنان .

كما يجب أن نلاحظ أيضا أن هناك أنواعا عديدة من الأغذية المجهزة المحفوظة أو المعلبة مثل بعض أنواع الحبوب ، والفواكه ، والخضروات تحتوى على كميات كبيرة من المواد السكرية حيث تستخدم كملة حافظة لها .

كما تعتبر المية الغازية والعصائر المحفوظة من المصادر الغنية بالسكريات، ولذا يجب الحد من تناولها.

ـ قليل من الدهون :

نحتاج إلى الدهون بقدر بسيط ، وهو غالبا يفوق كمية الدهون التي يتناولها
أغلب الناس ؛ وذلك للاستفادة بفوائد الدهون كعنصر غذائي . فالدهون تعد
مصدرا مركزا للحصول على الطاقة ، وهي ضرورية لامتصاص الجسم لبعض أنواع
الفيتامينات وهي (أ)، (د)، (هـ)، (ك) . كما أنه من الصعب أن
نستسيغ طعامنا بدون قدر من الدهون .

ولقد أصبح من المؤكد أن الإفراط في تناول الدهون الحيوانية (الدهون المشبعة) يلعب دوراً مهماً في الإصابة بالأزمات القلبية. كما يؤدى الإفراط في تناول الدهون بصفة علامة، سواء كانت حيوانية أو نباتية، إلى زيادة الوزن.. وتعد زيادة الوزن عملاً آخر يؤدى إلى الإصابة بالأزمات القلبية، وغير ذلك من المشاكل الصحية العديدة.

ولكي تساعد نفسك على الإقلال من تناول الدهون لمنع هذه الإرشادات التالية:

- اختر اللحوم الخفيفة قليلة الدسم كاللحم البتلوا ولحم الدجاج (بدون جلد) والأسمك.
 - قلل من تناول اللحوم المجهزة كاللانشون والهوت دوج.
 - ازّع أية دهون ظاهرة باللحم قبل إعداده للأكل.
 - قلل من تناول الأطعمة الحمراء في السمن أو الزيت .. فاجعل أغلب طعامك مسلوقة، أو مشوية.
 - اختر اللبن ومنتجاته من الأنواع قليلة الدسم.
 - لاحظ أن المشويات التي تضاف للأطعمة (مثل زبدة الفول السوداني أو المستارة) تحتوى على نسبة مرتفعة من الدهون ولذا يجب الحد من تناولها.

قليل من الملح :

إن أغلب الناس يتناولون كميات من ملح الطعام تفوق احتياج أجسامهم وقد وجد أن ذلك يمكن أن يصيب بعض الأشخاص بارتفاع ضغط الدم.

وبالإضافة لملح المائدة التي نضيفه لطعامنا فإن ملح الطعام يدخل أيضاً في العديد من الأغذية المجهزة المحفوظة . ولذا يجب ملاحظة نسبة الملح بهذه الأغذية عند الشراء .

لکی تقلل من تناول ملح الطعام ، اهتم بعمل الآتى :

- حاول أن تتقبل مذاق الطعام بقدر قليل من الملح .. وهذا أمر قابل للتحقيق.
- تجنب شراء الأغذية المحفوظة الغنية على كميات كبيرة من الملح مثل بعض أنواع الحسأة ، والكاتشب ، والبطاطس المحمّرة ، والزبنة ، والسبح.
- استخدام بدائل الملح ولكن دون إفراط .

نوع الفيتامين أو المعن	الاحتياج اليومي للذكور (فيما بين ١٩ - ٥٠ جم)	المجموع
فيتامين أ	٠,٧ جم	
ثيامين	١,٠ جم	
ريوفلافافين	١,٣ جم	
نيكدين	١,٧ جم	
حمض البانتوثئيك	لا توجد جرعة محددة - نلزد ما ينقص بالملخص	
فيتامين ب ٦	١,٤ جم	
فيتامين ب ١٢	١,٥ ميكروجرام	
بيوتين	١٠ - ٢٠٠ ميكروجرام	
حمض الفوليك	٢٠٠ ميكروجرام	
فيتامين ج	٤٠ جم	
فيتامين د	لا توجد جرعة محددة	
فيتامين هـ	٣ - ٤ جم	

واحد ميكروجرام لكل كيلوجرام من الوزن	فيتامين ك
٧٠٠ ججم	كالسيوم
١٤٠ ميكروجرام	بود
٨٧ ججم	حديد
٣٠٠ ججم	مازنسيوم
٣٥ جرام	بوتاسيوم
٧٥ ميكروجرام	سيلينيوم
٩٥ ججم	زنك
٥٠٠ ججم	فوسفور
١,٦ جرام	صوديوم
١,٢ ججم	خامس

متوسط احتياج الشبلة والرجل للسرعات الحرارية		
المرحلة العمرية	السرعات الحرارية / اليوم	أسلوب الحياة
١٨ - ٣٥ سنة	٢٠٠	غير نشيط
	٣٠٠	نشيط
	٣٥٠	نشيط جدا
٣٦ - ٧٠ سنة	٢٤٠٠	غير نشيط
	٢٩٠٠	نشيط
	٣٤٠٠	نشيط جدا
أكثر من ٧٠ سنة	٢٢٠٠	غير نشيط
	٢٥٠٠	نشيط

مقدار السعرات الحرارية المستهلكة بنشاطات مختلفة

نوع النشاط	مقدار السعرات الحرارية / ساعة
النوم	٦٥
الكتابة	١٠٠
المشي	٢٥٠
المشي السريع	٣٠٠
ركوب التrolley	٣٠٠
الجري البطيء	٤٠٠
الجري السريع	٦٥٠
السباحة	٥٠٠
الاس��واش	٦٥٠



أغذية تخدم صحتك الجنسية والإيجابية



٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨

٦- تفسير العلاقة بين الغذاء والجنس :

إن العلاقة بين نوعية الغذاء الذي نتناوله ومتى نمتنع بقدرة جنسية وإيجابية علاقة وطيدة.

فلا بد لكى نتمتع بقدرة جنسية جيدة، ودرجة خصوبة عالية ، أن نوفر لأجسمنا ما تحتاجه من مغذيات تدعم هذه الناحية ، ولكن تفهم ذلك بوضوح يجب أن نعرف أولاً كيف تتم العملية الجنسية؟ وكيف تتأثر بعملية التغذية؟

مراحل العملية الجنسية :

إن العملية الجنسية تحدث بشكل معقد أكثر مما قد تصور وذلك ابتداء من تولد الرغبة الجنسية مروراً بمرحلة الإثارة ثم الشبق، ثم القذف . وهذه المراحل الأربع يشارك في حدوثها والقيام بها علة أجهزة بالجسم تعمل بشكل متواافق تحت سيطرة المخ . وتسفر هذه المراحل المختلفة عن خروج كيمارولات مختلفة يلعب كل منها دوراً محدداً في العملية الجنسية ولذا يطلق على هذه الأحداث الكيميائية : كيمياء الجنس (sexual chemistry) .. وهو مصطلح حديث أصبح يفسر على أساسه الكثير من التغيرات الجنسية ، وكذلك مفهوم النشطة الجنسية .

فيشارك في حدوث العملية الجنسية الأجهزة التالية :

□ الجهاز العصبي التلقائي :

وهو الجهاز الذي يهيمن على العملية الجنسية بشقيه المختلفين وهما: الجهاز العصبي السمباثاوي والجهاز العصبي المخار سمباثاوي . فعند وجود الرغبة الجنسية يبدأ

هذا الفرعان في العمل بشكل متوافق .. ففي مرحلة الإثارة ترجع كفة الجهاز الجلسيثاثاوي ويصبح هو المسيطر النشط ، ويؤدي هذا النشاط إلى إفراز المخ لملة كيميائية هي : استيل كولين (acetylcholine) وهذه تؤدي إلى اتساع الأوعية التمومية والخفاض ضغط الدم (بدرجة بسيطة) . و يحدث تندد واتساع للأوعية التمومية للقضيب الذكري فإن الدم يتدفع خالله ويؤدي إلى تندد الجسم الاس芬جي ويحدث بذلك انتصاب . وعندما تصل الإثارة إلى درجة عالية تبدأ مرحلة الشبق أو النروة وعندها تزيد كفة الجهاز السمباثاوي ، ويصبح هو المسيطر النشط ، ويسبب هذا النشاط في إنتاج هرمون الأدرينالين من الغدة الكظرية ، وغير ذلك من الهرمونات . ويؤدي خروج هذه الكيمواليات إلى حدوث ضيق بالأوعية التمومية ، وزلة ضربات القلب ، وارتفاع ضغط الدم ، وبلي ذلك حدوث القذف (ejaculation) .

□ جهاز الغدد الصماء :

كما يتحكم في القيام بالعملية الجنسية بعض الهرمونات التي تفرزها غلاة تسمى بالغدد الصماء . وبدون خروج هذه الهرمونات بشكل متوازن يمكن أن تختل إحدى مراحل العملية الجنسية .. وهذه الهرمونات تشمل ما يلى :

- هرمون الذكورة (تستوستيرون) : وهو بمثابة الوقود اللازم لابتعاث واستمرار الشهوة الجنسية .
- هرمون الأنوثة (استروجين) : وهو يعد مزاج المرأة للتتوافق مع العملية الجنسية كما يؤدي إلى خروج ملحة مليئة للمهبل استعداداً للجماع .
- هرمون البروجستيرون : وهو هرمون آخر أنثوي فائدته تجهيز بطانة الرحم لاستقبال البويضة الملتحقة في حالة حدوث حل .

□ مجموعة من المواد يفرزها المخ:

وهذه عبارة عن مواد كيماوية معينة تلعب دوراً في حدوث العملية الجنسية ويطلق عليها: الموصلات العصبية .. ومن أهمها ما يلى :

- دوبامين : وهى ملأة ضرورية للحضور الجنسي والإحساس بالإثارة والنشوة .
- سيروتونين : وهى ملأة ضرورية للوصول إلى مرحلة الشبق .
- البيبيديات (peptides) : وهى مواد اكتشفت حديثاً وتلعب دوراً في حدوث تند للأوعية الدموية للقضيب ، ولذا فإنها ضرورية لحدوث انتصاب .

□ الجهاز العقلي:

ويقوم هذا الجهاز من خلال عمل عضلات البطن والخوض والظهر أو أي عضلات أخرى على حسب وضع الجسم في تنفيذ العملية الجنسية ، فيدون انقباضات عضلية لا يمكن حدوث العملية الجنسية .

□ دور الغذاء :

ويعتبر الغذاء السليم هو الوقود الذي "يشغل" كل الأجهزة السابقة ويخضر على تكوين الكيماويات والمواد المختلفة الضرورية للقيام بالعملية الجنسية .. فالعضلات ، والهرمونات ، والموصلات العصبية ، والبيبيديات ، التي تشارك في تنفيذ العملية الجنسية ما هي في الحقيقة إلا مواد تشارك الفيتامينات والمعدن والأحاسيس الأمينية في بنائها .

ولذا فإنه ليس غريباً أن تضعف الاستجابة الجنسية في حالات سوء أو نقص التغذية بحيث لا يتواافق للأجهزة الجنسية المغذيات الازمة .

والسؤال الآن : ما هي أهم هذه المغذيات (أو الأغذية) التي يجب توفيرها لتدعيم الأجهزة الجنسية والتمتع بالتالي بصحة جنسية جيدة ؟
هذا ما نعرفه في العرض التالي .



الأغذية المطلوبة للنكاح والخصوبة

٢٣

□ الزنك:

يعتبر معدن الزنك من أهم المغذيات الضرورية لإنتاج المرومون الذكري والذى يؤثر بدوره على الرغبة الجنسية وجود الاستجابة الكافية للنكاح . وليس ذلك فحسب ، فالزنك ضروري جدا لإنجاح عدد كاف من الحيوانات المنوية النشطة .. وفي حالة نقصه يقل عدد الحيوانات المنوية مما يقلل من خصوبة الرجل .
كما يتسبب نقص الزنك أيضا في زيادة القابلية للإصابة بالتهاب البروستاتا . ويزع نقصه خلال مرحلة البلوغ إلى تأخر نمو القضيب والخصيتين .

وتزيد فرصة حدوث نقص بالزنك في الحالات التالية :

- الإفراط في التدخين .
- احتساد المخمور .
- الإفراط في تناول الكافيين (الشاي والقهوة)
- حالات العدوى عموما .
- تناول بعض العقاقير الكيماوية .
- حالات الغسيل الكلوي .

بعض الأغذية الفنية بالزنك:

- اللحوم والدواجن .
- الأسماك (وخاصة السردين والأنشوجا) .
- المكسرات عموما (مثل البندق واللوز ...)

- زيت جنين القمح .
- الحيوانات البحرية (وخلصة الجندولى والخمار) .
- بعض الأعشاب (وخلصة المستارة (الخرط) ، والزنجبيل ، والشطة الحمراء ، والقرفة ، والزعتر) .

□ فيتامين د:

وهذا يعد أهم الفيتامينات الواجب توافرها بالجسم للتتمتع بدرجة جيدة من الخصوبة والقدرة الجنسية .. ونظراً لأهميته الكبيرة يطلق عليه البعض " فيتامين الخصوبة " .

ولكن ما هو الدور الذي يقوم به هذا الفيتامين ؟ .. ولماذا يحدث في حالة نقصه بالجسم؟ إليك هذه المعلومات المهمة عن فيتامين د :

- يعتبر فيتامين د واحداً من أهم مضادات الأكسدة (antioxidant) وتبعاً لهذا المفعول فإنه يحمي خلايا الجسم ، بما في ذلك الخلايا الجنسية والتتناسلية ، من الأضرار التي تتعرض لها بسبب ما يسمى بالشحوم الحرية (Free radicals) .. وهي عبارة عن مركبات كيميائية غير ثابتة تنتج من عمليات التمثيل الغذائي .
- ثبت من بعض الدراسات أن غيب هذا الفيتامين يؤدي إلى حدوث ضمور بخلايا المخصبين .
- يعتبر من المغذيات الضرورية للقيام بعملية تكوين الحيوانات المنوية .. ويعتبر نقصه في ضعف حيوانات الحيوانات المنوية .
- يؤثر فيتامين د على الفص الأمامي للغدة النخامية ، والذى يؤثر وسيطر على الأعضاء الجنسية ، والخصائص الجنسية .. ولكن يعتد نشاط هذا الفص فإنه يجب توافر فيتامين د بمستوى معتدل . وقد وجد أن نقص فيتامين د يؤدي إلى إفراط في نشاط هذه الغدة ، وقد يؤدي ذلك إلى إفراط في نمو الأعضاء التناسلية فتكون كبيرة بدرجة غير طبيعية سواء في الذكر أو الأنثى .

- وجد أن فيتامين ه بالمشاركة مع الغلة الدرقية يؤثر على الإحساس بالرغبة الجنسية.

بعض الأغذية الغنية بفيتامين د:

ينبغى ألا يقل المستوى الطبيعي لفيتامين ه بالدم عن ٥ مجم لكل ١٠٠ مجم من الدم. وفي حالة انخفاضه عن هذا المستوى تظهر علة حالة من البلادة أو الخمول تجاه الجنس الآخر وتضعف درجة الاستجابة الجنسية.

ويتوافر فيتامين "د" في الأغذية التالية:

- المخبز الأسر والمخبوزات عموماً من النقيق الكامل (أى المحتفظ بالنخالة).
- المكسرات (مثل البنق واللوز ...).
- البنور (وخلصة بنور دوار الشمس والقرع العسلى).
- فول الصويا.
- الزيوت النباتية (وخلصة زيت جنين القمح).

□ الفوسفور:

يقدم الفوسفور للجسم الفوائد التالية:

- يكون مع الأحماض الدهنية والجلسيرونول والنيروجين مركبات تسمى بالدهون الفوسفورية (phospholipids) ومن أهمها الليسيثين (Lecithin) الذي يلعب دوراً مهماً في تقوية الناحية الجنسية حيث يحفز ويزيد من إنتاج الهرمونات الجنسية، وقد أظهرت بعض الدراسات أن نقص الليسيثين يرتبط بحدوث الضعف الجنسي.
- يعمل الفوسفور مع الكالسيوم والماغنيسيوم على بناء العظام.
- يلعب دوراً مهماً في تكوين البروتينات النووية (nucleoproteins) المسئولة عن انقسام وتكرار الخلايا.

نحو الأغذية الغنية بالفوسفور:

تعتبر الأسماك والحيوانات البحرية (مثل الجمبري والاستاكوزا والجندوفلى) من أغنى مصادر الفوسفور .. ولعل هذه العلاقة هي السبب في شهرة المأكولات البحرية كغذاء جنسى !

كما يتواجد في الأغذية الأخرى التالية :

- خيرة الطعام.
- البنور (وخصائصه بنور دوار الشمس والقرع العسلى والسمسم).
- المكسرات (مثل البندق واللوز ...)
- التقل (مثل الفول السودانى والحمص ...)
- فول الصويا.
- الزيوت النباتية (وخصائصه زيت جنين القمح) .

نحو الأغذية الغنية بالليسيثين:

- الكبد.
- الخضراوات النيئة عموماً.
- صفار البيض.
- الشيكولاتة (منشط جنسى).

كميات الليسيثين في صورة مستحضرات طبية مثل الأقراص ، والبودرة ، والشراب ، والحبوب .

□ فيتامين ج :

يخدم فيتامين ج الناحية الجنسية من عدة نواح ، وهي :

- يزيد حيوية الجسم ويزيد من حيوية الحيوانات المنوية وقدرتها على الحركة ،

ولذا فإنه يدعم خصوصية الرجل .

- يعمل كمضاد للأكسلة وينعكس هذا التأثير الإيجابي على الناحية الجنسية .
- لاحظ الباحثون أن تناول جرعتين عالية من فيتامين ج يزيد من الرغبة الجنسية .



انتبه أيها المدخن !

وقد وجد أن الإفراط في التدخين يؤدي إلى نقص فيتامين ج بالجسم ، كما يؤدي كذلك إلى نقص الزنك .
فيما كنت من يدخنون ولا يقدرون على الإقلاع عن التدخين فيجب الاهتمام بتناول الأغذية الغنية بفيتامين ج .

□ الأغذية الغنية بفيتامين ج :

- المانج (البرقل ، الليمون ، الجريب فروت ، ...)
- الفلفل بأنواعه (الفلفل الأخضر ، واللفلف الأحمر)
- الخضروات الورقية (مثل الملفونس) .
- فاكهة الكيوي (من أغنى المصادر) .
- الجوانف .

□ فيتامين ب :

هناك أنواع عديدة من فيتامينات ب تؤثر على القدرة الجنسية والخصوصية مثل :

- فيتامين ب ۱
- حمض الفوليك
- فيتامين ب ۳

٦- علاج عقم الرجال بفيتامين (ب) ١٢ !!

أما أحدث اكتشاف عن فيتامينات ب وعلاقتها بالخصوصية فهو أن فيتامين ب ١٢ بالتحديد يحفز على إنتاج نوعية أفضل وأقوى من الحيوانات المنوية مما يرفع من درجة الخصوبة.

وقد ذكرت مجلة "لست" الطبية في مقال عن العقم والخصوصية أن بعض الأطباء نجحوا في علاج ضعف الخصوبة عند الرجل بإعطاء جرعته عالية من فيتامين ب ١٢ عن طريق الحقن ، حيث أدى ذلك النظام العلاجي إلى زيادة نضج الحيوانات المنوية .

كما يستخدم أيضاً فيتامين ب ١٢ كعلاج لعقم النساء الناتج عن الإصابة بالأنيميا الوبيلة الناتجة عن نقص هذا الفيتامين .

ويرى بعض الأطباء أنه في حالات نقص الخصوبة أو العقم يفضل إجراء قياس مستوى فيتامين ب ١٢ بالدم ، فإذا ثبت وجود نقص به وجب إعطاء هذا الفيتامين للتغلب على مشكلة العقم أو نقص الخصوبة .

٧- القسيب المثنى له علاج !!

ومن الطريق عن فيتامينات ب أن الباحثين قد وجدوا أن إعطاء نوع مميز من هذه الفيتامينات يسمى بلا - أمينوبنزويك (PAPA) يساعد في علاج مرض بيرونى .

في هذا المرض يصلب جزء مخلد من نسيج القسيب بالتليف مما يؤدي إلى حدوث الحننة بالقسيب أثنه الانتصاب حول هذا الجزء مما يسبب ألمًا ويعوق الإيلاج . وقد وجد أن هذا الحمض يزيد من تغذية النسيج التليف بالأكسجين مما يساعد على جعله أكثر مرونة ، وبالتالي يقل الحننة القسيب ، ويقل الألم .

لكن هذا التأثير يحتاج إلى إعطاء جرعته عالية تبلغ حوالي ١٢ جراماً يومياً ، و يجب أن يستمر لمدة طويلة قد تصل إلى ستين . ويستمر هذا العلاج تحت إشراف الطبيب .

٠ الأغذية الغنية بفيتامينات ب:

حتى الآن تم تحديد ٢٥ نوعاً من فيتامينات ب والتي تسمى في مجموعها بفيتامين ب المركب . وفيما يلى توضيح لأهم الأغذية التي تتوافق بها النوعيات السابقة من فيتامينات ب والتي ترتبط أكثر من غيرها بالصحة الجنسية :

- فيتامين ب١ :

- خبيرة الخبز .
- الحبوب الكلمة (مثل اللوبيا والفالصوليا الناشفة والعلس ...) .
- الخبز الأسر والمخبوزات من الدقيق الكلمل .
- النقل والمكسرات (مثل الفول السوداني ، والحمص ، واللوز ، وعين الجمل) .
- الكبدة والقلوب واللحوم .

- فيتامين ب٢ :

- خبيرة الخبز .
- الخبز الأسر والمخبوزات من الدقيق الأسر .
- الكبد .
- صفار البيض .
- عيش الغراب .

- فيتامين ب٣ :

- خبيرة الخبز .
- الخبز الأسر والدقيق الكلمل .
- الحبوب الكلمة (المحفوظة بقشرها) .
- الفول السوداني .
- اللحوم والدجاج والديوك الرومي (اللحوم الغلقة فقط) .

- حمض الفوليك :

- خميرة الخبز .
- الأوراق الخضراء للخضراوات (الإسفاناخ والخبيزة والملوخية) .
- الدقيق الكامل (وخلصة جنين القمح) .
- الكبد .
- الجبوب الكلملة .

- فيتامين ب : ١٢

يوجد في الأطعمة الحيوانية فقط مثل :

- الكلاوي - الكبد
- المخل (مثل أم الخلول والجندوفلي)
- التونة والسردين والسللون .
- البيض واللبن .
- الجبن (معظم الأنواع) .

- حمض بارا - أمينوبنزويك :

- الكرنب - الكبد (البقرى)
- البيض - اللبن (البقرى)
- الشوفان - عيش الغراب
- بندور دوار الشمس - السبانخ
- الدقيق الكامل (وخلصة جنين القمح) .

□ فيتامين (أ) :

هذا الفيتامين يخدم الصحة الجنسية من أكثر من ناحية، كما يلى:

- يحافظ على سلامة نسيج الخصية.
- يساعد على الوقاية من سرطان الخصية.
- يساعد على مقاومة سرطان البروستاتا.
- يساعد على زيلة أعداد الحيوانات المنوية.
- يعد ضرورياً لانتاج الهرمونات الجنسية.

- زيت كبد الحوت .. وسره الرهيب!

وياعتبر أن زيت كبد الحوت من أغنى الأغذية بفيتامين (أ) فهو يعتبر غذاء مفضلاً للمقبلين على الزواج حيث ينشط ويدعم الوظائف الجنسية.

- تناول البيض النبئ وادع لي!

ولنفس الغرض السابق أنصحك كذلك بتناول البيض النبئ أو "البرشت". يذكر دكتور "وليم روينسون" رئيس قسم الأمراض التناسلية بمستشفى "برونكس" بنبيوروك أن البيض النبئ غني جداً بفيتامين أ وأن تناوله نباتياً يقلل من خطره على صحة القلب والشرايين (الاحتواء البيض على نسبة مرتفعة من الكوليستيرول) وذلك لأن البيض النبئ يحتوى كذلك على نسبة عالية من الليسيثين التي تعمل كمضاد للكوليستيرول علاوة على تأثيرها المنشط للنافحة الجنسية.

كما يذكر دكتور "روينسون" أنه استطاع أن يحقق نجاحاً في علاج بعض حالات الضعف الجنسي بوصفات البيض النبئ لمرضى.

• احترس من السالمونيلا:

إن الفيروس الوحيد المتحمل من كثرة تناول البيض النبئ هو الإصابة ببيكروب السالمونيلا حيث إن طهي البيض يقتل أي عدوى محتملة به.

الأغذية الغنية بفيتامين A :

ساقه لزيت كبد الحوت والبيض النوى فإن فيتامين (A) يتواجد بجرعات عالية في الأغذية :

- الكبد (بأنواعه المختلفة) .
- الخضروات (مثل الجزر ، الفلفل الأحمر ، المقدونس ، الإسبانخ ، البصل الأخضر ، كولي ، ...) .
- الفاكهة (مثل المشمش والكتفالوب) .

المحتهر المفيدة

بناء على كل المعلومات السابقة عن الأغذية وعلاقتها بالصحة الجنسية
ننجاية تعتبر الأغذية التالية من أفضل الأغذية المدعمة لهذه الناحية :

- الأسماك والحيوانات البحرية .. وكذلك معلبات السردين والتونة والأنشوجا ...
- النقل والمكسرات .
- جنين القمح والمخبوزات من القمح الكامل (المحتفظ بقشره) .
- البنور .. مثل بنر القرع العسلى ودورار الشمس والسمسم .
- الشيكولاتة .
- خمرة الخبز .
- الخضروات الورقية عموماً .
- البيض النوى (أو البرشت) .
- الملح .
- زيت جنين القمح .
- زيت كبد الحوت .

الزواج يحتاج إلى قوة ولياقة بدنية ..
فاستعد من الآن !



كما يحتاج الاستعداد للزواج إلى تدعيم كفاءتك الصحية والاهتمام بتناول الأغذية المدمعة للخصوصية ، فإنه يحتاج منك كذلك إلى تدعيم لياقتك وكفاءتك البدنية .

فمن ناحية ، يلعب الجهاز العضلى دورا مهما فى القيم بالعملية الجنسية ، وإذا لم تتوفر للعضلات اللياقية الكافية تعرضت للإجهاد والشد والتقلصات .

ومن ناحية أخرى ، فإن اكتساب اللياقة البدنية الكافية من خلال الانتظام على ممارسة الرياضة يخدم صحتك بوجه عام ، ويشعرك بالارتياح النفسي ، ويساعدك على مقاومة التوتر ، و يجعلك أكثر توافقاً مع متطلبات الحياة اليومية التي تحتاج إلى مجهود عضلي ، كرفع أحل ثقيلة أو الاضطرار للعدو لغرض ما ، أو صعود الدرج لمسافة مرتفعة .

فممارسة الرياضة شيء ضروري جداً لكـل منـا.

- تقوية العضلات واكتساب اللياقة والرشاقة
 - المساعدة على الاسترخاء.
 - المساعدة على النوم بشكل أفضل.
 - تنشيط النهن وزبلة القدرة على التركيز.
 - اكتساب الحيوية والثقة بالنفس.

- مساعدة الهضم وتحسين الشهية للطعام .
 - تلixin المفاصل وزينة القدرة الحركية .
 - مقاومة الاكتئاب وتحسين الحالة المزاجية .
 - مقاومة الإصابة بألم الظهر وأوجاع المفاصل .
 - تخفيف بعض الأمراض كمرض السكر ، وارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع الكوليستيرول .
 - توفير الوقاية من الإصابة بتصلب الشرايين والذمة الصدرية .
 - تقليل فرصة الإصابة بالأزمات القلبية .

٦- اكتساب اللياقة شيء وتحقيق بطولات رياضية شيء آخر :

إن ما نقصده في هذا الموضوع هو ممارسة الرياضة بغرض اكتساب اللياقة البدنية العلمية ، فهذا يختلف عن ممارسة الرياضة بغرض إحراز بطولات رياضية . ففي هذه الحالة الثانية ، أنت تحتاج للتدريب المتواصل لعدة ساعات ، وربما للتمرين على أجهزة رياضية خاصة ، والخضوع لنظام غذائي وأسلوب معيشى معين . أما ممارسة الرياضة بغرض اكتساب اللياقة فلا يتطلب منك أكثر من قضاء بعض الوقت بمعدل ثلاث مرات أسبوعيا في ممارسة تمرينات رياضية خفيفة (كالايروبيك) ومارسة رياضية للشيء أو رياضة العدو ، أو نوع من الرياضات يتفق مع رغبتك وقدرتك الصحية .

الاحتياطات العامة:

وأيا كان نوع الرياضة التي تنوى ممارستها ، فإنه من الضروري أن تكون موافقة لعمرك ولقدرتك الجسمانية ، وخلصت إذا كان لديك أي متاعب بالقلب أو الأوعية الدموية (نقصور الشريان التاجي) ، أو كنت مصابا بالسكر أو بارتفاع ضغط الدم . وعموما يمكن مناقشة هذا الأمر مع طبيبك الخاص . كما أنه من الضروري ألا تبذل جهدا فوق قوتك احتمالك أنه ممارسة أي رياضة ، فيجب أن توقف في الحال متى شعرت بضعف المقدرة على استكمال المزيد .

ومن الضروري كذلك أن تختار نوعاً من الرياضة تشعر باللوعة في ممارسته، بحيث لا يكون الغرض من الرياضة هو الحفاظ على الصحة فحسب وإنما الاستمتاع كذلك بالرياضة وقضاء وقت ممتع للنفس.



كما أنه من الضروري أن تخذل من ممارسة أي رياضة شاقة في الحالات التالية ويفضل استشارة الطبيب:

- إذا كنت تجاوزت سن ٣٥ سنة، ولم تمارس أي نشاط رياضي لعدة سنوات مضت.
- إذا كنت فوق سن ٦٠ سنة.
- إذا كنت تعاني من بدانة مفرطة.
- إذا كنت تدخن بشراهة.
- في حالة حدوث وفاة لأحد من أفراد أسرتك قبل سن ٤٠ سنة بمرض القلب.
- في حالة وجود مشكلة صحية معينة تفضي للعلاج مثل مرض القلب، أو السكر، أو مشاكل العمود الفقري.

في هذه الحالات تساعدك استشارة الطبيب في اختيار نوع النشاط الرياضي الذي يتوافق مع حالتك الصحية وفي معرفة الاحتياطات المهمة التي يجب أن تأخذ بها لتجنب أي مضاعفات صحية.

بعض تمارينات الإحماء :


وأيا كان نوع الرياضة التي تعتزم ممارستها، فإنه يجب أن تهيئ جسمك بجهود هذه الرياضة بدءاً بتمرينات الإحماء (التسخين) للوقاية من حدوث تقلصات بالعضلات، ولتحفيز القلب تدريجياً على ضخ كمية زائدة من الدم لتلبية حاجة الجسم أثناء التمرين.

وإليك هذه النماذج لتمارين الإحماء:
ابداً بالجري البطيء أثناء الوقوف لتنشيط الدورة الدموية. ثم قم بعد ذلك بتأليلين
عضلات جسمك من أعلى لأسفل.

٥- تمارين العنق:


تساعد التمارين التالية على تأليلين عضلات العنق:

١- قم بقيادة العنق تدريجياً وببطء تجاه الجانب الأيسر (شكل ١) .. ثم استمر في إدارته للوراء واحتفظ بهذا الوضع لبضع ثوان (شكل ٢) .. ثم استكمل حركة الإدارة للجانب الأيمن واحتفظ بهذا الوضع لبضع ثوان (شكل ٣) .. ثم أجعل فقتك يتخلل لأسفل تدريجياً تجاه منتصف الصدر مع رفع الرأس في الأتجاه نفسه ببطء واحتفظ بهذا الوضع لبضع ثوان (شكل ٤) ثم عد للوضع البدائي .
كرر التمارين بعد مرتين .




٦- تمارين النراugin :

اخذ وضع الوقوف مع جعل القدمين متباعدتين بمسافة ٤٥ سم تقريبا .
قم بإدارة النراugin في الهواء على الجانبين بحركة تدريجية بطئه مع مراعاة القيام
بالشهيق أثناء حركة الرفع والقيام بالزفير أثناء حركة الخفض (شكل ١) .



٧- تمارين الجذع :


اخذ وضع الوقوف مع جعل
القدمين متباعدتين بمسافة ٤٥
سم تقريباً ومد النراugin على
الجانبين (شكل ١) .



استرخ .. ثم خذ شهيقا
عميقا ، ثم قم بالاحماء للأمام
مع القيام بالزفير بحيث يتسلل
النراuel والرأس والجذع
لأسفل لأقصى مسافة عكنة
(شكل ٢) .

ثم قم بفرد الجسم لأعلى مرة أخرى مع القيام بالشهيق وذلك بحركة تدريجية بطيئة حتى تتخذ الوضع الابتدائي نفسه . كرر التمرين بعد ١٠ مرات ثم زده تدريجيا خلال أسبوع إلى ٢٠ مرة .

٦- تمارين المضر :




اخذ وضع الوقوف مع جعل القائمين متباينتين بمسافة ٤٥ سم تقريباً وضم الذراعين على الجانبين (شكل ١) .

خذ شهيقا عميقا ثم مل بجسمك تجاه الجانب الأيسر بحركة تدريجية بطيئة وبحيث تسقط الذراع اليسرى لأقصى مسافة ممكنة مع الاحفاظ بالركبتين

مفرودتين واحفظ بهذا الوضع لمدة ثلاثة ثوان (شكل ٢) . ثم عد للوضع الابتدائي مع القيام بالزفير .. ثم كرر التمرين بالليل تجاه الجانب الأيسر .

٧- تمارين الساقين :



اخذ وضع الوقوف مع جعل القائمين مضمotosين ومد الذراع على الجانبين (شكل ١) .

خذ شهيقا عميقا مع القيام برفع الركبة اليسرى لأعلى والإمساك بالسلق المرفوعة من منطقة القصبة (شكل ٢) وذلك مع الاحفاظ بالظهر مفرودا .. احتفظ بهذا الوضع لمدة ثلاثة ثوان .

ثم قم بالزفير وعد للوضع الابتدائي ،

كرر التمرين للركبة اليمنى .

كرر التمرين لعدد ١٠ مرات لكل ساق ثم زده تدريجياً إلى عدد ٢٠ مرة خلال أسبوع .

□ **كيف تنمو لياقتكم البدنية؟**

نحو مفهوم اللياقة البدنية :

إن اللياقة البدنية (fitness) تعنى بفهمها البسيط اكتساب القدرة على التوافق مع الجهد العضلي الذى نتعرض له من خلال حياتنا اليومية (مثل رفع أحمال ، أو صعود الدرج ، ...) دون أن نشعر بتعب شديد ، أو نتعرض لشد عضلى ، أو نعاني من " كرشة " النفس .

ولاكتساب اللياقة البدنية من خلال التمرينات الرياضية عنصر ثلاثة يجب تقويتها وهى :

- القوة (Strenght) .

- المرونة (flexibility) .

- التحمل (endurance) .

وهذه العناصر الثلاثة يعمل المدربون في الملاعب على تقويتها في اللاعبين من خلال جموعات معينة من التمرينات التي تتدرج تدريجياً في عدد مرات القيام بها ، وفي مهارة أدائها . وإليك بعض النماذج لهذه التمرينات .

• تمارين القوة :

تعنى القوة : المقدرة على استخدام القوة العضلية (muscle force) لحمل ، أو رفع ، أو سحب حمل ثقيل .

إن لجسمنا تحتوى على أكثر من ٦٠٠ عضلة تهيئها لأداء حركات مختلفة ، وكلما

درينا هذه العضلات من خلال استخدام القوة العضلية زادت وبالتالي قدرتنا على القيام بالأنشطة التي تتطلب جهوداً عضلية.

• نموذج :


التدريب بالدبلز والسوستة :

يستخدمن في هذا التدريب أثقل صغيرة تزداد أوزانها تدريجياً لتقوية مجموعات مختلفة من عضلات النرايين. ويجرى كل تمرين بمعدل ثلاث مرات في البداية ويزداد عند المرات التدريجياً.

رفع أوزان ثقيلة :

كما يعتبر التدريب على رفع الأثقل من أفضل التدريبات لزيادة حجم العضلات (Muscle bulk) حيث يؤدي ذلك إلى زيادة حجم الأنسجة الليفية المكونة للعضلات.

• تمارين المرونة :



أما المرونة فتعنى القدرة على فرد، أو ثنى، أو لوى عضلات الجسم فى نطاق حركى واسع وتعتمد المرونة على مدى سهولة حركة المفاصل وليونة العضلات والأوتار. أما نقص المرونة فإنه يعرض للإصابة بالشد العضلى أو التقلصات عندما نضطر للقيام بحركات مفاجئة أو عنيفة.

وتفيد تمرينات الليونة بصفة

علمة في مقاومة حلوث شد عضلى أثناء التدريب، وتحافظ على الوضع الصحيح للقلمة، وتجعل الحركات المختلفة أكثر ليونة وسهولة.

• تمارين التحمل:

أما التحمل فإنه يعني القدرة على مواصلة التدريب لأطول فترة ممكنة دون توقف أو راحة، وتعتمد القدرة الجيدة على التحمل على كفالة القلب، والرئتين، والمفاصل، ونقص التحمل يعرض اللاعب للتعب السريع، وعدم القدرة على التوازن المركب أثناء التمرين.

ولزيادة القدرة على التحمل يمكن المواظبة على ممارسة أي نوع من الرياضات المواتية عموماً مثل العدو، أو السباحة، أو ركوب الدراجات مع زيادة فترات التدريب تدريجياً. فخلال كل تدريب يعمل القلب والرئتان معاً بقصصى جهد يمكن توفير الأكسجين الكافى للعضلات مما يمكن الخلايا العضلية من الاستمرار فى التدريب لأطول فترة ممكنة.





كيف نحافظ على خصو切ك وتنبذ من فرض الإنجاب؟



- انتبهوا يا سادة : خصوبة الرجال في خطر!
- أسباب نقص الخصوبة .
- اختبار القدرة على الإنجاب .
- ٦ نصائح لتدعيم القدرة الجنسية وزيادة فرص الإنجاب .



انتبهوا يا سادة

خصوصية الرجال في خطر !!

٦٧- رجل اليوم أقل خصوبة من رجل الأمس!

على مدى خمسين سنة مضت الحفاظت درجة المخصوصية والقدرة على الإنجاب بين الرجل على مستوى العالم .. هذا ما تؤكده الدراسات والإحصائيات . وأبرز نواحي ضعف المخصوصية التي لاحظها الباحثون هي :

- انخفاض أعداد الحيوانات المنوية .
 - شيوخ مشكلة نقص حركة وحيوية الحيوانات المنوية .
 - زبلة أعداد الحيوانات المنوية المشوهة ... ولكن ثري ما هو السبب ؟

٥- فش عن التلوث البيئي:

إن أهم سبب يراه الباحثون وراء حدوث هذه المشكلة هو التلوث البيئي الذي صدر سمة أساسية من سمات هذا العصر . وهذا التلوث يعني كل أنواع ومصادر السموم والتغليطات الضارة والكيماويات والإشعاعات التي تتعرض لها والتي تؤثر تأثيراً سلبياً على عملية تكوين الجينات المنوية في الخصبة .

احترس من الدجاج !

كما تشمل صور هنا التلوث على تلوث الغذاء وهناك دراسة أجراها باحثون مصريون كشفت عن احتواء جلد وعمن الدجاج الأبيض على نسبة من الهرمونات (هرمون الاستروجين) يمكنها أن تؤثر بالسلب على درجة المخصوصية، وهذه الهرمونات جلبت من خلال حبوب منع الحمل التي تقدم في بعض المزارع بغض النظر عن الدجاج.

٥٧ أسباب نقص الخصوبة :

وبالإضافة إلى عامل التلوث البيئي فإن هناك عوامل وأسباباً أخرى تكمن وراء انخفاض درجة الخصوبة .. وهذه مثل :

• وجود خلل في عملية إنتاج الحيوانات المنوية :

وهذا الخلل قد يرجع إلى :

- وجود عيب تكويبي أو خلقي أو وراثي يمنع تكوين حيوانات منوية سليمة .
- وجود اضطراب هرموني .
- عدم نزول الخصيتيين إلى كيس الصفن .
- التعرض للإشعاع بدرجات كبيرة ومتكررة .
- حدوث عدوى تؤثر على عملية إنتاج الحيوانات المنوية .. مثل التهاب الغدة النكفية .
- وجود خلل ناتج عن تعرض الخصبة لإصابة .

• انخفاض كفاءة الحيوانات المنوية على تنقح البويضة :

وهذا يعني إما انخفاض أعدادها أو حيويتها ، أو لزيادة نسبة الحيوانات المنوية المشوهه ، وهذا يرجع لأسباب مكتسبة عديدة من أهمها :

- الإفراط في التدخين .
- تناول العقاقير المخدرة .
- تناول عقاقير تؤثر على حيوية الحيوانات المنوية .

• وجود انسدادات تعيق خروج الحيوانات المنوية :

وفي هذه الحالة قد لا تظهر حيوانات منوية في عينة اختبار السائل المنوى . وهذا الانسداد قد يرجع لوجود عيب خلقي ، أو لوجود عيب مكتسب كما في حالة انسداد الوعاء الناقل للمنى بسبب مرض السيلان المزمن .

• وجود أجسام مضادة للحيوانات المنوية :

وهذه الأجسام المضادة قد يكون مصدرها جسم الزوج نفسه لوجود خلل بالجهاز المناعي . أو يكون مصدرها جسم الزوجة .. وفي الحالتين يؤدي ذلك إلى شلل حركة الحيوانات المنوية وربما قتلها .

• عدم حدوث قذف :

وهذا يرجع لسبب يؤدي إلى ضعف جنسي يتمثل في عدم القدرة على تحقيق انتصاب قوي مستمر وبالتالي عدم القدرة على القذف . ولذلك أسباب مختلفة مثل وجود إصابة بالأعصاب المؤثرة على الانتصاب كما في حالة إصابات المخوض أو بسبب جراحات البروستاتا .



اختبار القدرة على الإنجاب



٢٣٢

كيف تعرف درجة خصوتك (عالية أم منخفضة) !

أو كيف تعرف سبب تأخر حدوث إنجاب ؟

لاختبار درجة خصوبة الرجل (الزوج) أو للكشف عن سبب تأخير الإنجاب يجري اختبار للسائل المنوي (semen analysis).

وللحصول على عينة جيدة للاختبار، يجب أن يتمتع الرجل عن القلف قبل إجراء الاختبار لمدة ثلاثة أيام على الأقل.

يسلم الرجل (الزوج) من المعمل وعله بلاستيكيا صغيرا معدقا لحفظ العينة، ويجب أن يسلم العينة للمعمل خلال ساعة من حصوله عليها.. ويفضل أن تؤخذ العينة في المعمل.

ويتم الحصول على العينة إما " بالاستمناء باليد " أو بجماع الزوجة مع القلف خارجا.

يتم فحص العينة في المعمل بليكروскоп لحساب عدد الحيوانات المنوية، وتقدير درجة حيويتها، وتقدير مدى قدرتها على الحركة، وفحص نسبة الحيوانات المنوية المشوهة بها.

ولكي يكون الزوج قادرا على الإنجاب فإنه يجب أن يتمتع بعدد من الحيوانات المنوية السليمة لا يقل عن ٢٠ مليونا كحد أدنى، ويجب أن تتمتع هذه الحيوانات المنوية بدرجة جيدة من الحركة والحيوية حتى تستطيع التحرك نحو البويضة والقيام بتلقيحها.

اختبارات أخرى :

وفي حالة وجود مشكلة بتاتج فحص عينة السائل المنوي مثل وجود المخاضن شلبي بعد الحيوانات ، أو ضعف حركتها ، أو عدم وجود حيوانات منوية نهائيا ، يُعرض الزوج على طبيب متخصص في الخصوبة (طبيب أمراض جلدية وتناسلية أو طبيب مسالك بولية) لإجراء مزيد من الفحوص للكشف عن سبب هذه المشكلة .. وهذه الفحوص مثل :

- فحص الخصيَّتين وكيس الصفن يدوياً للكشف عن وجود دوالي بالخصية ..
حيث إن وجود دوالي الخصية من المشاكل الشائعة التي تسبب المخاضن عند وحشية
الحيوانات المنوية .

- فحص الخصيَّتين بالأشعة .. وذلك للكشف عن بعض العيوب مثل وجود
انسداد بالوعة الناقل .

-أخذ عينة من الخصية وفحصها بجهراً .

ـ اختبار ما بعد الجماع (post-coital test) :

ومن الفحوصات المهمة والشائعة التي تجري لاختبار درجة الخصوبة ومدى قدرة الزوجين على الإنجاب اختبار يجري بعد جماع الزوجة ، ولذا يسمى هنا الاختبار
اختبار ما بعد الجماع (post - coital test) .

يكشف هذا الاختبار عن مدى قدرة الحيوانات المنوية على اختراق مخلط الرحم
للوصول للبويضة وتلقيحها . فمن المعروف أن الحيوان المنوى يمر خلال مهبل الزوجة
إلى عنق الرحم وينفذ خلال المخلط الذي يفرزه عنق الرحم للوصول إلى البويضة
المتطرفة للتلقيح في قناة فالوب . وفي حالة عدم قدرة الحيوانات المنوية على المرور
خلال هذا المخلط لا يحدث وبالتالي تلقيح للبويضة .

ويجري هذا الاختبار على النحو التالي :

يتم الجماع بين الزوجين خلال اليوم السابق لميعد التبويض حيث يكون المخلط

رقينا نسبياً.. ثم تُحضر الزوجة لعيادة الطبية (طبية أمراض النساء) لأنخذ عينة من المخاط بعد حوالي ٦ - ٨ ساعات يُفحص هذا المخاط بجهرياً لاختبار درجة حيوية وحركة الحيوانات المنوية خالله.

٤٦ علاج حالات ضعف الخصوبة :

تعمل مشكلة ضعف الخصوبة بعلاج السبب المؤدي لها.

فعلى سبيل المثل ، في حالة وجود دوالي بالخصبة يكون العلاج جراحياً لتصحيح هذه المشكلة . ويؤدي ذلك إلى حدوث تحسن كبير بعد وحiovية الحيوانات المنوية بعد حوالي ثلاثة شهور منذ إجراء الجراحة .. وهى المدة التي تتكون خلالها الحيوانات المنوية .

وفي حالة الكشف عن أجسام مضلة يفرزها جسم الزوج ضد الحيوانات المنوية، يُعالج الزوج بالكورتيزونات حيث تقلل من نشاط إنتاج الأجسام المضلة مما يزيد وبالتالي من درجة الخصوبة .

وفي حالة وجود خلل هرموني كنقص هرمون الذكورة يتم تصحيحه بالعلاج الهرموني التعويضي .

وفي حالة وجود انسداد ما يعيق نزول الحيوانات المنوية من الخصبة أثناء القذف يُعالج جراحياً.

وهكذا ..

٦ نصائح لتدعم القدرة الجنسية وزيادة فرص الإنجاب :

البقاء على الزواج يتطلب من الطرفين زيادة الاهتمام ببعض الجوانب الصحية للتمتع بأسلوب معيشى أكثر صحة وحيوية خلال الأشهر أو السنوات القليلة المتبقية على بده الزواج ، وذلك بفرض التهيز لإقامة حياة جنسية موفقة تؤدى إلى سرعة تحقيق حلمهما في الإنجاب وتقليل فرص حدوث تشوهات أو عيوب بولودهما . وبالنسبة للرجل (الزوج) فإن هناك بعض الإرشادات الصحية المهمة التي يجب

الأخذ بها خلال الفترة السابقة للزواج بغرض زيادة فرص الإنجاب من خلال تحسين نوعية الحيوانات المنوية مما يرفع من درجة الخصوبة .

و هذا يتطلب الاهتمام بالمواضيع التالية :

• التوقف عن التدخين :

يعتبر التوقف عن التدخين من أهم أوجه الاستعداد للزواج وتكوين أسرة سليمة معافاة !

وذلك لأن التدخين يؤدي إلى إنتاج عدد قليل من الحيوانات المنوية ضعيفة الحركة والحيوية علاوة على زيادة نسبة الحيوانات المشوهة غير الطبيعية . وتبعاً لذلك فإن التدخين يؤدي إلى ضعف خصوبة الرجل وتضاؤل فرص الإنجاب . وبعد مرور فترة ثلاثة شهور - هي مدة تكوين الحيوانات المنوية - منذ الإقلاع عن التدخين تعود الحيوانات المنوية تدريجياً حالتها الطبيعية وتزيد وبالتالي درجة الخصوبة .

أما إذا كانت الزوجة من " المدخنات " فإنها تتعرض لمشاكل بعملية الولادة وعلة ما تسم ولادتها قبل الأوان ، علاوة على أن التدخين أثناء الحمل يحرم الجنين من الأكسجين اللازم لنموه مما قد يؤدي وبالتالي إلى ولادة طفل ضعيف نقص الوزن .

واستمرار التدخين بعد الإنجاب يعرض الوليد لشائعاً متكررة بجهازه التنفسى ، وقد يصلب بمحاسبية صدرية (ربو شعبي) ، وتزيد قابليته للإصابة بنزلات البرد والتلهب الشعب الهوائية .

• التغذية السليمة المتوازنة :

إن نقص بعض الأنواع المعينة من الفيتامينات والمعدن يؤثر على عملية إنتاج الحيوانات المنوية وهذه مثل الزنك ، وفيتامين ب ١٢ ، وفيتامين هـ . وهذا يعكس وبالتالي أهمية الحرص على تناول غذاء صحي متوازن في عناصره الغذائية وغنى بالفيتامينات والمعدن المختلفة والتي تتواجد في الفواكه والخضروات الطازجة .

كما أن حرص العروس على الالتزام بالتغذية السليمة المتوازنة يوفر البيئة المناسبة

لنمو البنين بعد الزواج ويضمن حصوله على كلة المغذيات الضرورية للنمو .

• ممارسة الرياضة بشكل منتظم :

إن الانتظام على ممارسة الرياضة يضمن توفير اللياقة البدنية وزيادة حيوية الجسم ، وهذا يجعل الزوجين أكثر استعداداً لعملية الإنجاب ، ويعين الزوجة فيما بعد على تحمل مشقة الحمل بدرجة أكبر بالنسبة لغيرها من يفتقدن اللياقة البدنية الكافية .

• الامتناع عن المخدرات والمسكرات :

مثلاً تتأثر الحيوانات المنوية من أضرار التدخين فإن الضرر الواقع عليها يكون كبيراً أيضاً في حالة إقبال الرجل على تناول مواد مخدرة أو مسكرة بأنواعها المختلفة . حيث تؤدي هذه السموم إلى انتقاص عند الحيوانات المنوية ، وضعف حيوتها ، وزلة نسبة الحيوانات المنوية المشوهة .

• اجعل خصيتك بارتين !

قد تتعش من هذه النصيحة الغريبة . إن أي شيء يرفع درجة حرارة الخصية يؤثر على عملية إنتاج الحيوانات المنوية ويفعدها ، فإذا كنت تستعد للزواج فلمتح من الآن عن الاسترخاء في حمام ماء ساخن .. وارتداء ملابس داخلية ضيقة وخالية المصنوعة من ألياف صناعية فاستخدم بدلاً منها ملابس واسعة من القطن .. وإذا كنت بدنيا فحاول أن تخلص من وزنك الزائد ؛ لأن تضخم الفخذين يرفع من درجة حرارة الخصية .

• احترس من هذه الأخطار :

إن التعرض للإشعاعات أو لبعض الكيماويات يمكن أن يقلل من درجة الخصوبة حيث يؤدي ذلك إلى أضرار بعملية تكوين الحيوانات المنوية مما يتسبب في إنتاج حيوانات منوية ضعيفة تزيد بها نسبة التشوهات . فإذا كنت تتضرر للتعرض لهذه العوامل المضرة من خلال عملك فلا بد أن تلتزم بالاحتياطات الأمن والسلامة .

كما يجب كذلك الحذر من التعرض المتكرر للإشعاعات الكهرومغناطيسية والتي صارت تحيط بنا من جوانب عديدة.. فهناك دراسات تشير إلى خطورتها على خصوبة الرجل.. ومن مصلحة هذه الإشعاعات محطات الكهرباء، وأجهزة الميكروويف وأجهزة التليفون الخموي (لم يثبت بشكل قاطع حتى الآن تأثير أجهزة التليفون على خصوبة الرجل).

احتياطات خاصة ضرورية قبل الزواج والإنجاب :

• الوقاية من انتقال الأمراض الوراثية :

في حالة وجود أي أمراض وراثية ضمن عائلتك أو عائلة العروس لابد قبل إتمام الزواج من استشارة طبيب متخصص في الأمراض للكشف عن مدى احتمال انتقال هذه الأمراض للأبناء. وتزيد أهمية ذلك في حالة زواج الأقارب حيث تزيد فرصة انتقال المرض الوراثي للأبناء.

وهذه الأمراض مثل :

- حالة الطفل المنغولي.
- الأنيميا المنجلية.
- مرض الكوريا (Huntington's chorea).
- أنيميا البحر المتوسط.

• حامل فيروس الإيدز .. هل ينجذب ؟

في حالة حدوث عدوى بفيروس نقص المناعة المكتسب (HIV) فإن هذا الفيروس غالباً ما ينتقل للجنين من خلال الزوجة المصابة بالعدوى عن طريق الزوج. ونظراً لانتشار الإصابة بهذا الفيروس في دول الغرب بسبب الاحوال الأخلاقية فقد توصل العلماء في إيطاليا إلى تقنية حديثة تمكن من فصل الخلايا المصابة بهذا الفيروس المعدي من السائل المنوي للزوج ثم عمل تلقيح صناعي للزوجة بالسائل المنوي السليم.

وقد وجد أن هذه الطريقة التي بدأت تنتشر في أوروبا تقلل بدرجة كبيرة من فرصة انتقال العدوى بهذا الفيروس (HIV) للجنين لكنها لا تمنعها تماماً.



تفهم أسباب المشكلات الجنسية وطرق علاجها



- ضعف الرغبة الجنسية
- ضعف الانتصاب
- القذف المبكر
- القذف المتأخر
- سن اليأس عند الرجال
- العلاج التعويضي بهرمون الذكورة



مشكلات جنسية شائعة

٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣

يكاد كل رجل متزوج أن يعاني من نوع من الاضطرابات الجنسية بين حين وآخر مثل مشكلة القذف السريع أو مشكلة ضعف الانتصاب.

كما يكاد كل شاب مقلد على زواج أن يفكر في احتمال تعرضه لأحد هذه الاضطرابات الجنسية وبختصار مشكلة القذف السريع.

فماحقيقة هذه الاضطرابات الجنسية؟ .. وما أسباب حدوثها؟ .. وكيف يمكن السيطرة عليها؟

هذا ما سنعرفه من العرض التالي الذي يلقى الضوء على أكثر الاضطرابات الجنسية شيوعاً وطرق علاجها.

١- مشكلة الرغبة الجنسية

من الطبيعي أن يتعرض أغلب الرجل لفترات تنخفض خلالها رغبتهم الجنسية، فليس من المعقول أن تظل الرغبة الجنسية قوية نشطة طوال الوقت ورغم كل الظروف !

• البحث عن الأسباب :

وهناك أسباب عديدة لضعف الرغبة الجنسية، دعنا نوضح أكثر هذه الأسباب شيوعاً :

- الاكتئاب : إن الإحساس بالاكتئاب بسبب ما عانه ما يصبحه ضعف في الميل الجنسي ونقص بالطاقة الجنسية .

- التعب العلم : فالإحساس بالتعب والإجهاد كفيل بإضعاف الرغبة الجنسية .

- **بعض العقاقير** : ومن أبرزها العقاقير المخضضة لضغط الدم حيث يتسبب بعضها في إضعاف الرغبة الجنسية ، أو إضعاف الانتصاب أو كليهما .
 - **العمل من المعاشرة الجنسية** : وهذه المشكلة من المشاكل الشائعة والتي تكون كفيلة بإضعاف الرغبة الجنسية . ولكن لا شك أن هناك الكثير مما يمكن عمله لإعلة الدفع للعلاقة الجنسية بين الزوجين .. وذلك مثل :
 - لابد أن يتلقش الزوجان بصراحة وموضوعية وأن يوضح كل منهما للآخر ما يراه موافقاً لرغباته لتشييط العلاقة الجنسية بيتهما .
 - يجب قضله وقت كافٍ من الإثارة والمداعبات بين الزوجين قبل بدء الجماع الفعلى .
 - لابد من تغيير المكان والظروف التي يتم فيها الجماع بين وقت وأخر لكسر دائرة الملل . - **ضعف الرغبة بسبب نقص هرمون الذكورة** : هرمون الذكورة المعروف باسم "تسوستيرون" هو المسئول عن وجود الرغبة والميل الجنسي تجاه الطرف الآخر . وهو المسئول كذلك عن ظهور الصفات الجنسية الثانوية كظهور الشارب ، وشعر العانة إلى آخره .
والحقيقة أن ضعف الرغبة بسبب نقص هذا الهرمون أمر قليل المحدث وعلة ما يحدث ذلك بين العجائز يمحكم التقدم في السن .
ولا يفيد تقوية الرغبة الجنسية بإعطاء هذا الهرمون إلا في حالة نقص مستواه بالجسم .. وإذا لم يستخدم هذا الهرمون في عمله ويجر علت مقتنة فإنه يمكن أن يؤدى إلى أضرار جانبية قد تكون شديدة .
- ### **مشكلة ضعف الانتصاب**
- منذ عدة سنوات قليلة كان يعتقد أن أغلب أسباب الضعف الجنسي ، بمعنى ضعف الانتصاب ، ترتبط بالناحية النفسية ، فكان من الشائع أن يواجهه كثير من

الرجل من يعانون من ضعف جنسى يمثل هذه العبرة من أطبائهم : " إن المشكلة تكمن فى دماغك .. ولا يوجد سبب عضوى واضح ". أما الآن فقد تغير مفهوم الضعف الجنسى بعد ما اتضح أن المسببات العضوية تلعب دوراً كبيراً فى حدوث حالات الضعف الجنسى يفوق الدور الذى تلعبه العوامل النفسية . ومن ناحية أخرى أصبح تعبير الضعف الجنسى (Impotence) أقل استعمالاً بعد ما ظهر تعبير آخر لوصف حالات ضعف الانتصاب بزيادة من المخصوصية وهو مصطلح عيوب الانتصاب [erectile dysfunction = ED] . وقد توافق ظهور هذا المفهوم الجديد مع ظهور عقار " الفلاجرا " فى سنة ١٩٩٦ والتى جاء لأجل علاج الحالات التى تقع تحت هذا المصطلح .

ففى الوقت الحالى أصبح هناك مسببات عضوية تختل نسبة كبيرة فى حدوث حالات ضعف الانتصاب بالنسبة للعوامل النفسية مثل :

• ضعف كفاءة الشريانين :

- ففى حالة وجود قصور بالشريانين المغذية للحوض والقضيب الذكرى تنخفض بالتالى كمية الدم الوارضة للقضيب ، وهذا يؤثر على قوة الانتصاب التى تتطلب تدفق كمية كافية من الدم خلال أنسجة القضيب . وهذا القصور الشريانى قد يكون أحد المشاكل المصاحبة لمرض السكر ، أو مرض القلب [قصور الشريان التاجى] ، أو ارتفاع مستوى الكوليستيرول بالدم ، أو ارتفاع ضغط الدم . وبعد القصور الشريانى هو أكثر الأسباب العضوية شيوعاً لضعف الانتصاب .

- حدوث مشكلة تؤثر على الاستجابة العصبية للانتصاب .. أي تؤثر على الاتصال资料 الطبيعى بين القضيب الذكرى والجهاز العصبى المركزى .. وهذا يحدث كما فى حالة استئصال البروستاتا [بسبب إصابة الأعصاب المختصة بالانتصاب] ، أو إصابة الحوض أو العمود الفقرى الناتجة عن الحوادث ، وبعض الأمراض العصبية مثل مرض باركنسون .

- تناول عقاقير معينة تضعف الانتصاب ومن أكثرها شيوعاً العقاقير الخافضة لضغط الدم والعقاقير الم-tonic والمهدئة .

- الاكتئاب : إن نسبة كبيرة من حالات الاكتئاب ترجع لتغيرات عضوية كيميائية بالمخ ، ويعتبر الاكتئاب سبباً شائعاً لضعف الانتصاب .

• التدخين والدهون .. عنوان للودان للصحة الجنسية !

وبناء على ما سبق فإن التدخين والإفراط في تناول النهون المشبعة (الحيوانية) والذى يؤدى إلى ارتفاع مستوى الكوليستيرول يعذان من المسيلات المهمة والشائعة لضعف الانتصاب بسبب تأثيرهما السىء على الشرايين وبالتالي على تلفق الدم للقضيب .

• هل أنت بحاجة للفيلجرا ؟ !

وهناك وسائل مختلفة لعلاج حالات الضعف الجنسي (ضعف الانتصاب) مثل العلاج بالعقاقير ، والأجهزة التعويضية ، وأجهزة السحب . هذا مع ضرورة علاج السبب المؤدى للضعف الجنسي في حالة إمكانية ذلك .

ويعتبر عقلرا الفيلجرا (Viagra) واسمه العلمي (Sildenafil citrate) أفضل عقار حتى الآن لعلاج الحالات التي تتدرج تحت مصطلح ضعف الانتصاب [Erectile dysfunction = ED] فقد ثبتت التجارب الإكلينيكية حدوث تحسن واضح لكل ثلاثة رجال من بين أربعة رجال مصابين بضعف الانتصاب .

يعمل هذا العقار - بالختصار - على زيادة تلفق الدم للقضيب الذكرى مما يحفزه على الانتصاب بشكل قوى وملنة كافية تسمع بالاتصال الجنسي .

وفي عند بسيط من الحالات يتسبب تناول الفيلجرا في حدوث أضرار جانبية مثل الصداع ، والحرار وتوهج الوجه ، واضطراب الرؤية .

ومن أهم موانع استخدام الفيلجرا ما يسببه استخدامها مع العقاقير المحتوية على مادة النيتريت - وهى العقاقير التى تستخدم لتوسيع الشرايين التاجية - من أضرار . ويؤخذ عقار الفيلجرا قبل الجماع بمنطقة ساعة تقريباً .. ولا يفضل تناول أكثر من قرص واحد يومياً للوقاية من الأضرار الجانبية المحتملة .

مشكلة القذف السريع



المقصود بالقذف السريع أو المبكر [premature ejaculation] حدوث قذف مجرد حدوث إيلاج أو ربما قبل ذلك.

هذه المشكلة سببها الغالب هو القلق من الممارسة الجنسية ولذا فإنها تنشر بين الأزواج الجدد في شهر العسل .. بل إن مجرد التفكير في احتمال حدوث هذه المشكلة قد يجعلها تحدث بالفعل .

كما وجد أن بعض الرجال يتميزون بحساسية عصبية زائدة بقدمة القضيب مما يجعلهم أكثر استجابة لحدوث القذف عن غيرهم .

وعلاج هذه الحالة يكون بعلاج القلق ، ومحاولة بث الهدوء والطمأنينة والنفحة بالنفس ، وهذا ما يساعد على تتحقق الطبيب النفسي .

وهناك علاجات لتأخير القذف مثل : الكريات والبخاخات الموضعية التي تخدر الأعصاب الطرفية وتؤخر بالتالي من الاستجابة العصبية .

كما تساعد بعض أنواع العقاقير المضادة للأكتشاف على تأخير القذف كأحد الأضرار الجانبية لها .

وهناك تمارين تنصح به دائمًا للتغلب على هذه المشكلة ومحاولة التعلم مع وضع الإيلاج المثير لأطول فترة ممكنة .. وهذا التمارين يمكن ممارسته أثناء الجماع .

يعتمد التمارين على الإسلام للإثارة الجنسية لبعض ثوان أو دقائق وعندما يقترب القذف توقف الإثارة وبالتالي يتقطع حدوث القذف ثم تكرر الإثارة ثم توقف وهكذا عدة مرات ، ثم يسمح بحدوث القذف ، فمع تكرار هذا التمارين عدة مرات يمكن التعلم على تحمل الإثارة الجنسية لأطول فترة ممكنة .

مشكلة القذف المتأخر



٣٣٣٣٣٣

حدوث القذف هو انعكاس [reflex] يحدث بسبب الاستimulation المستمرة للقضيب المتصلب . ولكن ببساطة قد لا يحدث هذا الانعكاس عند بعض الأزواج على الرغم من استمرار الانتصاب والإثارة .. فما هو السبب ؟

إن أغلب الرجل يتعرضون لأوقات يجدون فيها صعوبة في الوصول إلى مرحلة الشبق والتي يعقبها حدوث القذف وذلك لأسباب بسيطة شائعة مثل حدوث قذف منذ وقت قريب ، أو بسبب الإجهاد ، أو بسبب تناول عقاقير معينة كالمهدئات . ولكن في الحقيقة أنه عندما تكون هذه المشكلة مستمرة أو متكررة فإن سببها الغالب يكون سبباً نفسياً عميقاً كالإحساس الداخلي بالذنب والتحفيز تجاه الممارسة الجنسية بسبب التنشئة الصارمة .. أو بسبب رفض الإنجذاب والأبوة أو غير ذلك .

ومشكلة تأخر أو غياب القذف من المشاكل الجنسية المزعجة ؛ لأنها تعرقل إتمام العملية الجنسية بصورتها الطبيعية وتضطر الطرفين لقضاء وقت أطول من اللازم لإنتهاء الجماع علة ما يشعر خلاله الطرفان بالضيق والمعانة .

وعلاج مشكلة القذف المتأخر يكون بعلاج السبب المؤدي للحالة وعلاوة ما يحتاج ذلك لاستشارة الطبيب النفسي لبحث وعلاج المشكلة النفسية التي قد ترتبط بتأخير القذف أو عدم حدوثه .

أما خبراء علم الجنس [sex therapists] فإنهم يقترحون هذه الطريقة العلاجية يستمر الزوج في ممارسة الجماع بطريقة عادية حتى تصل الزوجة إلى مرحلة الإشباع ثم يقوم بإخراج العضو واستكمال الإثارة باليد .. وعندما يكون على وشك الإنزال يعود مرة أخرى بجماع زوجته حتى يحدث القذف .

ومع تكرار ذلك علة ما يتعدى الزوج على حدوث القذف بصورة طبيعية وفي وقت مناسب .

سن اليأس عند الرجال



ـ ـ ـ ـ ـ

للحظ أن الرجل في منتصف العمر [خلال الأربعينيات أو بداية الخمسينيات]
كثيراً ما يتعرضون للشكوى من بعض المتابع المتفرقة مثل :

- الصداع - ضعف التركيز
 - نقص الثقة بالنفس - ضعف القدرة على اتخاذ القرارات
 - التعب السريع - تغير المزاج أو الاكتئاب ..
- بالإضافة لانخفاض الرغبة الجنسية وعدم القدرة على تحقيق انتصاف قوي مستمر .
- ونجد في الوقت نفسه أن النساء أيضاً خلال هذه الفترة العمرية يتعرضن لمتابع متفرقة بسبب بلوغ سن اليأس مثل :
- الصداع - العصبية الزائدة .
 - الإحساس بسخونة وتوهج في منطقة الوجه والعنق .
 - غزارة العرق .

فهل يعني ذلك أن الرجل خلال هذه الفترة يصابون كذلك بمتابع سن اليأس
على غرار ما يحدث للنساء ؟ !

إن المرأة تصيب بمتابع سن اليأس لأسباب هرمونية؛ حيث يتوقف إنتاج هرمون الاستروجين من البيضين ، وبالتالي ينخفض مستوى جسم المرأة بدرجة كبيرة تكون كفيلة بإحداث أغلب هذه المتابع .

٦٩ - هل هناك أسباب هرمونية تؤدي بالرجل لبلوغ سن اليأس؟

إن هناك مؤيدین ومعارضین لهذا الموضوع، فالرجل يتعرض بالفعل لاختفاض مستوى هرمون الذکورة [تستوستيرون] مع التقدم في السن لكن ذلك لا يحدث عادة إلا بعد بلوغ سن الستين وليس قبل ذلك. كما أن هذا الاختفاض يمكن بطينا تدريجياً. وبينما على ذلك فإن حدوث تغير هرموني يجسم الرجل يؤدى إلى ظهور هذه المتابعات بعد أمراً مسبيعاً.

ولكن في الحقيقة أن بعض الباحثين وجدوا أنه على الرغم من تمنع الرجل خلال هذه الفترة العمرية بمستوى طبيعي من هرمون التستوستيرون إلا أن هناك عملاً ما يجعل مفعول هذا الهرمون ضعيفاً أو غير مؤثر بدرجة كافية.

وفي الوقت نفسه لا يتفق بعض الباحثين مع فكرة حدوث تغير هرموني يؤدى بالرجل لمتابعة سن اليأس لكنهم يرون أن هذه المتابعة تكون نفسية بحتة من نتاج التغيرات الفسيولوجية والاجتماعية التي يمر بها الرجل خلال هذه الفترة.

وعموماً فإن الاعتقاد بوجود نقص بمستوى أو بفاعلية هرمون التستوستيرون هو الاعتقاد الأكثر قبولاً لتفسير ظاهرة سن اليأس عند الرجل.





العلاج التعويضي بهرمون الذكورة

٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣

أجريت عدّة تجارب حول علاج متاعب سن اليأس عند الرجل [Male menopause] بإعطاء هرمون الذكورة [Testosterone] ولوحظ أنه حدث تحسّن ملحوظ لأغلب الحالات التي يقل فيها مستوى هذا الهرمون.

من هذه التجارب، تجربة أجريت في إحدى عيادات لندن على عدد من الرجال بلغ ١٠٠٠ رجل من تراوحت أعمارهم ما بين ٤٠-٨٠ عاماً. وفي حوالي ٨٠٪ من تلك الحالات حدث تحسّن بدرجة جيد إلى جيد جداً حيث تحسّنت القدرة الجنسية، وأخفّضت الشكوى من الصداع والإجهاد.

وينتمي هرمون التستوستيرون في صورة مختلفة مثل الأقراص أو الكبسولات، لكنه يتميز في هذه الصورة بضعف الفاعلية بسبب إتلاف إنزيمات المعدة للة الهرمون .. أو في صورة حُقن .. أو في صورة لزقة توضع على الجلد [Testosterone Skin Patch]. ولكن ما يجب أن نؤكّد عليه أن العلاج بهذا الهرمون له مخاطر صحية قد تؤدي إلى وجود مؤيدين ومعارضين لتقديم هذا العلاج. ومن أكبر مخاطر هذا العلاج أنه يزيد من القابلية للإصابة بسرطان البروستاتا ولذا فإن الأطباء يحرصون قبل تقديم هذا الهرمون على إجراء اختبارات وفحوص كافية للكشف عن مدى القابلية للإصابة بسرطان البروستاتا أو لاستثنائه وجود سرطان بالفعل في مرحلة مبكرة حيث إن تقديم هرمون التستوستيرون في هذه الحالة سيحفز على سرعة نمو وانتشار هذا السرطان.

• العلاج الطبيعي لمتاعب سن اليأس :

إن الضغوط النفسية [Stress] تلعب دوراً مهماً في حدوث متاعب متصرف العمر التي نسميها أحياناً متاعب سن اليأس عند الرجل . ولذا يرى بعض الباحثين أنه لا يجب أن نلجأ لأى علاج هرموني قبل أن نحاول أن يجعل حياتنا أكثر إشراقاً وهدوئاً للتغلب على المتاعب التي تظهر خلال هذه الفترة العمرية .

وهذا يستدعي الاهتمام بهذه التواхи :

- اتخاذ خطوات إيجابية للتقليل من الضغوط النفسية في مجال العمل أو المنزل .
- اتباع برنامج رياضي منتظم لاكتساب اللياقة البدنية وتنشيط الدورة الدموية والترويح عن النفس .
- إعطاء اهتمام خاص للعلاقة الزوجية الجنسية لجعلها أكثر عاطفة وإمتاعاً ..
وعدم التأخر عن بحث أي مشكلات تعرّض هذه العلاقة بمعرفة الطبيب المختص .
- الانضمام لأنشطة جديدة تثير روح التحدى والحماس .
- الاهتمام بتناول غذاء صحي متوازن منخفض في نسبة الدهون وغني بالألياف والكربوهيدرات المعقدة .





جهاز التناسل ومشاكله




• وما خفي كان أعظم !

إن كثيراً من الشباب والرجل يعتقدون أن الجهاز التناسلي الذكري يتكون من مجرد الأجزاء الظاهرة لهم ، أي من القضيب وكيس الصفن ، بينما يجهلون باقي الأجزاء الأخرى الخفية التي يتكون منها الجهاز التناسلي ووظائفها المهمة .

• تركيب الجهاز التناسلي :

يتكون الجهاز التناسلي من الأجزاء التالية والتي يلعب كل منها دوراً معيناً في عملية الخصوبة والإعجاب .

- القضيب الذكري (Penis) :



يتكون القضيب الذكري من الداخل من ثلاثة حجرات أسطوانية الشكل تجري بطول القضيب ، وهي عبارة عن نسيج إسفنجي قابل للتمدد . يوجد منها اثنان من أعلى وواحدة أسفلهما . وتسمى الحجرتان

العلويتان الجسمين الكهفين (Corpora Cavernosa) .. وتسمى الحجرة السفلية الجسم الإسفنجي (Corpus Spongiosum) .

وفي غيب الإثارة الجنسية يكون القضيب في حالة ارتخاء، وتكون حجراته الثلاث منكمشة، وعندما تحدث إثارة جنسية ويستجيب المخ لها يبدأ انفاس الدم بزيارة إلى شبكة الأوعية المعاوية بالنسيج الإسفنجي مما يؤدي إلى تمدد الجسمين الكهفين وحدوث انتصاب للقضيب.

وفي أسفل الحجرة السفلية تجري قنة مجرى البول (urethra) وهي عبارة عن أنبوية عضلية تنقل البول من المثانة إلى الخارج، كما يمر بها السائل المنوى أثناء القذف.

• **الخصية (Testis) :**

ويوجد منها زوج، وهما عبارة عن غدتين تناسليتين يفرزان الهرمون الذكري المعروف باسم تستوستيرون ويقومان بإنتاج الحيوانات المنوية.

والخصيتان عند الرجل تناضلان المبيضين عند الأنثى حيث يقومان بإنتاج الهرمونات الأنثوية الجنسية وإنتاج الويضات التي تمثل وحدات التكاثل.

• **كيس الصفن (Scrotum) :**


وتتلies الخصيتان بارتفاعين مختلفين داخل جيب جلدي متعرج يقع خلف وأسفل القضيب وهو كيس الصفن (Scrotum) والحقيقة أن وجود الخصيتين داخل كيس الصفن خارج الجسم وليس داخله له أهمية خاصة. فقد وجد أن كفالة الخصيتين في العمل تتأثر بدرجة الحرارة، فالحرارة المرتفعة تقلل من كفالة عمل الخصيتين. ولذا فإن وجود الخصيتين محفوظتين داخل كيس الصفن خارج الجسم يجعلهما يحتفظان بدرجة حرارة منخفضة عن درجة حرارة الجسم بفضل دورة الهواء حول كيس الصفن والتي تقوم بتبريلهما، فعملة تقل درجة حرارة الخصية عن درجة حرارة الجسم بقدر 5 درجات مئوية. وهذا المخاض في درجة الحرارة يحفز الخصيتين على إنتاج الحيوانات المنوية وهرمون تستوستيرون.

• **القوات المصعدة للمنى (Seminiferous tubules) :**

وداخل كل خصية يوجد حوالي 1000 أنبوية دقيقة أشبه "بلكرونة الاسبلجيتى" ولو وضعت هذه الأنابيب على خط مستقيم واحدة تلو الأخرى لبلغ طولها حوالي

٥٠٠ متر ! هذه الأنابيب العجيبة هي التي تتكون داخلها الحيوانات المنوية في الخلايا المكونة لهذه الأنابيب . وتبداً هذه الأنابيب في تكوين الحيوانات المنوية ابتداء من سن البلوغ وتكون الحيوانات المنوية الناشئة لا تزال في حالة غير ناضجة (Immature) .

• البربخ (Epididymis) :




وتنتهي هذه الأنابيب الدقيقة لتكون جسماً أنبوبياً يسمى ملتفاً يسمى بالبربخ يقع خلف الخصية .

و داخل البربخ يتم تخزين الحيوانات المنوية

الناشئة لتتضاعف تدريجياً على مدى أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع تكون بعدها جاهزة للقذف خارج الجسم . ويبلغ عدد الحيوانات المنوية التي تصل لنهاية البربخ يومياً وتكون جاهزة للخروج حوالي ٥٠ مليون حيوان منوي .

• الحيوان المنوى :



والحيوان المنوى الناضج له شكل عزيز جداً .. فيتكون من رأس وجسم صغير وذيل طويل . ورأسه بيضاوي الشكل ، يحتوى على الملة الوراثية التى ينقلها الآب لابنه عندما يحدث الحمل . ويعتبر الحيوان المنوى بحركة أشبه

حركة السوط وهي التي تنفعه للأمام ليتخذ طريقه تجاه البوياضة عندما يقف داخل المهبل .

والحيوانات المنوية لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة ، وإنما ترى بالمجهر .. ويبلغ طول الحيوان المنوي مقدار ٥٠٠ ميليمتر .

• خلايا ليدج (Leydig cells) :

يرجع الفضل إلى هذه الخلايا المميزة في إنتاج الهرمون الذكري تستوستيرون . تقع خلايا ليدج (Leydig cells) مبعثرة بين خطوط الأنابيب المصنعة للمنى داخل كل خصية .

وعند البلوغ يزداد إنتاج هذه الخلايا للهرمون الذكري والتي يؤدي إلى اكتساب الصفات الجنسية الثانوية التي تميز الفتى عن الفتاة مثل ظهور الشارب وامتلاء العضلات إلى آخره .. كما يرجع الفضل إلى هذا الهرمون في حدوث الميل للجنس الآخر وتولد الرغبة الجنسية .

• الوعاء الناقل (Vas deference) :

قبل حدوث القنف ، تُنقل الحيوانات المنوية من البربخ لتمر خلال أنبوبة طويلة تسمى الوعاء الناقل (Vas deference) في اتجاه مدخل قنة مجرى البول .

• الحويصلات المنوية (Seminal Vesicles) :

وعندما يحدث القنف تقوم مجموعة من الحويصلات الندية تسمى بالحويصلات المنوية بإفراز حوالي ٦٠٪ من السائل المنوي داخل الوعاء ليختلط بالحيوانات المنوية وينتشر معها في اتجاه قنة مجرى البول للخارج .

• البروستاتا (The Prostate) :

أما غدة البروستاتا فهي غدة صغيرة في حجم حبة اللوز تقع عند قاعدة المثانة البولية وتحيط بقناة مجرى البول .

تشارك البروستاتا في إنتاج باقي الإفرازات التي تختلط بالحيوانات المنوية والسائل المنوي عند حدوث القذف . حيث تجتمع هذه الإفرازات التي تخرج من البروستاتا (السائل البروستاتي) عند بداية فترة مجرى البول قبل حدوث القذف بعده ثوان لتكون جاهزة للخروج مع الحيوانات المنوية والسائل المنوي .

• ما هو المني (النطفة) ؟

المني (Semen) هو عبارة عن " كوكتيل " يجمع بين إفرازات الحويصلات المنوية وإفرازات غدة البروستاتا والحيوانات المنوية . فقبيل حدوث القذف تختلط هذه الإفرازات بالحيوانات المنوية لتهيئ لها البيئة المناسبة لها بعد خروجها من الجسم حيث تسبح الحيوانات المنوية خلاها وتستمد منها ما تحتاجه من غذاء لبقائها حية لأطول فترة ممكنة .

ويبلغ مقدار المني في المتوسط الذي يخرج خلال القذف مقدار ملعقة صغيرة أو أقل قليلا .

ويتكون المني من نسبة كبيرة من الماء تبلغ حوالي ٩٠ % بالإضافة لأنواع عديدة من المغذيات مثل الزنك ، والبوتاسيوم ، والجلوكوز ، وفيتامين ج .. ويفضل هذه المغذيات تحفظ الحيوانات المنوية بعد القذف بحيويتها وقدرتها على النشاط والحركة .



مشاكل القضيب الذكري



٢٣٦

يعرض القضيب الذكري، كثي عضو من أعضاء الجسم، لمشاكل صحية وأمراض لكن فرصة حدوث هذه المتابع تكون كبيرة لاشك بسبب الاحرف الجنسى .

فبالإضافة للتأليل التناصية ، والهرس التناصي ، وأمراض الاتصال الجنسي الخرم (الزنا) ، وضعف الانتصاب بسببياته المختلفة ، يتعرض القضيب كذلك للإصابة بهذه المشاكل الصحية .

• **التهاب الحشفة (Balanitis)** : المقصود بذلك التهاب رأس القضيب أو التهاب الجلد الأمامي الزائد (Foreskin) في حالة عدم إجراء عملية الختان (الطهارة) .

يظهر رأس القضيب في هذه الحالة مائلا للاحمرار رطبا بعض الشيء ويكون مؤلما عند اللمس ومثيرا للحكمة .

يحدث هذا الالتهاب نتيجة تعرض الجلد بهذه المنطقة لعدوى سواء بكتيرية أو فطرية وبالتالي يكون العلاج إما بالمضادات الحيوية (بالنسبة للعدوى البكتيرية) أو بمضادات الفطريات (بالنسبة للعدوى الفطرية) و يحدث هذا الالتهاب نتيجة أسباب وعوامل مختلفة مثل :

- **إهمال النظافة** : حيث يؤدي تجمّع القذورات والأوساخ بهذه المنطقة بسبب إهمال الاستحمام والنظافة إلى إصابة الجلد بالعدوى وخاصة العدوى البكتيرية .

- **إهمال إجراء عملية الختان (الطهارة)** : إن إهمال إجراء عملية الختان (الطهارة) يتيح فرصة عظيمة لتجمع القذورات تحت الجلد الزائد بالقلمة وخاصة إذا كان هذا الجلد مشدوداً أكثر من اللازم (phimosis) مما لا يمكن بالتالي من إزاحته للوراء وتنظيف المنطقة أسفله .. وهذه المشكلة تظهر خاصة بين صغار السن حيث إن هذا الجلد الزائد يتراخى مع التقدم في السن وأحياناً يكون هناك ضرورة لإجراء عملية (الطهارة) ، بصرف النظر عن عمر المريض ، للتخلص من تكرار هذا الالتهاب .

- **الالتهاب الجنسي** : كما يمكن أن يحدث التهاب رأس القضيب بسبب الاتصال الجنسي في حالة وجود عدو مهبلية ، وخاصة العدو الفطيرية .

- **الحساسية والتهييج** : أحياناً يتعرض جلد رأس القضيب لمواد مثيرة للحساسية تصيبه بحالة من التهييج وهذا بدوره يزيد من فرصة حدوث العدوى .

وهذه المواد قد تكون :

- المواد الكيماوية المطهرة للملابس الداخلية . - العازل الذكري (الكبوت) .
- المواد القاتلة للحيوانات المنوية (Spermicide) والتي تستعملها الزوجة بغرض منع الحمل .
- عقاقير معينة تستعملها الزوجة موضعياً لعلاج مشكلة صحية ما .

• **الانتصاب العنيد (Priapism)** : يحدث الانتصاب بتندق الدم عبر الشرايين المغذية للقضيب ، ويحدث الارتفاع بإعلانه بارتفاع دموع هذا الدم عبر الأوردة .

ولكن أحياناً تطول مدة الانتصاب ، رغم انتهاء الجماع أو الإثارة الجنسية ، وعلة ما يكون ذلك مصحوباً بألم ، وحالة من عدم الارتخاء .. وهذا هو ما نصفه بالانتصاب العنيد (Priapism) أي : الانتصاب المستمر دون داع والذى لا يعقبه حدوث ارتخاء إلا بعد فترة طويلة مؤلمة .

أحياناً تحدث هذه المشكلة في حالات مرضية معينة مثل وجود انسداد في الدورة التمومية الوريديّة مما لا يسمح بالتالي برجوع الدم وارتخاء القصيب . ولكن في الحقيقة أن السبب الغالب لهذه المشكلة ناتج من سوء استخدام بعض العلاجات الحديثة لحالات ضعف الانتصاب .

فعلاً ما تحدث هذه المشكلة بسبب استعمال جرعة زائدة من العقاقير التي تُحقن موضعياً بالقصيب لإحداث الانتصاب .

كما يمكن أن تحدث حالة الانتصاب العيني مع استعمال جرعتين كبيرتين من عقار الفيلجراء .

وتعتبر مشكلة الانتصاب العيني من المشاكل الصحية الخطيرة التي تستدعي سرعة تقديم العلاج ، وذلك لأن استمرار انتصاب القصيب لفترة طويلة أكثر من ست ساعات يمكن أن يصيب أنسجته بتلف دائم ويؤدي إلى تكون جلطة دموية تؤدي إلى مضاعفات خطيرة بالأنسجة قد تسبب في غياب الانتصاب تماماً .

وتعلّم مشكلة " الانتصاب العيني " بطرق مختلفة مثل سحب كمية من الدم بسرقة معقمة مما يؤدي بالتالي إلى ارتخاء القصيب .

• القصيب المتشنج (مرض بيرونى) :

يتميز القصيب الطبيعي باستواء أنسجته حيث يكون لها نفس درجة السمك .. ولكن أحياناً تكون هناك منطقة محددة تميز بزبدة سمك الأنسجة الليفية بها بالنسبة لباقي الأجزاء ويمكن عادة تحديد هذه المنطقة بالنظر أو " جسها " باليد حيث تكون أثقله بالحبة الصلبة .

وتكون مشكلة هذه المنطقة الخلدة السميكة في أنها تؤثر على استقلالية القصيب أثناء الانتصاب ؛ لأنّه عندما ينتصب يتensi عند هذه المنطقة السميكة . وتبعاً لذلك يصير الانتصاب مؤلاً ويكون الانتصال الجنسي غير مريح بل غير ممكن أحياناً .

ولكن ما سبب حدوث هذه المشكلة ؟ لوحظ أن هذه المشكلة تحدث عادة بين الرجل فوق سن الأربعين ، ولم يعرف لها سبب محدد ، ولكن يعتقد أنها ناتجة من

تعرض القصيب في منطقة معينة لإصابة متكررة غير ملحوظة أثناء ملresse الجماع بعف فمع تكرار ذلك يحدث تضخم للأنسجة الليفية بهذه المنطقة الخدمة.

وفي الحالات الشديدة التي تميز بانتصاب مؤلم وصعوبة في الاتصال الجنسي يكون هناك ضرورة لإجراء جراحة للتغلب على هذه المشكلة . وعلاوة تتم هذه الجراحة بعمل غرز جراحية خاصة على الجانب المقابل بحيث تمنع القصيب من الاتساع أثناء الانتصاب .

• سرطان القصيب :

مثلاً يمكن أن يتعرض أي عضو بالجسم للإصابة بمرض السرطان في العضو الذكري كذلك يمكن أن يصاب بالسرطان .

وسرطان القصيب حالة نادرة لا تكاد تحدث إلا للذين لم تجر لهم عملية الطهارة حيث إن تجمع القلفورات تحت الجلد الزائد بمقملة القصيب يؤدي إلى تهيج متكرر وهذا يلعب دوراً في حدوث الإصابة السرطانية كما لوحظ أيضاً أن الإفراط في التدخين وأهمل النظافة يساعدان على حدوث هذا المرض .

ويظهر سرطان القصيب في صورة قرحة مؤلمة أو ثؤلول غير مؤلم يظهر أي منها علة بمقملة القصيب ويستمر بقاوته لفترة طويلة .

ولذا فإنه ينبغي في حالة ظهور مثل هذه الإصابة واستمرار بقائها لفترة تزيد على أسبوعين ضرورة استشارة الطبيب . ويعمل سرطان القصيب باستئصال الإصابة والجلد الزائد (عملية الطهارة) ويعقب ذلك إجراء علاج إشعاعي .

• جراحات تجميل القصيب :

- زبادة طول القصيب : إن الكفلة الجنسية تعتمد على وجود انتصاب قوي ولذلة كافية للقيام باتصال جنسي مُرضٍ للطرف الآخر (الزوجة) بحيث يتمكن الطرفان من الوصول إلى مرحلة الشبق، وذلك بصرف النظر عن مقدار طول

القضيب الذكري فهنه الناحية لا تهم كثيرا في إثارة المرأة حيث إن أغلب المناطق الحساسة بفرجها والتي أهمها البظر تقع خارجا. أما في حالة المعانة من قصر القضيب بدرجة واضحة فإنه يمكن إجراء عملية تجميل لزيلة طوله وتعتمد هذه الجراحة على عمل شق للربط المعلق (Suspensory ligament) ومن أبرز عيوب هذه الجراحة أنها تجعل القضيب غير ثابت بدرجة كافية أثناء الاتصال الجنسي.

- زيادة سُك القضيب : وهناك جراحة أخرى حديثة لزيلة سُك القضيب الذكري أي جعله أكثر امتلاء، وتعتبر زبقة سُك القضيب الذكري أكثر تأثيرا في إمتناع الطرف الآخر (الزوجة) عن زبقة طوله حيث إن ذلك يزيد من درجة الإثارة للنهايات العصبية بمehler الزوجة أثناء الاختراق. وتعرف هذه الجراحة باسم :

(Circumferential autologous penile engorgement = CAPE)

تعتمد فكرة هذه الجراحة على شفط كمية من الدهون من جدار البطن ثم حقنها بمناطق متفرقة حول امتداد القضيب مما يزيد وبالتالي من سُكه ويجعله أكثر امتلاء. ومن أبرز عيوب هذه الجراحة أنها قد تظهر القضيب بشكل غير مستو حيث يندو أكثر امتلاء بمناطق معينة عن الأخرى. وتجري هذه الجراحة بمدخل موضعى وتم إجراؤها لأكثر من ألف حالة في الولايات المتحدة.





مشاكل الخصية



تتعرض إحدى الخصيتين أو كلياهما لمشاكل صحية وأمراض .. وهذه تشمل على حالات عديدة .. وهذه أهمها:

• الخصية المعلقة :

أنثه غو الجنين تكون الخصية في منطقة البطن ثم تهبط تلقاءاً لتسقى داخل كيس الصفن .

لكن ذلك الهبوط لا يحدث أحياناً وتظل الخصية معلقة داخل الجسم فتسمى بالخصية المعلقة أو "غير النازلة" (Undescended testicle) وقد تحدث هذه الحالة لإحدى الخصيتين أو لكليهما، وقد وجد أن الأطفال ناقصي النمو والذين يولدون قبل اكتمال مدة الحمل تزيد بينهم فرصة حدوث هذا العيب الخلقي حيث تبلغ نسبة حدوثه ٩% بينما تبلغ نسبة حدوثه بين المواليد الذين أمروا فترة حملهم ١% فقط .

وعادة تكتشف الأم هذا العيب بمحض الصدفة عندما تلاحظ أن كيس الصفن عند ولديها خالي مفرغاً .

ويمكن تصحيح هذه الحالة جراحياً وإعادة الخصية لمكانها الطبيعي . ويفضل إجراء هذه الجراحة مبكراً نسبياً وقبل بلوغ الطفل سن خمس سنوات حتى تتهيأ الفرصة الكافية لنمو الخصية ثمواً طبيعياً وبالتالي نستثنى احتمال حدوث هبوط في وظيفتها في إنفلات الحيوانات المنوية في حالة استمرار بقائها لسنوات طويلة في وضعها غير الطبيعي داخل الجسم وليس خارجه .

• الخصية المتراءجة :

هذه حالة أخرى تفسر عدم وجود إحدى الخصيتين بكيس الصفن بالإضافة لحالة الخصية المعلقة .

ففي هذه الحالة يظهر أحياناً كيس الصفن خالياً من إحدى الخصيتين ولكن لسبب آخر غير نزولها للكيس .. هذا السبب هو حدوث انقباض عضلي قوي نتيجة للإثارة باللمس أو بالبرودة الشديدة مما يتسبب في سحب الخصية لأعلى داخل منطقة الخوض مؤقتاً ولذا تسمى الحالة بالخصية المتراءجة أو النكمشة (Retractile testicle) وعلة تحدث هذه الحالة بين الأطفال والصبيان ولا تحتاج إلى علاج وإنما تحتاج إلى استشارة الطبيب لاستثناء حالة الخصية المعلقة .

• الخصية التائية :

في هذه الحالة تنزل الخصية إلى كيس الصفن أثناء مرحلة النمو لكنها تختفي الأتجاه حيث تستقر يمكن آخر غير طبيعي مثل الخوض أو عند مؤخرة القضيب .

ولذا تسمى هذه الحالة بالخصية التائية أو المهاجرة أو المخارجة عن مكانها الصحيح (Ectopic testicle) وأحياناً يتصحّح هنا الوضع自然ي تلقائياً وتعود الخصية إلى مكانها الطبيعي داخل كيس الصفن . ولكن في حالة عدم حدوث ذلك ينبغي التدخل الجراحي لإعادة الخصية لوضعها الطبيعي حتى يستمر ثوابها بصورة طبيعية .

• الفيللة المائية (Hydrocele) :

هي عبارة عن تجمّع لسائل مائي في كيس الصفن مما يؤثّر بالتأخير إلى حدوث انتفاخ وتورم بالأنسجة الخبيطة بـ إحدى الخصيتين أو كليهما .

ولكن لماذا يتجمّع السائل بهذه الطريقة ؟ في أغلب الحالات لا يوجد سبب معين أو معروف ولكن يعتقد أن التعرض للعدوى أو الإصابة بهذه المنطقة يلعب دوراً

مهما في حدوث هذه المشكلة . وعادة ما تحدث حالة القبّلة المائية بين الرجل في متتصف العمر .

في الحالات التي يحدث فيها انتفاخ شديد بالكيس مصحوب بألم وعدم ارتياح يكون هناك ضرورة لتقديم العلاج المناسب وذلك بسحب هذا السائل المتجمد بسرقة معقمة تحت تخدير موضعي . أما في حالة تكرار تجمّع السائل فلا بد من إجراء جراحة لمنع تكرار الحالة مرة أخرى .

• دوالي الخصية :

دوالي الخصية (Varicocele) من الحالات الشائعة من متاعب الخصية والتي يمكن أن تؤدي إلى ضعف خصوبة الرجل في عدد كبير من الحالات .

والمقصود بدوالي الخصية حدوث انتفاخ بالأوردة فوق الخصية والتي تقوم بتصریف الدم منها وذلك بسبب حدوث تلف بصمام الأوردة مما يؤدى إلى احتتجاز الدم بها وانتفاخها وتعرجها على غرار ما يحدث في حالة دوالي الساقين .

وحدوث الدوالي ليس شيئاً خطيراً ، فهو لا تسبب في أمراض مزعجة باستثنى الإحساس أحياناً بثقل أو عدم ارتياح أثناء تدلي الخصيتين ، ويمكن تخفيف ذلك بارتداء ملابس داخلية توفر " الإسناد " الكافي للخصيتين . كما أن بقاء الدوالي بدون علاج لا يتسبب في مضاعفات .

ولكن مشكلة الدوالي تكمن في أن ركود الدم أو ارتجاعه داخل الأوردة المغذية للخصيتين يرفع من درجة حرارتهما وهذا يؤثر تأثيراً سلبياً على عملية تكوين الحيوانات المنوية . ويمكن أن يؤدى إلى انقصان عددها وضعف حيويتها مما يقلل من خصوبة الرجل .

ويneath على ذلك فإنه في حالة وجود دوالي الخصية وتأثيرها على الحيوانات المنوية وتتأثر حدوث الإنجاب ، فإنه يجب في هذه الحالة إجراء جراحة لعلاج الدوالي .

وتحتاج الجراحة بعمل شق جراحي بأسفل منطقة البطن وأعلى الفخذين على أحد الجانبين ويقوم المحرج من خلاله بعمل ربط للأوردة وهي جراحة بسيطة ..

ويحدث بعدها على مدى ثلاثة شهور تحسّن كبير وواضح بصورة الحيوانات المنوية .
ويتم تشخيص دوالي الخصية بالكشف الإكلينيكي من خلال جس الأوردة فوق الخصية .. وعلة تحدث التوالي في الخصية اليسرى . ويتأكد التشخيص بإجراء أشعة باللوجات فوق الصوتية على الخصيتين .

تحذير للشباب!

ولكن لماذا تحدث دوالي الخصية؟ .. أو بمعنى آخر ما الذي يؤدي إلى تلف صمام الأوردة المغذية للخصية؟

قد يكون ذلك نتاجاً من وجود ضعف خلقي بالأوردة .. أو بسبب تكرار ارتفاع الضغط داخلها كأثناء السعال المتكرر ، أو دفع أحذل ثقيلة .

ولكن في الحقيقة أن من أهم ما يعرض لحدوث هذه المشكلة تكرار الإثارة الجنسية دون حدوث جماع .. أو بمعنى آخر تكرار حدوث انتصاب قوي للفصيبي دون اكتمال العملية الجنسية بمدوات قذف . فمع تكرار ذلك تتعرض الأوردة للضعف بسبب تكرار ارتفاع الضغط بداخليها لمدة طويلة .

وهذا يوضح لنا أهمية الالتزام بالغففة ، وغض البصر ، وتجنب أماكن الإثارة للوقاية من التأثيرات السلبية للهياج الجنسي ، والتي من ضمنها الإصابة بدوالي الخصيتين .. وهذه نصيحة مهمة للشباب قبل الزواج .

• التهاب الخصية :

التهاب الخصية (Orchitis) حالة يحدث فيها تورم بال�性 مصحوب بألم وارتفاع بدرجة حرارة الجسم . ومن أهم أسباب هذه الالتهاب حدوث عدوى لل�性 بفيروس الغدة النكفية . إن عدداً قليلاً من الشباب والرجل يمكن أن يصاب بالتهاب الغدة النكفية بعد تجاوز سن البلوغ .. وقد وجد أن حوالي ربع عدد هذه الحالات القليلة يتعرض لالتهاب بال�性 بسبب إصابتها بهذا الفيروس المعنى

والتهاب الخصية ليس حالة مرضية خطيرة ، ولكن تكمن أهميته فى تأثيره على عمل الخصية المصابة بالالتهاب ، فعدة ما يحدث انكماس للخصية وضعف بوظيفتها مما يؤثر بالتالى تأثيرا سينا على خصوبة الرجل .

ويُجلع التهاب الخصية بالعقاقير المسكنة للألم والخافضة للحرارة مع عمل كمادات ثلج لتخفيض الألم والتورّم . كما يجب الالتزام بالراحة لمدة كافية وتناول غذاء صحي خفيف لمساعدة الجسم على مهاجمة الفيروس والوقاية من انتشاره إلى الخصيتين .

• التهاب الخصية والبربخ :

هذه حالة يحملت فيها التهاب الخصية والبربخ المتصل بها (Epididymo-orchitis) .. وعلة ما يكون السبب انتشار العدوى البكتيرية هذه المنطقة من المجرى البولي .. أى يكون هناك التهاب وعدوى بجزء من المجرى البولي (كالثانية أو الحالب) ثم تنتشر منه الجراثيم المعدية للخصية والبربخ .

تميز هذه الحالة بانبعاث ألم شديد من الخصية المصابة ، مع تورم الخصية ، واحمرار وتورم كيس الصفن .

ويسبب هذا الألم الشديد فإن هذه الحالة تتشابه مع حالة أخرى تصيب الخصية يحملت فيها التواء للأوعية المغوية المغذية للخصية (كما سيتضاع) وبالتالي يحملت انسداد لتيار الدم المغذي للخصية .. ولذا يفضل بعض الأطباء إجراء جراحة استكشافية في حالات التهاب الخصية والبربخ لاستثناء وجود انسداد بالأوعية المغوية .

ويُجلع التهاب الخصية والبربخ بتقديم المضادات الحيوية المناسبة مع الالتزام بالراحة وأحيانا لا تعود الخصية الملتئمة لحجمها الطبيعي إلا بعد عدة شهور من بهذه العلاج .

• التواء الخصية :

التواء الخصية (Torsion of the testicle) حالة من أخطر الحالات التي تتعرض لها الخصية؛ لأنها يمكن أن تسبب في فقد الخصية باستئصالها .

ومنه الحالة تحدث عندما تتعرض الخصية للتواء أو التلف مما يقطع تيار الدم الواصل لها.

وبالنسبة لذلك تظهر أعراض شديدة على المصاب بصورة مفاجئة تعقب حدوث هذا التلواء، تكون في صورة انتفاخ ألم شديد من الخصية مصحوب بسحوم وأحياناً تغير بلون كيس الصفن .. وقد يحدث أيضاً ألم في منطقة البطن مصحوب بغثيان.

وتتطلب هذه الحالة إجراء جراحة عاجلة حتى لا تتعرض الخصية للتلف بسبب توقف وصول الدم إليها .. ومن خلال هذه الجراحة يقوم الجراح بتصحيح هذا التلواء وتثبيت الخصية داخل كيس الصفن .

وفي حالة تئثر القيام بهذه الجراحة المهمة مع استمرار انقطاع وصول الدم للخصية تصيب الخصية " بالغرغرينا " مما يستدعي بالتالي ضرورة استئصالها. لكن هذا الاستئصال لا يؤثر علة على درجة الخصوبة مادام أن الخصية المتبقية تعمل بكفاءة.

• **الحووصلة للبربخية :**

وهي عبارة عن ورم صغير مملوء بسائل يصيب البربخ (Epididymal Cyst) .. والبربخ هو أنبوبة طويلة متعرجة تتصل بالجزء العلوي الخلفي من الخصية ، ويحدث خلاها نضج للحيوانات المنوية .

ليس هناك خطورة من هذا الورم .. ولذا لا يفضل استئصاله جراحيًا إلا في حالة تضخمه بدرجة كبيرة وتبسيطه لضيقه .

• **القيلة المنوية :**

القيلة المنوية (Spermatocele) عبارة عن ورم مملوء بسائل مختلط بحيوانات منوية يصيب البربخ .


ولا يحتاج هذا الورم لاستئصال جراحي إلا في حالة تضخمه بدرجة كبيرة أو تبسيطه لضيقه وعدم ارتياح ..



مشاكل البروستاتا

مشكلة البروستاتا

غدة البروستاتا عضو هام يلعب دوراً كبيراً في خصوبة الرجل . وهو عضو كثير الإزعاج خلال فترات الحيرة المختلفة .



شكل يوضح مكان غدة البروستاتا وبالي لجزء الجهاز التناسلي

فتعرض غدة البروستاتا للاحتقان والالتهاب خلسة خلال مرحلة الشباب . وتعرض للتضخم خلسة خلال السنوات القليلة قبل سن الستين . أما بعد سن

الستين فتحل الإصابة بـأخطر مشكلات البروستاتا وهي مشكلة

سرطان البروستاتا . فتعالوا نستوضح هذه المشكلات وكيفية الوقاية منها .

• التهاب البروستاتا :

يحدث التهاب البروستاتا (Prostatitis) بسبب تسلل جراثيم معدية لغدة البروستاتا من خلال فتحة مجرى البول وغالباً ما تكون هذه الجراثيم من نوع البكتيريا .

وقد يكون مصدر هذه الجرائم المعدية مرتبطة بعذوى انتقلت لقنة مجرى البول بسبب اتصال جنسى آثم (زنا) .. أو قد تكون ناتجة من وجود عذوى موجودة أصلاً بالجهاز البولى ثم انتشرت عبر قنة مجرى البول للبروستاتا.

ولكن فى بعض الأحيان لا يكون التهاب البروستاتا مصحوباً بعذوى، كما يدل على ذلك نتائج التحاليل، وإنما يكون ناتجاً فى هذه الحالة من حدوث تهيج لغدة البروستاتا بسبب ارتجاع جزء من البول أو بسبب ترسب حصىٍّ دقيقٍ داخل قنة الغدة.

• أعراض التهاب البروستاتا :

إذا كنت تعانى من بعض أو كل الأعراض التالية فهناك احتمال كبير في إصابتك بالتهاب البروستاتا:

- ألم وحرقان أثناء التبول .
- رغبة متكررة في التبول .
- ارتفاع بدرجة الحرارة (في الحالات الحادة) .
- ألم عنقية أسفل الظهر .
- ألم عميق فيما بين كيس الصفن وفتحة الشرج .
- خروج إفرازات من القصيب .
- ألم أثناء القذف .

وبالإضافة إلى هذه الأعراض يتم كذلك تشخيص التهاب البروستاتا من خلال الفحص الظهرى لعينة من البول ولعينة من الإفراز البروستاتى الذى يخرج من قنة مجرى البول أثناء عمل تدليك لغدة البروستاتا.

ويجرى هذا التدليك بإدخال إصبع داخل قفاز مغطى بطبقة من كريم ملين ويدلك به جسم الغدة .

ومن خلال هذا الفحص تظهر الغدة المليتية للطبيب متورمة مصحوبة بألم عند اللحس.

• العلاج :

ويعالج التهاب البروستاتا الناتج عن عدوى بكتيرية بالمضادات الحيوية المناسبة ..
وعلة يتطلب ذلك الاستمرار في تناولها لمد طويلة قد تصل إلى سنة .

أما التهاب البروستاتا غير المصحوب بعدوى فيعمل بتقديم العقاقير المضادة للالتهاب والمسكنة للألم مثل بروفين .

• سرطان البروستاتا :

إن سرطان البروستاتا يعد السرطان الأول بين الرجل وينظره عند النساء سرطان الثنى الذي يعد السرطان الأول بين النساء .

وهو نوع شرس قاتل من السرطانات .. ومن أسوأ جوانبه أنه لا يكتشف غالبا إلا في مرحلة متاخرة مما يقلل بالتالي من فرص النجاة من خطورته .

ولا أحد يعرف سبب حدوث هذا السرطان . ولكن هناك عوامل واضحة مشتركة بين كثير من أصيبوا بهذا السرطان .. وأهم هذه العوامل هما العامل الوراثي والعمل الغذائي .

- **العامل الوراثي :** فقد لوحظ أن سرطان البروستاتا يميل للحدوث بين أفراد بعض العائلات دون غيرها . وبنها على ذلك فإن إصابة الأخ أو الأب بسرطان البروستاتا تزيد من فرصة إصابة باقي أفراد الأسرة بدرجة تصل إلى ثانية مرات (بنها على ما حملته إحدي الإحصائيات الحديثة) .

- **العامل الغذائي :** فقد لوحظ أيضاً أن فرصة الإصابة تزيد مع اتباع عادات غذائية تتميز بكثرة تناول الدهون وخاصة الدهون المشبعة (الدهون الحيوانية) .

والإصابة بسرطان البروستاتا لا تهدى حية المصايب فحسب لكنها تعرضه كذلك لأعراض مزعجة مؤلمة . فعلى سبيل المثل عندما تتضخم البروستاتا بسبب الورم

السرطانى فإنها تضغط على قنة مجرى البول مما يتسبب بالتالى فى احتبس البول أو مروره بصعوبة مصحوباً بألم .

- طرق الوقاية :

ونظراً لأن سرطان البروستات لا تظهر أعراضه في أغلب الحالات إلا في مرحلة متاخرة فإن إجراء فحوصات دورية للكشف عن هذا السرطان في مرحلة مبكرة يعد أمراً مهماً بالنسبة للمعرضين للإصابة به (كما في حالة وجود عمل وراثي) وبالنسبة للرجل عموماً في سن متقدمة (في أغلب الحالات تحدث الإصابة فوق سن 65 سنة) .

وهذه الفحوص الروتينية الدورية تشتمل على ما يلى :

- اختبار PSA (Prostate Specific Antigen) :

هذا اختبار بسيط للدم يكشف عن وجود مادة بروتينية معينة تظهر بالدم في المراحل المبكرة من سرطان البروستاتا وقبل أن يظهر أي أعراض .

- الفحص الشرجي :

حيث تظهر الغدة المصابة بالسرطان صلبة متحجرة عجيبة أحياناً .

- الفحص باللوjunction فوق الصوتية .

- طرق العلاج :

ويعالج سرطان البروستاتا بالاستئصال الغدة والورم السرطاني .. ونظراً لأن ذلك يتسبب في كثير من الأحيان في ضعف جنسي وربما حلوث سلس بالبول ، فيإن بعض الأطباء يفضل الاكتفاء بالعلاج الإشعاعي والهرموني .

• احتقان البروستاتا :

احتقان البروستاتا من المشاكل الصحية الشائعة بدرجة كبيرة بين المراهقين والشباب قبل الزواج .. وسببها يرتبط بكثرة التعرض للمثيرات الجنسية وحدوث انتصاب دون اكتمال العملية الجنسية ، أى دون حدوث قذف ؛ مما يؤدي إلى امتلاء الأوعية التمومية المغذية لمنطقة الموضع عموماً واحتجاز الدم بها لفترات متكررة .

ويدل على حدوث هذا الاحتقان الإحساس بتقليل بالعضو والخصيتين وخروج إفراز بروستاتي من القضيب يشبه المني وخاصية عند "الحزق" أثناء التبرز أو التبول.

ونحن ننصح الشباب والمراهقين بعدم الوقوع في هذه المشكلة ، وأن يتجنّبوا المثيرات الجنسية ، وأن يتعرّفوا ويصبروا لحين أن يتزوجوا .. لأن تكرار حدوث هذا الاحتقان قد يؤدي إلى حدوث "دوالي" بالخصية وهي مشكلة يمكن أن تؤثر على القدرة على الإنجاب .

ويُعالج الاحتقان البروستاتي بعض العقاقير الخاصة وقد يحتاج إلى العلاج بمجلسات تدليل البروستاتا المختنقة وتفریغ إفرازاتها .

• تضخم البروستاتا :

بعد سن الخمسين يحدث تضخم بغلة البروستاتا لغالبية الرجل لكنه يحدث بدرجات متفاوتة لذا قد لا تظهر أعراض واضحة .. أو قد يصاحبه أعراض مزعجة . وقد يحتاج لعلاج جراحي .. وقد لا يحتاج لأى علاج .

- لماذا تتضخم البروستاتا ؟

إن جسم الرجل يحتوى على كلا النوعين من الهرمونات الجنسية ، أى يحتوى على الهرمون الذكري (تستوستيرون) والهرمون الأنثوي (استروجين) لكن الهرمون الأنثوي تكون نسبة ضئيلة بالطبع عن الهرمون الذكري ويكون بينهما توازن أو تناسب معين .

ومع التقدم في السن ، يختل هذا التوازن نظراً لانخفاض إنتاج الهرمون الذكري ..
ويعتقد أن هذا الخلل الذي يتميز بزيادة كمية الاستروجين بالنسبة للستيرويدون
يؤدي إلى زيادة نشاط مواد معينة تعمل على زيادة غزو خلايا البروستاتا .

- أعراض التضخم :

إن الموضع الحساس لغدة البروستاتا ، حيث تحيط بقناة مجاري البول أسفل المثانة
مباشرة ، يتسبب في حدوث أعراض مزعجة بسبب تضخمها مثل :

- ضعف تيار البول .

- احتباس البول .

- صعوبة بدء التبول .

- صعوبة توقف التبول (أى استمرار نزول بعض نقط من البول بعد الانتهاء) .

- تكرار الرغبة الملحة للتبول وخاصة أثناء الليل .

- العلاج :

في حالة حدوث أعراض مزعجة متكررة تقلق راحة المريض فين العلاج الأمثل
في هذه الحالة هو استئصال البروستاتا حيث تستحصل كل الأنسجة " الجديدة " التي
أدت إلى التضخم من خلال غلاف البروستاتا ، بينما يبقى النسيج الأصلي موجوداً .
أو قد يرى الطبيب ضرورة استئصال الغدة بأكملها وخاصة في حالة ما يشير الشك
في حدوث تحول سرطاني بأنسجة الغدة والنوع السائد من هذه المراجحة هو
استئصال البروستاتا عن طريق قناة مجاري البول باستخدام المنظار (TuiP) .





النصيحة لمواجهة ليلة الدخلة ونجاح المعاشرة بين العروسين



• كيف تؤدي واجبك على الوجه
الأكمل في ليلة الزفاف ؟!

كيف تتحقق رجولتك في ليلة زفافك؟!



٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧

النصيحة الأولى :

العنف منع والغضب مرفوع!

عندما تبدأ في جام عروسك بشيء من العنف فاعلم أنك وقعت في أكبر خطأ يقع فيه الأزواج في ليلة الزفاف . فالعنف في مجتمع العذراء فيه آثى كبير لها . ولكن لماذا ؟

لأن فتحة المهبل (مكان الإيلاج) تكون ضيقة ومحاطة بغشاء رقيق هو غشاء البكارة ، فإذا استعجلت أو تعنتت في الإيلاج فقد يؤدي ذلك إلى تهتك بأنسجة المهبل وجداره وحدوث تمزق مفاجئ عنيف لغشاء البكارة ويصاحب ذلك التهتك خروج كمية كبيرة من الدم وقد يحدث نزيف يحتاج إلى علاج طبي سريع .

فلا تتعنت فلا يزال أمامك وقت طويل .. ولا تخضب إذا لم تجد من عروسك استعداداً كافياً للإيلاج .

النصيحة الثانية :

التمهيد والملاطفة يذللان لك المخاوف ويفسحان الطريق المغلقة !

العروس خائفة .. عمر الإيلاج ضيق ..

العضلات متشنج .. العرق يتصلب ..

محاولات متكررة فاشلة ..

هذا "السيناريو" يحدث في حالات كثيرة في ليلة الزفاف .. فما هو الحال؟

الحل هو التمهيد واللاملاطفة.

فلا بد أن يكون هناك تمهيد لجماع العروس يتمثل في قضاء بعض الوقت في المحادثة واللاملاطفة والمداعبات الجنسية الخفيفة.

فهذا التمهيد يزيل من نفس العروس المخاوف ، ويقربها إلى زوجها ، وهذا ينعكس أثره على عضلات الحوض فترتخى ، وعلى المهبل ؛ فيتهيأ للجماع بخروج الإفرازات الملينة كما ينعكس على الشهوة الجنسية فتشتعل .. وكل ذلك يُسهل مأمورية الزوج ويدلل له كثيراً من العقبات التي يمكن أن تعيق الإيلاج إذا لم يأخذ بهذه النصيحة واندفع في جماع عروسه دون تمهيد !

النصيحة الثالثة :

لا تكن عنيداً أيها الزوج !

محاولات للإيلاج تبوء بالفشل .. محاولة أخرى وأخرى دون فائدة ..

الزوج يشعر بالحرج .. يعاود الزوج الكرة مرة أخرى فيفشل ..

الزوج العنيد يصر على المحاولة مرة أخرى .. فشل متكرر ..

شكوى من عدم الانتصاب ..

هذا "سيناريو" آخر شائع الحدوث في ليالي الزفاف .


وما ننصح به في هذه الحالة هو عدم العناد وعدم الإصرار على جماع العروس وفض غشاء البكارة .

فعندما تبوء المحاولة الأولى بالفشل ، ويتكسر هذا الفشل مرة أخرى وأخرى ففي ذلك الكفاية .. لأن استمرار المحاولة أكثر من ذلك في نفس الليلة لا يتوقع له غالباً النجاح .. وعدم النجاح سيصيب الزوج بالحرج .. وهذا الحرج

سيسيء إلى حالته النفسية .. وهذه الإساءة قد تصيبه بضعف الانتصاب كتأثير عضوي - نفسي.

وما يجب أن يعرفه الزوج الحديث كذلك أن مهمة فض غشاء البكارة ليست دائمًا مهمة سهلة؛ لأن مهبل العذراء يكون - كما ذكرت من قبل - ضيقاً كما أن عدم درايتها بالمارسة الجنسية يصيبها بحالة من الاضطراب النفسي وهذا يؤدى بدوره إلى حدوث تشنج لعضلات الخوض .

لكن ذلك لا يعني في الوقت نفسه أنها مهمة صعبة وإنما نقصد أنهما مهمة تحتاج إلى صبر وهدوء وتروٌ .. ولا داعيًّا أبداً للإصرار على فض غشاء البكارة في ليلة الزفاف فهناك ليالٍ كثيرة مقبلة .



لا تكن متخلقاً فتقعد ملوكاً محسوراً !!

متى يكون الزوج متخلقاً؟

عندما يحاول فض غشاء بكاره عروسه بأى وسيلة أخرى غير الإيلاج الطبيعي كمحاولته ذلك بإصبعه ، أو بإصبع القابلة (الداية) أو بمفتاح المستودع !! ..

عزيزي الزوج ، إن حاولة فض غشاء البكارة بأى أداة أو بأى وسيلة كانت غير عضو الزوج تعد محفوفة بالمخاطر فمن الممكن أن يؤدى ذلك إلى تلوث وعدوى ونزيف فاعتمد على الإيلاج وحده فى فض غشاء البكارة .. وإذا فشلت .. فكر المحاولة .. ولا تيأس فصبر جيد .. فإذا فشلت كل المحاولات واستغرق الموضوع زماناً طويلاً فاستشر الطبيب فلعل غشاء بكاره العروس من النوع المطاطي العنيد الذى لا يمكن فضه إلا بعملية جراحية .. لكن هذا الاحتمال نسبته ضئيلة جداً .

لا تتوقع نزول دم يملاً آنية قليل يكفي لإثبات عنزية العروس !

وأخيرا ، لمح الزوج في تنفيذ الإيلاج .. ولكن أين الدم الأحمر ؟ ! ..
لا يوجد سوى بضع نقط مائلة للون البنى ..
الزوج ينسحب من الفراش ويفكر ..

الزوج تتباه شكوكه في عنزية زوجته .. ما مدى صحة ذلك ؟ !
هذا تصور آخر محتمل لما يمكن أن يحدث في ليلة الزفاف .

فما أحب أن أؤكده لكل زوج حديث أن الدم الناتج عن فض غشاء البكارة
دم قليل الكمية وتختلف كميته بصفة عامة من امرأة لأخرى .. وأن هذا الدم
من الممكن أن يختلط بإفرازات المهبل أو يبني الزوج فيتغير لونه فلا يصبح
بذلك أحمر كلون الدم المعتاد لنا .

كما أن إيجاد بعض الصعوبة في الإيلاج يؤكّد إلى حد ما عنزية العروس ..
لأن غيب العذرية أو ممارسة الجنس قبل الزواج (والعياذ بالله) تؤدي إلى
اتساع فتحة المهبل وبالتالي يكون الإيلاج في ليلة الزفاف سهلاً بدرجة تفوق
المتوقع .

ارحم عروسك يرحمك الله !

نفترض الآن أنك لمجحت في تنفيذ الإيلاج وفي فض غشاء البكارة ورأيت
الدم أملأك واطمأن قلبك .. فماذا تفعل بعد ذلك ؟
النصيحة هي : لا تفعل شيئاً !

فلا تعاود جماع العروس مباشرة وإنما انتظر يومين على الأقل حتى يبرأ
جلح ، ويتوقف نزول الدم تماماً ، وتلتئم الأنسجة .

فمن الخطير أن تستمر في هيلجتك وتنمطي في جماعك ولا تربط زمامك ؛
أن استمرار الجماع بعد فض غشاء البكارة دون توقف أو راحة يتسبب
لعروس ويمكن أن يتسبب في استمرار نزول دم بل يمكن أن يحفز على
حدوث تلوث بمكان الأنسجة التي المبرحة بسبب فض غشاء البكارة .

ومن واجب الزوجة خلال فترة التوقف القصيرة عن الجماع بعد فض
غشاء البكارة أن تغسل فرجها بماء دافئ لتطهيره ولا مانع من أن تضيف مادة
مطهرة (مثل الديتول) بكمية قليلة إلى ماء الاغتسال للوقاية من حدوث
تلتوث أو عدوى لمكان الجرح .

التوصية السابعة :

إذا لم تعرف .. فاطلب مساعدة الزوجة !


ولكن ما هو الذي لم تعرفه ؟ ... إنه مكان فتحة المهبل !
فمن المتوقع في ليلة الزفاف ألا يستطيع الزوج أن يحدد مكان فتحة المهبل
(بل قد حدث في حالات كثيرة محاولات للإيلاج في فتحة التبول اعتقاداً بأنها
فتحة المهبل !) وفي هذه الحالة يجب على الزوج أن يطلب مساعدة عروسه في
تحديد المكان الصائب .. ولا داعي أبداً لادعاء المعرفة (أو الفهلوة) دون دراية
كافية !

التوصية الثامنة :

عندما تشعر بالبلل ابدأ في العمل !

إن المؤشر الذي يدل على تهيؤ عضو الزوجة لاستقبال عضو الزوج هو
حدوث بلل . هذا البلل هو عبارة عن إفرازات مهبلية ملينة يمكنك استشعار
خروجها بفرج العروس .

فهذا الإفراز المليء فائدته تسهيل عملية الإيلاج فهو بمثابة " فزلين طبيعي " .. ويخرج بمحدوث إثارة جنسية كافية للمرأة .
فمتي لاحظت حدوث هذا البخل بعد فترة ما من المداعبة والملاطفة ابدأ في الإيلاج ، وتأكد أنه سيكون سهلاً نوعاً ما .



آخر ولا تبكي !

التأخير والتبكير الذي أقصدهه يتعلق بمحدوث القذف .
لا تتوقع كزوج حديث العهد بالعشرة الجنسية أن تقضي وقتاً طويلاً نسبياً حتى يحدث القذف ، بل إن حدوث القذف مبكراً هو الشيء المتوقع عند معظم الأزواج الجدد .

والمقصود هنا بالقذف المبكر هو القذف الذي يحدث بمجرد الإيلاج ، أو ربما قبل ذلك مما لا يسمع للزوجة بإشعاع حاجتها الجنسية .

ولذا يجب أن يحاول الزوج قدر استطاعته أن يؤخر حدوث القذف حتى يستشعر وصول الزوجة إلى الذروة (أي قمة المياج الجنسي) وعندئذ يبدأ في القذف فيُشبع الاثنان شهوتهما . أما تكرار حدوث القذف قبل بلوغ المرأة قمة شهوتها فلا شك أنه يصيدها باتزداج وألم نفسي وتوتر !

ولكن كيف يمكنك أن تؤخر القذف ؟

أسهل وسيلة لذلك أن تتوقف عن الحركة بعد الإيلاج ، أو تحرك ببطء حتى تقلل الإنارة ، وتجعل خيالك أو تفكيرك ينصرف لشيء آخر غير الجنس (مثل التفكير في مشكلة تواجهك في العمل) فهذا كفيل بتأخير القذف !!

قسم العمل على موضع (جفرافيه) آخر!

أنت مخطئ تماماً إذا اعتقدت أن فرج المرأة به كل مواطن الإثارة والمتعة لها فهناك موضع آخر على "خريطة الإثارة النسائية" يجب أن تضعها في اعتبارك أثناء العمل حتى يمكنك أن تشبع رغبات عروسك ويمكنك في الوقت نفسه تطريعها جنسياً.

ولكن ما هي هذه الموضع؟

هذه الموضع مختلف إلى حد ما من امرأة إلى أخرى (وكل لبيب بالإشارة يفهم!) ولكن أغلب النساء يستشعرن إثارة ومتعة من هذه الموضع: الشذى وخلصة الخلمة - جوانب الرقبة - سلسلة الظهر - فيما بين الفخذين إلى آخره. كما يجب عليك أن تعطي اهتماماً خاصاً للقبلة وفيها تكمن إثارة بالغة للمرأة بشرط أن تجیدها وأن تقبلها بضم له رائحة طيبة!

كما يجب أيضاً أن تدرك أن جزءاً كبيراً من متعة الجماع تستشعره المرأة من ملامسة فرجها من الخارج وخاصة عضو البظر الذي هو شبيه بحبة القول الصغيرة الكامنة فيما بين الشفرين الصغيرين من أعلى، فهذا العضو يستجيب للإثارة بدرجة كبيرة تجعله يتتصب؛ لأن فيه تتركز النهايات العصبية.

لا أناانية في الجنس!

المقصود بالأنانية الجنسية أن تأخذ حاجتك وتشبع شهوتك فتهم[ُ] بالغادر دون اكتراض برغبة الزوجة وتشوقها لاستمرار الجماع! فلابد أن يتنهى الزوجان من الجماع في وقت واحد وبعد إشباع رغبة كل منها.

وقد تساءلني هذا السؤال : إن الرجل عادة ما يبدأ في القذف قبل بلوغ المرأة ذروتها فملاًماً يستطيع أن يفعل في هذه الحالة ؟

الإجابة هي : إن لم تستطع تأخير القذف بما يتوافق مع شهوة زوجتك فلا تنتصرف عنها بعد حدوث القذف وإنما استمر في المحافظة على وضع الإيلاج ، على الرغم من ارتجاه العضو ، لأن مجرد وجود العضو بالمهبل ، واستمرار الاحتضان والتقبيل أمر كفيل جداً باستمرار إحساس المرأة باللوعة ووصولها إلى حالة الإشباع .

فلا تهم باللغارة بعد القذف .. وإنما أن تذهب لمكان آخر وتشعر سيجارقة فهذا السلوك تكرره كل النساء ، وإنما ابن ملازمًا لها ..

نصيحة خاصة :

متى تجتمع زوجتك ؟

جامع زوجتك وقتما تشاء ، بافتراض وجود الرغبة عند كل منكم . ولكن إذا أردت سرعة الإنجاب ، فلتجمعنها بصفة خاصة خلال فترة التبويض (أي خلال المدة التي تخرج خلالها البويضة من البيض وتظل صلحة للتلقيح) .

إن وقت حدوث التبويض عند أغلب النساء يكون في منتصف الدورة الشهرية ، أي في اليوم الرابع عشر (لأن مدة الدورة الشهرية ٢٨ يوماً) ولذا يفضل أن تجتمعها في هذا اليوم (اليوم الرابع عشر) والأيام القليلة السابقة له وبالتالي له (مثل أيام : ١٠، ١٢، ١٤، ١٦، ١٨) .



احترس من 8 خطارات الانحلال الجنسي



- قائمة الأمراض الجنسية
 - العدوى بالكلاميديا
 - أمراض السيلان
 - العدوى بالترفيكوموناس
 - أمراض المونيليا
 - مرض الزهري
 - العدوى بالهرس التناسلي
 - التأليل التناسلي
 - العدوى بالفيروس الكبدي
 - أمراض الإيدز
 - مرض التقبيل

نصيحة غالبية لكل شاب قبل الزواج :

احترس من أخطار الانحلال الجنسي



١٢٣٤٥٦٧٨٩٠

• لأجل أسرة سليمة ومجتمع سليم :

إن الالتزام بالعفة ، وترويض الشهوة الجنسية ، وتجنب الفواحش ، من الأسس المهمة التي يجب على كل شاب الأخذ بها حتى لا يقع ضحية للعديد من الأمراض الجنسية الفتاكه التي زادت وانتشرت في هذا الزمن .

إن الانحلال الجنسي لا تعود نتائجه السيئة على المتردف فحسب بل إنها في كثير من الأحيان تعود كذلك على أسرته باعتباره مصدراً لعدوى الزوجة والتي من الممكن أن تنقل عدواها إلى جنينها . ولذا فإن الانحلال الجنسي فيه لاشك دمار للأسرة وللمجتمع بأسره .

وما نشاهد في كثير من دول الغرب في وقتنا الحالى يؤكّد صحة ذلك ، فهناك أطفال لا ذنب لهم ، يولدون مصابين بمرض الإيدز ، وهناك زوجات اكتشفن بمحض الصدفة أنهن ضحايا لعدوى جنسية شرسة انتقلت لهن عن طريق الزوج المتردف .

ولذا أصبح هناك اهتمام من جانب الباحثين بوقف هذه الأضرار الأسرية الناتجة عن الانحراف الجنسي وخاصة فيما يتعلق بانتقال عدوى الإيدز . فهناك عمليات لفصل الخلايا المصابة بالعدوى من السائل المنوي للزوج المريض ثم استخدام النطفة السليمة في تلقيح الزوجة بغرض إنجاب طفل غير مصاب بالمرض .

ألم يكن من الأولى بهذه المجتمعات أن تضع ضوابط على العلاقات الجنسية وتنزع إبلحة الفواحش وجرائم الزنا !!!

• العفة دعامة أساسية لصحة المجتمع :

إن ديننا الإسلامي الحنيف يريد مجتمعاً نظيفاً طاهراً تلبى فيه كل دوافع الفطرة، ولكن بغير فوضى حتى لا تسرى فيه الأمراض وتفسد البيوت وتضيع الأنساب.

ولذا اهتم اهتماماً بالغاً بقيمة العفة، باعتبار أن حفظ الفروج، وتنظيم الغريزة الجنسية، وغض البصر جوانب لا غنى عنها لاستقامة المجتمع والحفظ عليه. وما من أمة انتشرت فيها الفاحشة إلا آل أمرها إلى الاتّهال والانحدار ..

قال تعالى :

« قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُبُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَخْفَطُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُبْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَخْفَطْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِّيْنَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يُنْظِرْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ » [النور - ٣٠ - ٣١].

وقال تعالى :

« وَلَا تَقْرُبُوا الزَّئْنَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا » [الإسراء: ٢٢].

وفي هذا الجزء أيها الأصدقاء سنستعرض مخاطر الانحلال الجنسي من خلال إلقاء الضوء على عدد كبير من الأمراض الجنسية المنقوله بالعلاقات الجنسية الخرمة الآثمة. وستلاحظون أن بعض هذه الأمراض الشرسة ، كمرض الإيدز ، لم يتوصل العلم الحديث حتى الآن لعلاج شاف لها . وهذا الاستعراض لهذه الأمراض الخطيرة لا شك أن فيه تأكيداً لقيمة العفة ، ووازعاً قويًا لكل شاب بأن يتجنب طريق الفواحش ليحمى نفسه وبينى أسرة سليمة معافاة !

قائمة الأمراض الجنسية



٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠

س - ما هي الأمراض المحتل المتقدمة عن طريق الممارسة الجنسية ؟

ج - منذ عشرينات القرن العشرين (أو في بدايات القرن التاسع عشر) كان أكثر الأمراض التي تنتقل عن طريق الممارسات الجنسية المحرمة (الزنا) مرضان هما: مرض الزهري ومرض السيلان.

أما في وقتنا الحالي فقد كادت أن تخفي الإصابة بمرض الزهري، كما انخفضت حالات الإصابة بالسيلان مقارنة باللأمراض . ولكن في الوقت نفسه انتشرت الإصابة بأمراض أخرى في مقدمتها: التهاب مجرى البول غير المحدد (non-specific urethritis = NSU) والثآليل التناسلية (genital warts) المريض التناسلي (genital herpes) والإصابة بفيروس نقص المناعة (HIV) ومرض الإيدز (AIDS).

العدوى بالكلاميديا

س - وما هو المقصود بالتهاب مجرى البول غير المحدد ؟

ج - هذا الالتهاب يصيب قنة مجرى البول وهي الأنوية التي تنقل البول من المثانة للخارج وتجرى بطول القضيب والتي يمر خلالها أيضا السائل المنوى أثناء القذف . يحدث هذا الالتهاب بسبب العدوى بجرثومة لها بعض خصائص البكتيريا، وبعض خصائص الفيروسات وتسمى (كلاميديا) (chlamydia).

وعندما تقع الإصابة بالكلاميديا تظهر أعراض ذلك في صورة :

- حدوث حرقان أثناء التبول .

- خروج إفراز مائل للون الأصفر من القصيب وفي حالة إهمال العلاج قد تحدث مضاعفات مثل :

- انتشار العدوى للخصيتين والبربخ ؛ مما يتسبب في ألم وتوتر.

- انتشار العدوى للمستقيم والتهابه.

- انتشار العدوى لمناطق أخرى وحدوث التهابات بها كالمفاصل والعين .

ولتشخيص حالات العدوى بالكلاميديا تؤخذ عينة من الإفراز القصبي وتفحص بالجهر للكشف عن المجرثومة المسببة للعدوى .

ويمكن علاج هذه العدوى بالمضادات الحيوية وخاصة الأنواع من فصيلة تتراسينكلين .

وجريدة بالذكر أن الإصابة بالكلاميديا قد لا تظهر بصورة واضحة بين النساء ؛ لأن الأعراض المرتبطة بالتبول قد لا تحدث وفي حالة ظهور إفراز من بجرى البول فإن هذا الإفراز قد يعتقد خطأ أنه أحد إفرازات المهبل الطبيعية .

ولذا فإن فرصة الإصابة بهذا المرض من خلال الممارسات الجنسية الخرمة تعتبر مرتفعة ؛ لأن العدوى تكون غالبا في حالة كامنة غير ظاهرة .

أعراض السيلان

س - وما هي أعراض الإصابة بمرض السيلان؟

ج - تظهر أعراض الإصابة بالسيلان خلال فترة تتراوح ما بين يومين إلى عشرة أيام منذ وقوع خطيئة الزنا .. وتشتمل الأعراض على عرضين أساسين وهما :



إفراز صديدي يخرج من فتحة
القضيب في حالات العدوى بالسيلان

- خروج إفراز صديدي من القصيب .

- حدوث حرقان أثناء التبول قد يكون خفيفاً أو متوسطاً أو شديداً .
وفي حالات الجنس الفموي (Oral sex) يحدث التهاب مؤلم بالحلق .. وفي حالات الجنس الشرجي (Anal sex) يحدث التهاب مؤلم بالشرج .
وفي حالة إهمال العلاج تحدث مضاعفات عديدة مثل انتشار العدوى للخصيتين والبروستاتا وحدوث التهاب بالفراص ولتسنم للدم بالبكتيريا المعدية وعادة تستجيب حالات الإصابة للعلاج بالمضادات الحيوية .

العدوى بالتريكوموناس

س - وما هي أعراض العدوى بالتريكوموناس ؟

ج - التريكوموناس (Trichomonas) هو طفيل وحيد الخلية عندما تنتقل العدوى به عن طريق الاتصال الجنسي فإنه يقطن قناة مجرى البول ويتكاثر بها وقد تنتشر العدوى به للبروستاتا . ونتيجة ذلك يحدث ألم وحرقان أثناء نزول البول وقد يظهر إفراز من القصيب بلون أحمر مائل للصفرة . ولكن في الحقيقة أن هذه العدوى تظل كامنة في عدد كبير من الحالات ولا يظهر لها أعراض واضحة .
وتحتاج العدوى بالتريكوموناس لعقار ميترونيدازول (فلاجيل) والذي يستخدم كمضاد للأميبا .

أعراض المونيليا

س - ما هي الكانديدا وكيف تحدث العدوى بها ؟

ج - الكانديدا (Candida) هي نوع من الخمائر .. والخمائر جراثيم قريبة الشبه والصلة بالفطريات وتسمى العدوى بالكانديدا باسم مونيليا (Monilia).
وتعتبر المونيليا من الحالات المرضية الشائعة بين النساء عموماً وتتسبب في نزول إفراز بلون أبيض وحدوث حكة قد تكون شديدة .
ويمكن أن تنتقل هذه العدوى للرجل عن طريق الاتصال الجنسي . ولكن

في الحقيقة أن هناك عوامل أخرى تحفز على حدوث هذه العدوى عند الرجل مثل الإصابة بمرض السكر ، وتناول مضادات حيوية واسعة الجمل لمدة طويلة . وتحدث أعراض هذه العدوى في صورة حدوث احمرار وحكة عند طرف القضيب . وتستجيب هذه العدوى جيدا للعلاج بأخذ الكريمات المضادة للفطريات .


م乾坤 الزهري

س - هل يعتبر الزهري من الأمراض الجنسية الخطيرة ؟

ج - بكل تأكيد ..

قبل اكتشاف المضادات الحيوية كان كثير من الرجال في أوروبا يموتون بسبب مضاعفات الزهري .

يسبب في حدوث هذا المرض نوع من البكتيريا حلزونية الشكل (Spirochaetes) . وظهور أعراض العدوى متمثلة في حدوث قرحة على سطح القضيب (أو الفم أو الشرج) تسمى قرحة الزهري (Chancre)



شكل قرحة الزهري على القضيب الذكري

وذلك بعد مرور أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع منذ اقتراف خطيئة الزنا أو منذ دخول الميكروب إلى الجسم . ويمكن بأخذ عينة من أنسجة هذه القرحة وفحصها مجهريا التأكد من وجود البكتيريا المعدية .. وتسمى هذه المرحلة بالمرحلة الأولى من العدوى ففي حالة إهمال علاج هذه القرحة فإنها تلتئم لكن الميكروب يتسلل إلى الدم وذلك خلال مدة تتراوح

ما بين بضعة أسابيع إلى بضعة شهور ، ويدخل المريض في المرحلة الثانية للعدوى ، وتظهر أعراض هذه المرحلة في صورة حدوث سخونة وصداع وتعب عام وطفح جلدي وتوتر بالغدد الليفماوية ، ويمكن بإجراء اختبار للدم الكشف عن وجود البكتيريا المعدية .

وحتى بلوغ هذه المرحلة فإنه لا يزال من الممكن القضاء على العدوى بالمضادات الحيوية المناسبة مثل البنسلين عن طريق الحقن ، ولكن إذا لم يُقدم العلاج بكفاءة وملة كافية فإن العدوى قد تكرر بعد عدة سنوات ، وتبداً مرحلة أخرى للزهري . في هذه المرحلة الثالثة والأخيرة تحدث مضاعفات خطيرة بسبب مهاجمة الميكروب لأعضاء حيوية بالجسم كالقلب ، والأورطى ، والمخ ، والجهاز العصبي ، ولذا فإن هذه المرحلة عادة ما تنتهي بالوفاة .

العدوى بالهرس التناسلي

س - ما هو المقصود بالهرس التناسلي ؟

ج - هذا نوع من الفيروسات يتسبب في إصابة العضو الذكري بما هو أشبه بالتقرحات التي تظهر عند زاوية الفم في فترات الشتاء البارد ، والتي يسببها نوع شبيه من الفيروسات يسمى هرس سجلكس .

وتبدأ الإصابة في صورة الإحساس بمحكة أو شकشكة بالجلد حول العضو الذكري يلى ذلك ظهور فقاقع صغيرة مملوءة بسائل ، ثم تتمزق هذه الفقاقع وتتجف ويبقى مكانها تقرحات تلتئم ببطء . وتستغرق هذه المراحل حوالي ثلاثة أسابيع . ولكن في عدد كبير من الحالات لا يهلك الفيروس ولا يرحل ، وإنما يبقى كامناً بالأنسجة مما يتسبب في حدوث الإصابة من جديد . وقد يصاحب العدوى بالهرس التناسلي حدوث أعراض أخرى عامة مثل الصداع ، والتعب العام ، وتوتر بالغدد الليفماوية .

ويستخدم لعلاج هذه العدوى عقاقير مضادة للفيروسات مثل كريم "سيكلوفير" الذي يساعد على سرعة الالتئام ويقلل من فرصة إعادة حدوث

العدوى كما يفيد عمل حام موضعى من الماء الدافع والملاح لتخفيض الام و عدم الارتباط المصلحبين لوجود الفقاقع .

الثأليل التناسلية

س - وكيف تظهر الإصابة بالثأليل التناسلية ؟

ج - الثؤلول (Wart) هو عبارة عن ورم صغير يظهر على جلد القضيب أو حول فتحة الشرج (الجنس الشرجي) أو داخل فتحة الشرج ، أو داخل قنطرة مجرى البول .

و تظهر الثأليل بأشكال مختلفة فقد تكون فردية ، أو فى صورة تجمادات أشبه بعناديق العنب ، وقد يكون سطحها ناعماً أو ملمس أو خشنًا متعرجاً فتكون شبيهة بشمرة القنبيط أما لونها فعادة ما يكون أحمر أو أحمر غامقاً أو قرميزاً . وعادة يصاحب الإصابة بالثأليل وجود حكة ، أو تهيج بمكان الإصابة .

و تحدث الإصابة بالثأليل التناسلية بسبب العدوى بنوع معين من الفيروسات (human papilloma virus) والتي ينتقل أنثاء الممارسة الجنسية بين طرف وآخر .

و تعالج الثأليل التناسلية بوضع مادة كيميائية خاصة (Podophyllin) تؤدي إلى قتل الفيروس المعدى . وفى حالة عدم الاستجابة للعلاج الدوائى فإنه يمكن اللجوء للجراحة لاستئصال الثؤلول .

العدوى بالفيروس الكبدي

س - كيف تنتقل العدوى بالالتهاب الكبدي B من خلال الاتصال الجنسي ؟

إن الفيروس B يفرز في مختلف سوائل الجسم بما في ذلك الإفرازات المهبلية ومن خلال هذه الإفرازات التي تزيد كميتها مع الممارسة الجنسية يمكن

أن تنتقل العدوى للطرف الآخر .

كما تنتقل العدوى بالفيروس B عن طريق الدم واستعمال الماخن المشتركة واستخدام أدوات الغير مثل أمواس الخلاقة . وهذا الفيروس لا يهاجم الجهاز التناسلي للمصاب لكنه في حوالي ٥٠ % من الحالات يؤدي إلى التهاب حاد بالكبد بعد مرور حوالي علة أسبوعين أو ربما علة شهور منذ دخول الفيروس الجسم . وأعراض هذا الالتهاب قد تكون شبيهة بنزلات البرد حيث يعاني المصاب من ارتفاع بدرجة الحرارة ، وتعب عام ، وأوجاع بالعضلات والمفاصل ، وقد تظهر عليه الإصابة بالصفراء .

أما في حوالي ١٠ % من المصابين فقد تأخذ العدوى شكلاً مزمناً ولا تظهر أعراض واضحة بينما يكون المصاب قادرًا على نقل العدوى لآخرين ولذا يسمى بحامل المرض .

وحتى الآن لا يوجد علاج قاتل للفيروس B ولذا فإنه يعتبر مرضًا خطيرًا يهدى صحة الكبد وقد يؤدي للإصابة بالتليف الكبدي أو سرطان الكبد . ولكن يوجد تطعيم يحمى من العدوى بهذا الفيروس ويجب أن يقدم على تعاطيه الأشخاص المعرضون للإصابة مثل الجراحين والمرضات .

أعراض الإيدز

س - وما هي الأعراض التي تشير إلى حدوث إصابة بالإيدز بسبب الاتصال الجنسي المحرم ؟

ج - هناك حالتان يجب التفرقة بينهما وهي العدوى بفيروس نقص المناعة المكتسب (HIV) وهي حالة تحدث فيها الإصابة بفيروس الإيدز دون وجود أعراض واضحة .. والإصابة بمرض الإيدز .

ففي الحالة الأولى (HIV) يهاجم الفيروس كرات الدم البيضاء ويتکاثر بها خلال فترة تتراوح ما بين ٣ أسابيع إلى ٣ شهور منذ التقاط العدوى ومع

حدوث ذلك قد يعاني المريض من أعراض بسيطة مثل ارتفاع درجة الحرارة ، والصداع ، والتعب العام ، وتوتر الغدد الليمفاوية ثم تزول هذه الأعراض بعد مدة قصيرة ويصير المصاب حالياً من أي متاعب ويتمتع بصحة جيدة لكنه يمثل مصدراً للعدوى (حامل للمرض) .

ويتأكد تشخيص وجود عدوى بالفيروس (HIV) من خلال فحص الدم حيث تتكون أجسام مضادة عميزة ضد الفيروس ، وهذه تظهر عادة بعد مدة ٣ شهور منذ التقاط العدوى .

وهذا المصاب يمكن أن يتحول على مدى عدة سنوات تتراوح من ٨ - ١٠ سنوات إلى مريض بالإيدز ، أي يكتسب أعراض الإصابة الواضحة بفيروس نقص المناعة المكتسب (HIV) وعندها يبدأ حدوث ذلك التحول فإنه يمر عادة بمرحلة تظهر فيها أمراض عميزة (AIDS - related complex) مثل فقدان الوزن ، والإسهال ، وزيادة عرق الجسم أثناء الليل ، وتوتر الغدد الليمفاوية ، وعندها يتحول المصاب إلى مريض بالإيدز فإن مناعة جسمه تتدحرج تدريجياً وهذا يجعله هدفاً للعدوى بجراثيم ومتغيرات مختلفة يعيش بعضها على الجسم بصورة طبيعية مثل الفطريات (المونيليا) ، والهربس .. كما يتعرض للإصابة بمضاعفات خطيرة مثل مرض الدرن الرئوي ، ونوع عميزة من سرطان الجلد (Kaposi's sarcoma) ونوع خطير من الالتهاب الرئوي (Pneumocystis carinii) . وتبعاً لذلك فإن حياة مريض الإيدز تكون قصيرة ويتعرض للموت على مدى بضع سنوات .

وحتى الآن لا يوجد علاج شاف لمرض الإيدز .. وكل ما تستطيع عمله العقاقير الحديثة الحد من تكاثر الفيروس مما يطيل من عمر المريض بضع سنوات !!

كما تساعد بعض العقاقير المضادة للفيروسات في إطالة المدة التي يتحول خلالها المصاب بفيروس نقص المناعة إلى مريض بالإيدز .

مufen التقبيل !

بالإضافة لقائمة الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي المحرّم (STD) فإن هناك أمراضًا أخرى يمكن أن تنتقل من طرف لأخر من خلال التقبيل ، ومن أبرزها مرض الحمى الغددية (Glandular fever = infectious mononucleosis) والذى يسمى كذلك بمرض التقبيل (Kissing disease).

يحدث هذا المرض بسبب العدوى بنوع معين من الفيروسات ، لوحظ أن هذا الفيروس المعدي يوجد في لعاب بعض المرضى ، وبالتالي يمكن أن يتنتقل من شخص مريض لأخر سليم من خلال التقبيل . كما وجد أن نسبة كبيرة من الناس في بعض المجتمعات الغربية مثل المملكة المتحدة تحمل هذا الفيروس دون ظهور أعراض مرضية لكنهم رغم ذلك قادرون على نقل العدوى للآخرين .

ولكن ما هي أعراض الإصابة بهذه العدوى أو بمرض التقبيل ؟

تكون أعراض الإصابة مشابهة لأعراض نزلات البرد ، ولكن يميزها حدوث تورّم بالغدد الليمفاوية في مناطق متفرقة ولذا يسمى المرض كذلك بالحمى الغددية .

فتظهر أعراض الإصابة في صورة :

- ارتفاع في درجة حرارة الجسم .
- تعب عام وتكسير بالجسم .
- صداع .

- ثم يلي ذلك حدوث تورّم بالغدد الليمفاوية بالرقبة ، والإبطين ، وأعلى الفخذين وتصبح مؤللة عند اللمس .

ويكون تأكيد تشخيص هذا المرض من خلال عمل اختبار للدم للكشف عن أجسام مضادة ضد الفيروس المعدي .

ولا تعتبر هذه العدوى من الأمراض الخطيرة ، حيث إن هذه الأعراض والمتاعب تختفى تدريجيا مع الالتزام بالراحة والتغذية السليمة .. ولا يجيئ تقديم المضادات الحيوية في هذه الحالة ؛ لأن الفيروسات عموما لا تتأثر بالمضادات الحيوية .

وعادة تحدث الحمى الغلدية في صورة نوبات ؛ حيث يتعرض المريض مرة أخرى لظهور الأعراض السابقة ويساعد الإجهاد الشديد على إعاقة حدوث العدوى (relapse) . وعادة يستمر تكرار نوبات العدوى لبضعة شهور .

ومن أبرز مضاعفات هذا المرض تأثيره على الكبد حيث يؤدى الفيروس المعدى إلى التهاب كبدى (Hepatitis) مصحوب بصفراء ، ولكن عادة ما يزول هذا التهاب تدريجيا ، وتعود وظائف الكبد لحالتها الطبيعية خلال عدة شهور.

ومن الطريف أنه وجد من الإحصائيات فى المملكة المتحدة حول هذا المرض أن أغلب المصابين به من المراهقين والشباب بسبب انتشار الميل للتقبيل بين الجنسين خلال هذه المرحلة العمرية .

وقد وجد كذلك أن المصاب بفيروس هذا المرض ، سواء فى حالة ظهور أعراض عليه أو فى حالة خلوه من الأعراض ، يظل مصدر عدوى للآخرين بصورة دائمة حيث إن الفيروس عادة ما يظهر بشكل متكرر فى لعابه ثم يختفى مرة أخرى ، ثم يتكرر ظهوره ويستمر ذلك طوال فترة حياة المصاب .

حفظنا الله وإياكم ، ورعانا ورعاكم !

المراجع

٨ المراجع الأجنبية :

- ❖ MEN'S HEALTH , Dr. STEVE CARROLL
- ❖ PRIVATE PARTS , YOSH TAGUCHI
- ❖ VENEREAL DISEASES , ABROSE KING , CLAUDE NICOL AND PHILIP RODIN .
- ❖ PROSTATE , SANDRA SALMANS .

٩ المراجع العربية :

- النشرات والأبحاث العلمية .
- متعاب الرجل السرية مع البروستاتا د/أمين الحسيني
- سرى وعاجل للرجل فقط د/أمين الحسيني
- شهر عسل بلا خجل د/أمين الحسيني
- تحفة العروس ونزهة النفوس لعبد الله التيجانى
- تحقيق: محمد إبراهيم الدسوقي

الفهرس

٣		مقدمة
٥	صحتك قبل الزواج : كيف ترفع كفافتك الصحية والبدنية ؟	
١٠	صحتك في غذائك فاعرف ماذا تأكل ؟	
١٧	أغذية تخدم صحتك الجنسية والإنجابية	
٣٠	الزواج يحتاج إلى قوة ولياقة بدنية فاستعد من الآن	
٣٩	كيف تحافظ على خصوبتك وتزيد من فرص الإنجاب ؟	
٥١	تفهم أسباب المشكلات الجنسية وطرق علاجها	
٥٣	مشكلات جنسية شائعة	
٥٧	مشكلة القذف السريع	
٥٨	مشكلة القذف المتأخر	
٦٣	هل لديك مشكلة بجهازك التناسلي .. لكل مشكلة علاج	
٧٠	مشاكل القضيب الذكري	
٧٥	مشاكل الخصية	
٨١	مشاكل البروستاتا	
٨٧	١١ نصيحة لمواجهة ليلة الدخلة ونجاح المعاشرة بين الزوجين	
٩٩	احترس من : أخطار الانحلال الجنسي	
١٠١	قائمة الأمراض الجنسية	
١١١	المراجع	

هذا الكتاب

الزواج مسئولية و مهمة كبيرة ، ينبغي أن يكون الإنسان مستعداً لها نفسياً و بدنياً و ذهنياً ، و بدون هذا الاستعداد يكون الفشل والمشكلات . و كم من شاب كان ضحية لشخص قد زوده بمعلومات خاطئة كانت نتائجها وخيمة عليه وعلى شريكة حياته .

إن كل شاب يجب أن يستوثق من مصدر المعلومات التي يجمعها عن الزواج وما يلزمها من استعدادات بدنية ونفسية .

ويسرنا أن نقدم هذا الكتاب إلى كل من يبحث عن المعلومة الصادقة المختصرة التي تأخذ بيده إلى بر الأمان بإذن الله تعالى .

إنه جولة سريعة مركزة عن كل ما يتعلق بالزواج :

الاستعداد البدنى والنفسي ، أهم الأغذية المقوية للعملية الجنسية ، تركيب الجهاز التناسلى الذكرى وما قد يصيبه من أمراض وكيفية علاجها ، نصائح لمواجهة ليلة الدخلة ونجاح المعاشرة الزوجية بين الزوجين ، أهم المشكلات الجنسية الشائعة وحلولها ، وغير ذلك من الأمور التي تهم كل شاب مقبل على الزواج . ونرجو أن تكون ثمرة هذا الكتاب هو زواج ناجح ترفرف عليه رايات الحب والمودة والرضا ، ويثرم الذرية الصالحة بإراده الله تعالى .