

أسرار المرأة وحياتها الخاصة الصحية والنفسية

عكاشة عبدالمعنان



للسيدات



سري وعاجل





أسرار المرأة

١٩١

وحياتها الخاصة

تأليف
عكاشه عبد المنان الطيبی



دار الإسراء للنشر والتوزيع

عمان / الأردن

حقوق الطبع والتحقيق محفوظة لدار الإسراء للنشر والتوزيع

الطبعة الأولى ٢٠٠٥

رقم التصنيف : 216.9342

المؤلف ومن هو في حكمه : عكاشة عبد المنان الطبي

عنوان المصنف : أسرار المرأة وحياتها الخاصة .

الموضوع الرئيسي : 1. الإسلام والطب .

2. التأمين الصحي .

رقم الإيداع : (1994 / 6 / 490) .

بيانات النشر : عمان : دار الإسراء

* تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية .



دار الإسراء للنشر والتوزيع

عمان / الأردن

جبل عمان ، ت: ٤٦١٤٥٩١

العبدلي ، ت: ٤٦٢٠٧١١

من بـ: ١٨٢٤٤١

Email: Esraa_Jordan@Hotmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

للصحة علاقة وطيدة وصلة ظاهرة بالدين في الإسلام ولقد جمع القرآن الكريم من الحكم والآيات البينات ما يدهش اللب ويغير العقل فبينما بتحدث إليك من عجائب السماوات وبلفت نظرك إلى ما أبدعه الله عن المخلوقات فإذا به يستدرحك للبحث في مسائل طبية ويتنفل بك في العلوم الصحية في بينما نرى أن المتقدمين كانوا يمررون على كثير مما جاء في هذا عن هذه المكتونات ، ويرفع النقاب عن هذه المعجزات التي هي أسس قام عليها علم الصحة في الطب الحديث .

ولو علمنا أن فضل الطب الحديث قائم اليوم على المحافظة على الصحة العامة ودرء الأمراض عن الجماعات ومنع انتشار الأوبئة بين أفراد الأمة بتأمين المرضى شر الإصابة بالزلات لأدركنا الحكمة في تشدد الشريعة الحنيف في تعظيم قوانين الطهارة بفرض الاغتسال والوضوء لصحة العبادات فضلاً عما يعود ذلك على الجسم من فوائد صحية إذ أن التعرض للبرد تدرجياً باستعمال الماء البارد يمنع الإصابة بالزلات الوافية ويقي الإنسان من الإصابة بالزكام ومن التهاب اللوز وتعد اللوز بمثابة الحصون الأمامية لجسم الإنسان حيث يتكون منها سلسلة المخصوص الأولى من هيئة الدفاع عن الجسم ومنها تتسرب الإصابات المختلفة فقد ثبت من أدق الأبحاث الطبية أن التهاب الرائدة الدودية يرجع إلى التهاب اللوز .

كذلك الالتهاب الكلوي الحاد والتهاب الغشاء المبطن للقلب والإصابة بالرورماتيزم حتى صرّح أحد كبار المؤلفين الألمان في الأمراض الباطنية أننا إذا أردنا أن نقلل من انتشار أمراض القلب فلنعمل على تجنب الإصابة بالتهاب اللوز ولنعطي أمراضها كل عناء ودقة بقطعها عند الصغار من الأطفال وترويض الكبار وتعويذهم تدريجياً على تحمل البرد وتغيرات الطقس حتى لا يصيبهم من ذلك أذى ولا ضرر .

ولذلك شاعت الرياضة البدنية بين الشباب وترى عادة الاغتسال في الصباح
بالماء البارد شائعة بين الشباب في أوروبا

ولا نريد أن نطيل في هذه المقدمة لأن كتابنا هذا يختص بالجنس اللطيف وقد
بسطنا فيه كل ما يهم المرأة في حيالها الجنسية والصحية .

أرجو أن أكون قد وفقت بما قدمت والله أسأل أن ينفع به .

عكا شة عبد المنا ن الطيب

فحص العروس قبل الزواج

إن امتناع العروس عن الخضوع للكشف الطبي ورفض التعرى أمام الطبيب هي ظاهرة طبيعية في بلادنا وتعكس حالة الخوف والقلق والكبت التي تعيشها الفتاة في فترة المراهقة .

والأطباء الأخصائيون بأمراض النساء غالباً ما يصادفون مثل هذا الموقف من مما يضطربون أحياناً لاستخدام كافة الوسائل الطبية والنفسية من أجل كسب ثقة الفتاة وإقناعها بقبول الفحص الذي يكون إجراؤه أحياناً ضرورياً للغاية كدراسة حالة عقم أو وضع غشاء البكارة أو كشف أمراض تناسلية وأورام باطنية الخ .

كثيرات من الفتيات يعرفن بعض المعلومات الجنسية والصحية ولكن أغلب هذه المعلومات والصحية ولكن أغلب هذه المعلومات غالباً ما تكون مغلوطة ولذلك تذهب الفتاة كل ما لها علاقة بالجنس وبأعضائها التناسلية .

وقد يلحأ الطبيب إلى فحص طبيعة أعضائها الجنسية التناسلية الداخلية عن طريق إدخال أصبع يده اليمني في الشرج ليلمس هذه الأعضاء وتحديد مكانها وحجمها من خلال المضي المستقيم وبمساعدة اليد اليمنى التي تضغط على البطن من فوق .

كما أنه من المهم أن تعرف هذه الفتاة إذا كانت غددتها الجنسية تفرز هرمونات أنوثوية كافية أم لا ؟

من المختل عادة وبحضور الأم والممرضة أن تلين الفتاة أو العروس وتقبل بالأمر الواقع فتتوجه إلى الممرضة لتعبر عن استعدادها لمباشرة خلع ملابسها من أجل إجراء الفحص ولكن إذا قاومت هذه الفتاة وامتنعت عن الخضوع بالرغم من كل شيء أقترح عند ذلك تأجيل الكشف الطبي إلى حين استعدادها لذلك .

ومن لحظة أخيرة أود الإشارة إليها وهي وجوب الامتناع عن توجيه الكلمات النافية والعبارات المشينة التي تسيء إلى الفتاة من قبل الطبيب أو الممرضة أو الأهل لأن ذلك يزيد في تعقيد المسألة ولا يساعد على حل الأمور .

العقم . . . مشكلة لها حل

إذا تعمقنا قليلاً في الصعاب التي يقابلها الحيوان المنوي للزوج حتى يمكنه الالتفاء ببوسطة الزوجة وتلقيحها فتعجب كثيراً كيف تحدث هذه العملية المعقدة المعروفة باسم الحمل .

فعند الجماع يقذف الزوج بالسائل المنوي في الجزء العلوي من المهبل وترسخ الحيوانات المنوية الموجودة في السائل المنوي بالسباحة باجتهاد حتى تستطيع مقابلة البوسطة في البهون ليتم اتحادهما وتكون البوسطة الملقة التي سرعان ما تنقسم إلى ملايين الخلايا التي تكون جنين المستقبل .

ولكن خلال رحلة الحيوانات المنوية من المهبل إلى البوسطة يقابلها الكثير الكثير من العقبات تؤدي إلى هلاك الملايين من الحيوانات المنوية وينجح القليل منها فقط في الوصول إلى قناة فالوب .

عند قذف الحيوانات المنوية في المهبل تقابل أولى العقبات وهي حموضة إفرازات المهبل التي تؤدي إلى هلاك الكثير من الحيوانات المنوية ولكن الحيوانات المنوية التي تسنح في السباحة بسرعة لتفادي حموضة المهبل وتصل إلى عنق الرحم تقابل ثانية المشاكل وهي المتوقعة هي فقدان الكثير من الحيوانات المنوية وتعطيل البعض الآخر من رحلة السباحة إلى البوية المشودة .

بعد هذه العقبة تسنح بعض الحيوانات المنوية في الوصول إلى الرحم لتقابل ثالث عقبة فالرحم بالنسبة للحيوانات المنوية بم giof هائل المساحة بدون أي علامات مرور وبدون أي مرشد أو رفيق وعليها أن تسبح في جميع الاتجاهات في محاولة مستمرة للوصول إلى فتحة إحدى قناتي فالوب وهما فتحتان صغيرتان جداً على جانبي الرحم من أعلى .

وبالطبع تموت الكثير الكثير من الحيوانات المنوية دون أن تستطيع الوصول إلى هذه الفتحة الصغيرة لتقابل رابع محطات ال�لاك فعليها أن تسبح بعد كل ذلك بنشاط ضد التيار في القناة لتصل إلى هدفها المشود وهي البوية التي تتحرك في ببطء ودلالة انتظاراً لحيوان مني واحد من الملايين الكثيرة التي قذف بها الزوج في المهبل .

حيوان مني واحد ينجح في أن يجتاز كل العقبات السابقة ليتحد بالبوية ويلقحها ويكونا سوياً البوية الملقحة التي تحمل في طياتها كل أسرار الحياة ل طفل المستقبل .

إذا كان زوجك ضعيف فماذا تفعلين ؟ ؟ ؟

تعتمد السعادة الزوجية على التوافق بين الزوجين والحب والعاطفة والاحترام المتبادل كما تؤثر الناحية الجنسية تأثيراً غير مباشر على الحياة الزوجية وقد يكون التوافق الجنسي بين الزوجين مكملاً للسعادة الزوجية .

وكثيراً ما يتنيب الزوج بعض الضعف الجنسي وقد يثير ذلك الشكوك لدى الزوجة و يؤديها إلى فلائق نفسية سيئة للغاية وقد تقع في خطأ كبير إذا ما أظهرت ذلك لزوجها أو أبدت له أي امتعاض وبذلك تكون قد عقدت الأمور لأنها تكون قد حررت كبراءه

وطعنته في رجولته و يؤدي هذا إلى أن تطول فترة الضعف الجنسي عند الزوج بدلاً من علاجها .

و تؤثر العوامل النفسية تأثيراً مباشراً على الناحية الجنسية مما يسبب الضعف الجنسي العارض عند الرجل فالحياة بمشاكلها الكثيرة تسبب التوتر العصبي الذي ينعكس وبالتالي على الناحية الجنسية وقد يتناول الحبوب المهدئة للأعصاب وإذا ما تمادى في تعاطيها سيبت له الضعف الجنسي الذي يزول بزوال المؤثر .

وإذا كان الزوج سليم الجسم قوي البنية واتباه الضعف الجنسي نتيجة لنقص بعض الهرمونات الذكرية التي تظهر في التحاليل الطبية فعلاجه أيضاً سهل ومبسورة .

وعلى أي حال فيجب على الزوجة ألا تظهر أي استياء من زوجها في مثل هذه الحالات بل على العكس تظهر له الحنان والعطف مما يؤدي إلى أن يعود الزوج إلى حالته الطبيعية بسرعة وهدوء .

ولعلاج الضعف الجنسي عند هؤلاء المهمومين :

يفيد أكل البصل المهروس مع العسل واللوز ويفيد أيضاً أكل الفستق والبندق والمكسرات بشكل عام وأن يشرب مستحلب النعناع أو مستحلب إكليل الجبل أو الميرمية أو الرزتر البري .

ولإعادة الشهوة بعد اليأس :

- ينفع الحمص فيوكل ويشرب من الماء الذي نقع فيه مع بعض العسل "التحل" .
- يعمل مغلي الحبة السوداء بمقدار 200 غم لكل لتر ويشرب مع العسل والثوم المهروس ويستمر على هذا العلاج لمدة أسبوع على الأكثر وبعدها تتحسن النتائج بإذن الله .

أسباب السقوط الرحمي

لعل أكثر ما يزعج آية أنتى سواء كانت سيدة أو شابة أم متقدمة في السن أن تجد نفسها فريسة للقلق والخرج بسبب عرض أشد خصوصياتها التصاقاً خاصة إذا تعددت شكوتها فيما بين آلام في الظهر إلى تعسر في البول أو تدلي ثيء من الفرج خصوصاً

عند وقوفها أو عند الحرق أثر نقل في منطقة العجان ولكن يساعد على سرعة استعادة ثقتها بنفسها أن تجد ضالتها في طبيعة أمراض النساء التي تفهم حالتها بسرعة وتمون عليها مشكلاتها موضحة لها أنها إحدى حالات السقوط الرحمي .

والرحم في وضعه الطبيعي مائل ومتشن للأمام في مكانه في منتصف الفراغ الحوضي بحيث يكون عنق الرحم محاذياً لخط يصل بين الشوكتين الوركيتين يساعد في الاستقرار في وضعه الطبيعي عوامل أهمها : أربطة الحوض وعضلات فرش الحوض والتي تسمى قرار الحوض وأنه ماشل ومتشن للأمام فهذا يجعل اتجاهه عمودياً على المهبل وبذلك يصعب هبوطه عند زيادة في تجويف البطن مثلما يحدث عند الحرق أو السعال .

وبالنسبة لأعراض سقوط الرحم فيمكن ايجازها في شكوى المريضة في أوائل مرضها بثقل في منطقة العجان والإحساس بضعف في هذه المنطقة ومع مرور الوقت تلاحظ

المريضة أن هناك شيئاً يتدلل من الفرج خصوصاً عند الحرق أو الوقوف وقد تشكو من أعراض بولية مثل تكرار البول وعدم استطاعتها استكمال تووها بالكامل دون رد الجدار الأمامي للمهبل بأصبعها لكي تضغط على المثانة وقد تشكو من السلس الضغطي أو عسر البول حيث تشعر بالآلام في الظهر نتيجة امتداد الأربطة بين الرحم وعظام ظهر الحوض أو من إفرازات مهبلية أو عسر في الحيض أو نزف حيض فقد يتزلا الدم بغزارة أو تطول أيامه كل هذه الأعراض مجتمعة أو منفردة تؤكد أن المريضة تعاني من حالة سقوط رحمي وهناك أسباب مباشرة وأسباب تؤهل لسقوط الرحم .

- الأسباب المباشرة : تكون إما زيادة في وزن الرحم كما يحدث عند حدوث

الحمل أو ظهور أورام بالرحم أو نتيجة زيادة الضغط داخل تجويف البطن مثلاً يحدث عند وجود إمساك أو كحة مزمنة .

• أما الأسباب التي تؤهل لسقوط الرحم فأهمها : وجود ضعف في أربطة الرحم وقد يكون هذا الضعف خلقياً وفي هذه الحالة يحدث السقوط الرحمي دون حدوث حمل أو ولادة أو قد يأتي الضعف نتيجة تكرار الولادات أو نتيجة ولادة متعرضة أو عدم توجيه العناية الطبية الصحيحة للسيدة عند وضعها أو للنساء خلال فترة النفاس وقد يظهر السقوط الرحمي بسبب ضمور في أربطة الرحم والعضلات نتيجة الخفاض نسبة هرمونات المبيض أما في الولادات المتعرضة فقد تعرض عضلات فرش الحوض وأنسجته لتمزقات خلال الولادة مما ينشئ حالة سقوط الرحم كما أن 20 % من السيدات يكون وضع الرحم لديهن مائلًا ومتثنياً للخلف وبالتالي يكن أكثر عرضة عن غيرهن للسقوط الرحمي .

ولسقوط الرحم درجات ثلاثة : ففي درجته الأولى يهبط أسفل مكانه الطبيعي عند الحرق ولكنه لا يتندل من الفرج .
أما في درجته الثانية فيتدلى عنق الرحم أو جزء منه من الفرج عند الوقوف أو الحرق

أما في درجته الثالثة فالرحم كله يتندل من الفرج وقد تحدث مضاعفات نتيجة السقوط الرحمي وما يليه من تغيرات تشريحية في المنطقة مثل القرح والالتهابات بعنق الرحم نتيجة الاحتقان والاحتكاك بالملابس وبين فخذلي المريضة كما قد يتعرض عنق الرحم للاستطالة

وعندما تضيق المريضة من وجود بعض الأعراض السابقة وتعرض نفسها على أخصائي أمراض النساء الذي يجري عليها عدة فحوص كاملة بعد الاستماع لمفردات

شكواها بكل دقة فيجري للمربيصة فحصاً عاماً أولاً ثم يليه فحص باطنى يليه الفحص المهبلى التقليدى .

البرود الجنسى عند المرأة

البرود الجنسى قد يكون أولياً أو ثانوياً أو لسبب عضوى .

• البرود الأولى يوجد منذ الصغر سببه نفسى وقد يحتاج إلى علاج طبى نفسى وجنسى .

• أما في البرود الثانوي ف تكون المرأة طبيعية ثم يحدث البرود بعد تكرار الحمل والولادة ويمكن بعث الرغبة الجنسية بإعطائهما خلاصة الحصبة وإلى حد أقل تنجح خلاصة المبيض .

• والسن العاشر من ألم الجماع نتيجة التهابات المهبل أو ضيق فتحته ويعالجه أخصائي أمراض النساء .

والبرود الجنسى يتناولت في الدرجة من انعدام التباهى الجنسي إلى الفشل أحياناً في بلوغ النشوة رغم أن المرأة ترتاح للجنس بصفة عامة !!!!

ويرى الباحثان " ماسترز " و " جونسون " استعمال كلمة " قصور الشهوة " بدلاً من البرود الجنسى بمعنى عدم إحساس المرأة بالنشوة الجنسية في العادة السريرية والعملية الجنسية معاً وفي دراسة " كيترى " في المائة من النساء لم يشعرن مطلقاً بالنشوة الجنسية ، ونسبة أكبر يشعرن بها في مناسبات قليلة .

إصلاح غشاء البكارة ! ! ! ! ! كيف ؟ ؟ ؟ ؟ ؟

غشاء البكارة عبارة عن غشاء رقيق يوجد عند ابتداء فتحة المهبل من الأمام وهذا الغشاء به فتحة تساعد على نزول دم الدورة الشهرية "العادة" وكذلك نزول إفرازات مهبلية عند بلوغ الفتاة ويوجد منه عدة أنواع تسمى باسم شكل هذه الفتحة أو الفتحات فإذا كانت الفتحة في منتصف غشاء البكارة فهو غشاء دائري وإذا كانت الفتحة على شكل الملاط فهو غشاء هلالي وإذا كانت عدة فتحات فهو غشاء غربالي نسبة إلى شكل الغربال .

وفي بعض الأحيان يكون هذا الغشاء سميكاً بحيث تعذر على الزوج في ليلة الزفاف الدخول بزوجته وفي هذه الحالة يلحًا الزوج إلى الطبيب لفض غشاء البكارة جراحياً وفي بعض الأحيان يكون هناك عيب خلقي في الفتاة فلا توجد أي فتحة في غشاء البكارة ويكون المهبل مسدوداً سداً كاملاً عند البلوغ تحس مثل هذه الفتاة بالملعث وباللام في الرحم كلام نزول الدورة الشهرية ولكنها تزول ولا يوجد دم وكل شهر تحس بهذه آلام ولكن الدم يختزن حيث يصعد إلى الرحم مرة أخرى ويخترن به ثم يمر بقناة فالوب إلى تجويف البطن وشهر وراء شهر وسنة وراء سنة يختزن هذا الدم ويصل الرحم إلى حجم البطيخة الصغيرة تعرض مثل هذه الحالة على الطبيب بشكوى أنها بلغت سن البلوغ ولم تزول لها الدورة الشهرية مع وجود ورم في بطنها وعند الكشف على مثل هذه الفتاة نجد أن غشاء البكارة بارز ومسدود ولونه أزرق وقد حجز الدم في المهبل والرحم وبعملية بسيطة وهي عمل شق على شكل الصليب في هذا الغشاء يتخل الدم بكمية كبيرة ومثل هذه العملية لا بد أن تجري في مستشفى ليس حرصاً لخطورة العملية

ولكن حتى لا يشك المحظوظون بها من الأهل والأصدقاء والمعارف في عذريتها ولا بد أن تأخذ شهادة بأنها أجريت لها عملية فتحة بغضance البكارة لتكون سلحاً لها عند الزوج فلا يتهمها زوجها في شرفها .

أما الناحية الأخلاقية أو الدينية فمتروكة لرجال الدين ليقرروا :
هل يجب إجراء مثل هذه العملية لفتاة تقول أنها ترجع وتتوب إلى الله ؟
وهل التستر الطبي عليها لستقيم مع زوجها الذي لا يعلم عن سيرتها الأولى أمر واجب أو مرفوض فهذا مترون ليقرروه لنا رجال الدين وأيضاً رجال القانون .

ختان الإناث

ختان الإناث لم يعد ظاهرة صحية كما يعتقد الكثيرون من الناس بل أصبح انتهاكاً لصغار الإناث فضلاً عن تأثيره السيء على المرأة صحياً ونفسياً .

إن عملية ختان الإناث في اللغة يطلق عليها خفاض والخلفاض يمارس بصورة واسعة في أفريقيا وأندونيسيا وมาيلزيا والخليج الفارسي وباكستان وروسيا وأمريكا الجنوبية في بيرو والبرازيل والجزء الشرقي في المكسيك واستراليا وتوجد أنواع مختلفة من الخفاض تمارس في السودان وتختلف باختلاف الأجزاء التي تزال .

أنواع الخفاض :

1. الخفاض الفرعوني : ويسمى في مصر الخفاض السوداني وهو أخطر أنواع الخفاض وأ بشعها يؤدي إلى كل المضاعفات التي تنتج عن هذه العملية وفيه تتم غزالة البظر بأكمله والشفرتين الصغيرتين والكبريتين ويتم خياطة المتبقى لترك فتحة صغيرة في الجزء الأسفل من بحو الفرج منها لترور البول ودم

- الطمث ويتم خلاها الجماع بعد الزواج .
2. النوع المتوسط : وتم إزالة الحشفة وجزء من البظر والجزء الأمامي من الشرفين الصغيرين وتم خياطتها وينقسم هذا النوع إلى قسمين :
- القسم الأول : تستأصل فيه قلفة البظر فقط .
 - القسم الثاني : يستأصل فيه البظر استئصالاً كاملاً .

المضاعفات الفورية :

1. التريف .
2. الألم الشديد .
3. احتباس البول .
4. الإنتهاك البدني .
5. الصدمة العصبية .
6. الالتهابات .

المضاعفات الآجلة :

1. مضاعفات جسدية .
2. البرود الجنسي .

مرض سري قد يصيب المرأة

السيلان مرض يصيب الجهاز التناسلي أساساً ويتنتقل عن طريق المقابلة مع رجل مصاب به وهذا فإنه يعتبر من الأمراض التناسلية .

ومن الممكن أيضاً أن يتنتقل المرض عن طريق التلامس مع أشياء ملوثة

بالميكروبات فإنه يستحسن تجنب استعمال فوط التنشيف أو دورات المياه ما لم يكن هناك دليل على نظافتها .

وتبدأ أعراض المرض بعد المقابلة بعدها تتراوح من ثلاثة إلى سبعة أيام وتشعر السيدة بحرقان مصاحب لتحول البول وإفرازات من المهبل في لون الصديد وقد يصاحبها ألم شديد في منطقة المهبل .

وفي بعض الحالات السنادرة وخصوصاً إذا حدث تلامس بين الأيدي الملوثة والعينين يحدث التهاب في العين الداخلية ولكن هذا في العادة قليل الحدوث وهو في الغالب دليل على أن الحالة متقدمة جداً .

الوصايا العشر للمرأة الحامل

على الرغم أن للحمل متاعب قد تعاني منها المرأة إلا أنه توجيه لأنوثتها ومنتها آمالها في الحياة أن تصبح أماً وما أسعده من أيام تعيشها في انتظار وترقب مولودها الجديد ومع هذا فقد يحدث ولا قدر الله ما يعكر الصفو بسبب أحطاء تقع فيها الأم أو تعرض لها مما يضر بها أو بجنينها .

ولكي تمر هذه الشهور التسعة بسلام وخير نقدم عشرة وصايا لكل حامل نلتزم بها وحى تكتمل سعادتها :

1. تجنب القلق والتوتر .
2. الابتعاد عن الأدوية بمختلف أشكالها وأنواعها .
3. الحرث على التمتع بساعات نوم كافية وفترات من الراحة والاسترخاء .

4. ممارسة الرياضة بانتظام .
5. الابتعاد عن الضوضاء .
6. تناول الغذاء التكامل العناصر .
7. ارتداء الملابس الواسعة .
8. الابتعاد عن مصادر التلوث .
9. لا مانع من ممارسة العلاقة الزوجية .
10. المتابعة مع الطبيب .

إِذْرِيَ الْحَمْل قَبْلَ سِنِ الْعَشَرِينَ ! ! !

تدل الاحصائيات أن الحمل بين سن العشرين والخامسة والثلاثين يكون أقل ضرراً على الأم وعلى الطفل وبالتالي فالحمل في المراهقات واللاتي تقل أعمارهن عن عشرين سنة يكون أكثر خطورة خاصة في الدول النامية التي تمثل ولادات من هن دون العشرين حوالي 10% من مجموع الولادات.

والحمل دون العشرين له خصائص معينة يتميز بها معظم الأمهات غير المتعلمات أو لم يبنلن قسطاً بسيطاً من التعليم كما أن الغالبية العظمى منها يستعملن وسيلة لمنع الحمل لكن الملاحظ أن هؤلاء الأمهات يتقبلن فكرة تنظيم النسل بعد الولادة مباشرة ولهذا فإن الاهتمام بشورح الطرق المختلفة وتعريفهن بما بعد الولادة له عائد كبير كما أن معظم المؤمنات دون العشرين لا يهتممن بالرعاية الطبية أثناء الحمل ولا يزرن المراكز الطبية المختلفة للكشف أو العلاج ونتيجة هذا هو كثرة الأمراض التي تصاحب الحمل خاصة فقر الدم وتسممات الحمل أي ارتفاع ضغط الدم والتهابات الكلي

كذلك فإن متوسط مدة الحمل في هذه السن تكون قصيرة أي هناك احتمالاً أكثر للولادة المبكرة .

كما أكدت جميع الدراسات وجود علاقة بين عمر الأم والمخاطر التي تعرّض لها الأم ويعرض لها الطفل خلال الحمل والولادة وبينت هذه الدراسات أن أقل المخاطر تحدث خلال مرحلة معينة من العمر تزداد وفيات الأطفال وإصاباتهم قبل وبعد هذه الفترة كما يزداد احتمال إصابة المواليد بتشوهات خلقية مع تقدم العمر .

والسؤال الآن ماذا عن عملية الولادة في هذه السن ؟؟؟

الحقيقة أن الولادة تكون أصعب من حيث طول مدتها مثل التريف قبلها وبعدها وتعسرها وعدم انتظام انقباضات الرحم أثناءها وبذلك تكثر الولادة بالعملية القصيرة

أما عن الأطفال فنجد أن متوسط وزن الأطفال للأمهات دون العشرين أقل بعد هذه السن وبالتالي فإن المشاكل التي تعرّضهم أثناء وبعد الولادة تكون أكثر ومثال ذلك صعوبة التنفس والإصابة بالاسфикبيا أو الاختناق ونتيجة هذا هو زيادة احتمال وفاة الأطفال في هذه المجموعة .

من هنا تبين أن الحمل قبل سن العشرين وبعد سن الخامسة والثلاثين قد تصاحبه مشاكل عضوية ونفسية يجب أن تعرفها كل سيدة حتى تستطيع أن تخطط لحدوث حملها في أنساب وقت ومن الناحية العضوية النفسية .

ومشاكل الحمل قبل العشرين متعددة :

1. زيادة نسبة الإجهاض عن المعدل الطبيعي .
2. تزيد نسبة الأنيميا أثناء الحمل في هؤلاء النساء .
3. تتعرض الحامل الصغيرة إلى احتمال زيادة نسبة حدوث تسممات الحمل التي

- يصاحبها ارتفاع في ضغط الدم مع زلال في البول وتورم في الساقين .
4. يزيد احتمال الولادة المبكرة قبل نهاية الشهر التاسع .
 5. نسبة وفيات المواليد في هذه الحالات أعلى من المعدل وعادة يكون أقل من المعدل

6 . الرضاعة في الأمهات الصغيرات تكون أقل من الطبيعي لضعف الأم ولقلة خبرتها

الحمل خارج الرحم

هو ظاهرة مرضية تحدث بنسبة واحد لكل خمسمائة حالة حمل وأكثر من 95% منها يستمر الحمل في قنوات الرحم المسماة بقنوات فالوب كما أن الحمل خارج الرحم قد يكون على سطح المبيض أو في تجويف البطن حيث يتتصق الجنين بالمساريات أو الأمعاء ليحصل منها على التغذية الكافية كما قد يكون الحمل خارج الرحم في بعض التشوهات الرحيمية مثل الرحم ذي القرنين حيث يكون أحد قرن الرحم في حالة ضمور وإذا حدث حمل فلن يستطيع الاستمرار أكثر من شهور قليلة .

والمقصود بكلمة خارج الرحم أن البوسيدة بعد إخصابها بالحيوان المنوي تستكمل نموها خارج تجويف الرحم أي بعيداً عن الوضع الطبيعي لنمو البوسيدة ثم تكوين العلقة فالملاطفة فالجنين فالمشيمة .

ومن أهم مسببات الحمل خارج الرحم وجود التصاقات حول قنوات الرحم مما يؤدي إلى حدوث ضيق في تجويف القنوات ومن المعلوم أن الحيوان المنوي يخ慈悲 البوسيدة في الثالث الخارجي لقناة الرحم وبعد الإخصاب تنقسم البوسيدة إلى عدة خلايا وبواسطة الحركة الانقباضية لقناة الرحم يتم دفع البوسيدة المخصبة إلى تجويف الرحم

حيث تلتصق بجداره ويستكمل الحمل نمه وإذا كان التجويف الداخلي لقناة الرحم لا يزيد قطره عن مليمتر واحد فمن المعروف أن البوياضة بعد إخصابها وانقسامها قد يصل قطرها إلى ما يقرب من ثلاثة أرباع مليمتر .

ومن هنا يمكن تفسير عدم مرور البوياضة المخصبة من التجويف القناة إلى تجويف الرحم في حالة ضيق القناة ل تستكمل البوياضة نمهها إلى أن قناة الرحم لا تستطيع استيعاب

البوياضة المخصبة أكثر من عدة أيام للحمل حيث تبدأ بعدها المشاكل الطبية وقد يتضمن الأمر بالحمل في قناة فالوب بالأمور التالية :

1. انفجار القناة نتيجة تضخمها مما يؤدي إلى نزيف داخلي حاد .
2. قد تؤذن قناة الرحم الحمل من خلال فتحتها في الغشاء البريتوني إلى تجويف البطن مع حدوث نزف داخلي .
3. بعد قذف الحمل في قناة الرحم إلى تجويف البطن قد يتلخص الجنين بالأمعاء أو عسنديل البطن أو بالمسارтиأ ويستألف الحمل نمه داخل تجويف البطن إلا أن معظم الحالات لا تستكمل بعد الشهر الثامن .

وأحب أن ألفت النظر إلى أن علاج الحمل خارج الرحم باستئصال القناة التي فيها الحمل دون أي مساس بالمبيض أو بالرحم وهذا يعطي فرصة للمربيضة للحمل مستقبلاً من خلال القناة الأخرى .

ولقد ساعدت وسائل التشخيص الحديثة مثل استخدام المنظار البطن أو استخدام الموجات فوق الصوتية في تشخيص حالات الحمل خارج الرحم التي يصعب تشخيصها أكينيكيًا .

وخلال هذه القول أن الحمل خارج الرحم هو حالة مرضية يسهل تشخيصها في الحالات الحادة مثل التهيف الداخلي في البطن ويصعب تشخيصها إذا أزمنت واحتللت بأمراض أخرى ومن هنا إذا لم يكن حراخ أمراض النساء واضعاً في تفكيره هذا الاحتمال قد لا يستطيع التقاط مثل هذه الحالات وتشخيصها في الوقت المناسب

ما هي علامات الخطر أثناء الحمل ؟؟؟؟؟

بعض المؤشرات يشعرن بالغثيان أو القيء في الصباحخصوصاً في الفترة الأولى للحمل ولكن هذه الحالة في الغالب لا تؤثر على حالة الحامل الصحية وسرعان ما تتغلب عليها باتباع النصائح أو بتناول بعض الأدوية المهدئة وبعض الفيتامينات مثل فيتامين ب مع تناول أكلات صغيرة متعددة .

ويظهر صداع شديد مستمر أو ورم بالوجه والرجلين مع زغفلة وصعوبة في النشر مع قلة كمية البول وظهور زلال وفي هذه الحالة يجب إبلاغ الطبيب فوراً لأن هذه هي علامات تسمم الحمل ومعناها أن المريضة في حالة الخطورة ولو كانت تحت الإشراف الطبي لما وصلت إلى هذه الدرجة .

التهيف الرحمي : وهو من الأمراض الخطيرة التي يجب أن يبلغ عنها الطبيب فوراً وقد يحدث في أي فترة من فترات الحمل وقد يكون بسيطاً يمكن علاجه ويستمر الحمل بدون أن يسبب مضاعفات وقد يكون شديداً مما يتطلب إجراء جراحة عاجلة وأسباب التهيف أثناء الحمل كثيرة ومتعددة .

لذلك يجب على كل حامل أن تكون تحت الإشراف الطبي الدوري طوال فترة الحمل يجب أن تبلغ فوراً عند ملاحظة أي تغير في حالتها أو أي أعراض مما سبق شرحها في هذا المقال طبيتها المعالج أو أي مسيشفى قريب حتى تتم هذه الفترة بسلام وتنتهي إلى النهاية السعيدة المنتظرة من جميع أفراد الأسرة .

كيف تتجنبين النزيف في الشهور الأخيرة من الحمل ؟؟؟؟؟

هو أخطر مضاعفات الحمل التي قد تحدث في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل " الشهر السابع أو الثامن أو التاسع " وفي حالة حدوثه فإن هناك خطوات معينة يجب أن تتبعها السيدة الحامل حتى تتجنب خطورته وسبباً أولاً بشرح أسبابه ومظاهره ثم كيفية التصرف في حالة حدوثه .

قد يحدث التريف من داخل الرحم وهذا يشكل معظم الحالات حوالي خمسة وتسعين وقد يحدث التريف أيضاً من المهبل أو عنق الرحم وهذا النوع يشكل نسبة قليلة من الحالات .

فأما النوع الأول فإنه يتبع بسبب انفصال المشيمة " الخلاص " المبكر عن جدار الرحم وحيث هذا المكان مليء بالأوعية الدموية فإن انفصال المشيمة هذا يجرح الأوعية ويترتب عنه التريف وهناك نوعان من التريف :

- الأول : عندما تكون المشيمة في مكانها الطبيعي داخل الرحم وفي هذه الحالة فإن ما يؤدي إلى انفصال المشيمة يتركز في زيادة ضغط الدم أثناء الحمل وحالات تسمم الحمل وحوادث الورق على البطن أو من مكان

مرتفع وفي بعض الحالات قد لا يكون هناك سبب ظاهر .
والتريف في هذه الحالات يكون فجائيًا مصحوباً بألم شديدة في البطن وحسب
شدة التريف ولا لامه تكون حالة الجنين ومدى تأثيره بذلك .

وعموماً فإن آلام البطن تكون نتيجة حدوث نزيف داخل الرحم ولذلك

لا تعتمد في تشخيص هذه الحالات على كمية التريف الظاهرة وحدتها ويضطر
الطبيب أمام هذه الحالات إلى إثناء الحمل سواء بطريق الطلق الصناعي أو بعملية
جراحية حفاظاً على حياة الأم نفسها .

• أما النوع الثاني من التريف : فهو عندما تكون المشيمة " المخلص " في الجزء
الأسفل من الرحم المكان الطبيعي في الجزء العلوي ففي هذه الحالة يكون
التريف نتيجة تمدد الجزء الأسفل من الرحم لازدياد حجم الجنين ولا تصاحبه
آلام .

والعلاج هنا يعتمد على كمية التريف فقد تستدعي الحالة إثناء الحمل فوراً أو قد
توضع المريضة تحت الإشراف الطبي حتى ينمو الجنين للدرجة التي تجعله قادرًا على
الحياة خارج الرحم .

وفي بعض الحالات قد يحدث التريف من خارج الرحم وهو عدئذٍ بعد أخف
أنواع التريف ويسهل علاجه بدون أي مضاعفات تحدث بالنسبة للحمل .

كيف تتصرف السيدة الحامل إذاً حالة النزيف ؟ ؟ ؟ ؟ ؟

إن الإجابة تلخص فيما يلي :

يجب عليها فوراً إبلاغ طبيتها أو أقرب مستشفى ويجب على السيدة الحامل أيضاً أن تكون في متنه الخدر في الشهور الأخيرة من الحمل حيث أن نزول كمية قليلة من الدماء

قد يكون مقدمة لتريف خطير وإبلاغ الطبيب أو الذهاب للمستشفى في هذه الحالة قد يكون السبب في إنقاذ حياة الأم أو الجنين .

ومن الضروري أن تقوم كل حامل خلال شهور الحمل الأخيرة بتحديد فصيلة دمها لأنه في مثل هذه الحالات قد تكون حياة الأم هي ثمن التأخير في عملية نقل الدم

وبعد العلاج وإنفاس عملية الولادة تكون السيدة في حالة إنهاك شديد يوازي كمية الدم التي فقدت منها لذلك فإنها معرضة لأية مضاعفات بعد الولادة مثل التريف أو حمى التنفس من أجل هذا يجب رعايتها بعد الولادة وأن تستمر هذه الرعاية حتى تتحسن صحتها .

لا تقلقي بشأن آلام الولادة

أدوية كثيرة تستعمل لتخفيض آلام الولادة ولكن أيها يصلح وأيها يضر ???
هذا هو السؤال الذي تجبيك عليه بصرامة لكي يكون تخفيض آلام الولادة عن طريق الأدوية سليماً صحيحاً .

في عام 1841 اكتشف سيمون بمدينة دبلن الخواص التخديرية لمادة الكلوروفورم ورغم في استعماله لإزالة آلام الولادة فثار ضده رجال الدين بمحنة أن آلام الولادة إنما وجدت لتعانيها كل أئمّة تنفيذاً للأمر الإلهي القائل لحواء أم البشر بالتعب تلدين أولاداً .

ولكن سيمون حادل في ذلك بأن الله قد ألقى على آدم سباتاً وأخذ منه ضلعاً وخلق منه

حواء كما ورد مفصلاً في سفر التكوين فكانه سبحانه وتعالي قد سمح باستعمال البنج لمقاومة الألم .

وظلت هذه المناقشات بضع سنوات حتى حسم الأمر قرار الملكة فيكتوريا باستعمال الكلوروفورم ليساعدتها على إزالة آلام ولادة ثامن أولادها .

• غير أنه سرعان ما وضحت أضرار الكلوروفورم الجانبي فاستبدل بعقاقير أخرى أكثر أمناً الواقع أن هذه الآلام أو الطلق إنما تمثل المرحلة الأولى من الولادة وخلالها يتم توسيع عنق الرحم بحيث يسمح بمرور الجنين وهي تنشط

تناول القرفة وما شاكلها من مشروبات ساخنة تحمي الطلق كما هو معروف لدى الناس بخبرة الأجيال والقرون .

- المرحلة الثانية وهي مرور الجنين .

- أما المرحلة الثالثة فهي طرد المشيمة "الخلاص" من الرحم .

وقد استعمل المورفين بكمية ضئيلة مع جرعة من المايدمسين لإحداث ما يسمى بنوم الغست حيث يقل الإحساس بألم الولادة إلى درجة كبيرة .

واستعمال المورفين بجرعة عادية محظوظ أثناء الولادة إذ يخترق المشيمة ويصل إلى الجنين حيث يوقف مركز التنفس محدثاً الاختناق .

غير أنه قد تم إيجاد بديل للمورفين يسمى "البيتيرين" لا يمكنه اختراق المشيمة وبالتالي لا يسبب ضرراً للجنين ويمكن استعماله لتخفيض ألم الولادة .

وتميز عضلة الرحم بأن لها أليافاً متعددة الاتجاهات أي طولية وعرضية ومائلة ولهذا

فإنه عندما تنقبض عضلة الرحم يمكن إغلاق الجيوب الدموية بإحكام فائق وبخاصة أماكن التصاق المشيمة بجدار الرحم مما يوقف التزيف بعد الولادة بكفاءة ممتازة .

وأهم الأدوية المستعملة لهذا الغرض مستحضرات الأرجوت وخلاصة الفحص الخلفي للغدة النخامية والدواء الأول من مصدر نباتي أما الثاني فهو من مصدر حيواني

على أن هذه الأدوية لا تعطى إلا بعد التأكد من توسيع عنق الرحم وبلوغه الدرجة المطلوبة من الاتساع ومحظوظ استعمالها قبل ذلك لاحتمال حدوث هتك عضلة الرحم عند انقباضه وعنقه مغلق .

كما يحظر استعمال المسهلات العنيفة أثناء الحمل إذ تسبب احتقاناً في الرحم والمبيض قد يعقبه إجهاض الجنين .

أعراض الولادة الحقيقة

متى تحدث الولادة ؟؟؟؟؟

الولادة تبدأ بعد انقضاء 9 شهور ميلادية وأسبوع على أول يوم لآخر دورة حIGINية ويسهل تحديد هذا التاريخ ولكن الموعد الحقيقي ربما يكون خلال أسبوعين يتوسطهما هذا التاريخ ولذلك يجب عمل الترتيبات الازمة للأسرة وللمولود المنتظر قبل هذا التاريخ بأسبوعين على الأقل .

هل هناك أعراض في الأسابيع الأخيرة للحمل تشبه أعراض الولادة ؟؟؟؟؟
هناك أعراض معينة تحدث في الأسابيع الأربع الأخيرة للحمل قد تتشابه مع
أعراض بدء الولادة وتضطر الحامل إلى الانتقال للمستشفى أو استدعاء طبيبها وهذه
الأعراض :

1. انقباضات رحمية " آلام أو مغص " بأسفل البطن .
2. زيادة الإفرازات المهبلية على هيئة خاطر وذلك لنضع عنق الرحم
وازيد ياد نشاذ الغدد به .
3. انخشار رأس الجنين في الحوض .

ما هي أعراض الولادة الحقيقة ؟؟؟؟؟

1. انقباضات رحمية "ألم - طلق - مغص" في البطن .

2. نزول العلامة .

3. بفحص الحامل في هذا الدور من الولادة يجد أن عنق الرحم يبدأ في التمدد والاتساع مع تكون حبيب الحياة .

ما هي المدة التي تستغرقها الولادة ؟؟؟؟؟

تستغرق الولادة حوالي 14 ساعة في البارثينة ونصف هذه المدة في متكرر الولادة ومعظم الوقت في الدور الأول للولادة الذي يتم خلاله تمدد واتساع عنق الرحم .

ولذا هناك وقت كافٍ باستمرار لاستدعاء الطبيب والانتقال إلى المستشفى معأخذ أزمة المواصلات واحتياقات المرور في الاعتبار .

متى تستدعي الحامل طبيتها لمباشرة الولادة ؟؟؟؟؟

في الحقيقة الوقت المناسب للاتصال بالطبيب هو بعد التأكد من أعراض الولادة الحقيقة أي بعد مراقبة الانقباضات الرحمية لمدة ساعتين والتأكد من ازديادها في الشدة والمدة والتقارب مع نزول العلامة .

في هذه الحالة تبادر الحامل أو أحد أفراد عائلتها بالاتصال بالطبيب وفي حالة عدم تواجده في هذه اللحظة توجه للمستشفى الذي سبق الاتفاق عليه وهناك تكون تحت الرعاية الطبية حتى حضور طبيتها لمناظرها والقيام بإسداء النصائح وعمل اللازم .

الوضع المناسب للولادة :

أثبتت التجارب أن الوضع الطبيعي للمرأة أثناء الولادة هو الوضع الرأسي لا الأفقي فإن هذا يقلل الأخطار التي يتعرض لها الطفل الوليد فلا ينقطع مثلاً تدفق الدم إلى مخه كما أن الخلاص يخرج من تلقاء نفسه في أعقاب خروج الطفل بل ولا تحتاج الأم إلى معونة الطبيب في إخراجه ، كما أنها لا تحتاج إلى إجهاد نفسها في دفع الطفل إلى الخارج .

الولادة قبل الميعاد

الجنين المضطهد :

الحمل له فترة محددة تقدر بستة شهور غير أنه أحياناً لا يستكمل مده فتتم الولادة قبل نهاية الشهر التاسع وتنقسم الولادة قبل الميعاد إلى نوعين :

1. الولادة المبكرة :

وهي التي تحدث تلقائياً دون تحريض قبل الموعود المحدد للوضع وفي هذا المجال يجب أن نعلم أن مدة الحمل هي 40 أسبوعاً أو 280 يوماً إذا أجري الحساب من اليوم الأول لآخر طمث شهري .

إلا أن 40 % فقط من الولادات تتم عند هذا الموعود بينما يحدث الوضع إما قبل هذا الموعد بأسبوعين أو بعده بأسبوعين وتعتبر في هذه الحالة الولادة في موعدها

الصحيح

حيث أن فترة الحمل الطبيعي قد تراوح من 38 إلى 43 أسبوعاً أما إذا بدأت آلام الوضع قبل الأسبوع الـ 38 من فترة الحمل فتعتبر ولادة قبل الميعاد أو ولادة مبكرة ومبنيات الولادة المبكرة كثيرة أهمها :

- أمراض عامة في الأم مثل إصابتها بمرض سكر الدم أو بعض حالات تسممات الحمل أو بعض حالات أمراض القلب المصاحبة للحمل .
- بعض أنواع الحمل مثل الحمل التوأم أو حالات زيادة كمية السائل الأمينوس مع الحمل وهي ما تسمى بالاستسقاء الأمينوسي وفي هذه الحالات ينقط الرحم محتوياته من الحمل بصورة معجلة نظراً لازدياد الضغط الداخلي بالرحم .
- بعض التشوهات الخلقية بالرحم مثل الحواجز الرحمية أو اتساع عضلة عنق الرحم الضابطة للرحم مما يؤدي إلى حدوث ولادة معجلة .
- قد يكون السبب هو اضطراب في عضلات الرحم مما يؤدي إلى انقباضها بصورة معجلة وهذا كثير الحدوث في حالات الاضطراب النفسي أو في بعض الأحوال التي يرتفع فيها مستوى مادة البروستاجلاندين وهي مادة تساعد على انقباض الرحم .

وفي جميع الأحوال السابقة إذا بدأ الرحم في الانقباض وانتظمت الآلام الرحمية تتم الولادة بصورة معجلة إلا أن هناك بعض الوسائل العلاجية التي تساعد في التغلب على ظاهرة الانقباضات الرحمية مما قد يؤدي إلى استمرار الحمل لفترة أطول .
وهذا يعاون على اضطرار نمو الجنين داخل الرحم وهو الأفضل لأن الطفل المبتسر أكثر تعرضاً للمضاعفات من الطفل المكتمل النمو وأهم وسائل العلاج تعتمد على الراحة التامة البدنية والذهنية مع استخدام عقاقير مهدئة للرحم من أهمها عقار

الفالسيام وكذلك استخدام العقاقير المضادة للادة البروستاجلاندين التي قد يكون السبب في الانقباضات

الرحيمية ومن أهمها العقاقير المستخدمة لعلاج أمراض الروماتيزم في السيدات مثل الأسرير والأندوسيد والبروفينيد وغيرها .

التحريض المعجل للولادة

في هذه الحالة يقوم الطبيب بإنهاء الحمل قبل موعده وذلك لأسباب مرضية خوفاً على صحة الأم ومن أهم هذه الأسباب :

- تسممات الحمل خاصة إذا كانت مصحوبة بتشنجات الأكلامبيا وكذلك حالات مرض السكر المصاحب للحمل خوفاً من وفاة الجنين داخل الرحم وأيضاً حالات قصور وظائف الكلى أثناء الحمل خوفاً من حدوث تسمم بوليما .
- كما أن الطبيب قد ينهي الحمل لأسباب تتعلق بصحة الجنين ومن أهم الحالات اختلاط معامل ريزوس مما يؤدي إلى سيولة دم الجنين أو في حالات نقص نمو الجنين نتيجة لقصور وظائف المشيمة .

ولعلَّ الطُّبُرِغَمَ تقدِّمه الشدِيد لا يزال يقف حائراً بين حالات كثيرة تبدأ فيها الولادة تلقائياً قبل موعدها المحدد ودون أسباب معروفة وتفشل وسائل العلاج المختلفة لمعالجة مثل هذه الأحوال ولكنها القدرة الإلهية (وما أُوتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا)

رشاقة دائمية للمرأة بعد الحمل والولادة

إنه مطلب عزيز في حياة كل امرأة أن تحفظ برشاقتها على الدوام وأن تكون مقاييس قوامها بعد الحمل والولادة هي نفس المقاييس قبلها فهل هذا ممكن ؟؟؟

أثناء الحمل :

على السيدة الحامل أن تراعي وزنها باستمرار حتى لا يزيد الوزن وتتنفس السيدة وتصاب بتسنم الحمل الذي يبدأ عادة بزيادة الوزن على المعدل الطبيعي ثم تورم في الساقين

"أوزيما" وارتفاع ضغط الدم ثم زلال في البول وخصوصاً في الشهور الأخيرة ويمكن أن يموت الجنين داخل البطن نتيجة هذه المضاعفات لذلك يعطي الطبيب أكبر الاهتمام لوزنها فطول مدة الحمل يجب أن لا تزيد على 12 كغم بعد أقصى 3 كغم أو 3.5 كغم للجنين + نصف كيلو للمشيمة + كيلو للسائل الأمينوسي للطفل + كيلو لزيادة وزن الرحم .

ومجموع هذا 6 كيلو غرام أما البالغ فزيادة في سوائل الجسم والدهن للسيدة الحامل

وعلى السيدة الحامل أن تلبس الملابس الفضفاضة المناسبة للحمل وأن تقوم بالرياضة البسيطة أو المستمرة أثناء الحمل وخصوصاً رياضة المشي في الشهور الأخيرة وعليها بـ مراعاة الاعتدال في الجنس المسموح به مرة كل أسبوع حتى انتهاء الشهر التاسع .

وبعد ذلك يمكن الاتصال الجنسي حتى الوضع بل وبعد الوضع حتى الأربعين

وذلك حتى يعود الرحم الكبير المتضخم والذي يصل وزنه إلى حوالي

كغم بعد الوضع مباشرة إلى حجمه الطبيعي ووزنه الطبيعي حوالي 3 أوقية
وتعود الأنسجة الرخوة بعد الوضع مباشرة إلى حالتها الطبيعية بعد الستة أسابيع "الأربعين" .

بعد الولادة :

على السيدة أن تعود إلى وزنها قبل الحمل والوضع وألا تسمح لنفسها بأي زيادة على الوزن الطبيعي وهو عبارة عن طولها بالستيمتر ناقص 102 سم أو 10 سم في الرمل ناقص 100 سم أي الطول بالستيمتر ناقص 102 سم وعليها أن تلاحظ أن أي

تماون بعد الولادة في معدل وزنها ستكون النتيجة الترهل وإضافة كغم زيادة على وزنها ويكون من الصعب جداً بعد ذلك التخلص منها .

وعليها بعد الوضع أن تقوم بالتمرينات الرياضية لعضلات البطن والمهبل والعجان لتعود كما كانت قبل الوضع ولا تعتمد على ليس الحزام وبالنسبة للأكل لا تأخذ بالاعتقاد الخاطيء بأن كثرة الأكل تدر اللبن بل أن المنه الأول لإدرار اللبن هو الرضاعة وليس أكل الحلاوة الطحينية أو شرب الحلبة وأكل العسل الأبيض وخلافه .

للمرأة الرشيقه نصائح هامة

راعي عدم الإكثار من السكريات والدهون لأن زيادتها بنسبة كبيرة تؤدي إلى زيادة وزنك وتنعك من تحقيق رغبتك في رشاقة دائمة .

- 1 . لا مانع من تناول كميات من الخضراوات والفاكه إلى جانب اللحوم والبروتينات لأنها تفيدك كثيراً ولا تؤدي إلى زيادة الوزن ، طالما أن هناك بجهوداً يبذل من جانبك .
2. لاحظي دائمًا أن يكون طعامك متوازنًا يحتوي على كل العناصر الضرورية ولا تتناولى كميات كبيرة في كل وجبة حرصاً على رشاقتك ولا تتناولى أي شيء بين الوجبات .
- 3 . يمكنك التعرف على نتيجة الرجيم الذي تسيرين عليه بعد مرور أسبوعين .
- 4 . راعي أهمية العرض على الطبيب في حالة شعورك بأي أعراض مرضية ناجمة عن قيامك بعمل الرجيم الخاص بك وذلك في محاولة للاطمئنان على سلامتك ومنعاً من حدوث أي أعراض مرضية .
- 5 . لا مانع من تناول بعض السوائل والمشروبات بجانب تناولك لوجبات الرجيم .
6. لا خوف من تناول وجبات من الخس والخيار والطماطم والسلطة الخضراء فهي وجبات لا تزيد الوزن .
7. لا خوف من تناول اللحوم ولكن بكميات معقولة وتفضل اللحوم المشوية حرصاً على سلامتك من الدهون وزيادة الوزن .
8. يمكنك القيام بعمل بعض التمارينات الرياضية الماءدة بجانب تنفيذ الرجيم وذلك في محاولة للتخلص من بعض العيوب الموجودة في الجسم .

كيف تكون بنت الأربعين شابة في العشرين ؟؟؟؟؟

اطمئني يا سيدتي ... إنَّ كُلَّ المشاكل التي تؤثر على جمالك ومظهرك وشبابك يمكن أن تخفي للأبد بفضل جراحات التجميل المعروفة بعمليات إرجاع الصبا .

وليس هذا القول من قبيل إراحتك نفسياً ولكنه الواقع العلمي المؤكد ... ففي سن الأربعين وما بعدها يمكن أن تظهرى دون أن يلحظ أحد كما لو كنت فعلاً في سن العشرين وهذا هو الدليل

الشباب هو أولاً شعور نفسي وقد دخلت الجراحة هذا الميدان النفسي لتنبع الشاب هذا الشعور وذلك بإعطائه منظر الشباب الخارجي من خلال عمليات التجميل المعروفة باسم " عمليات إرجاع الصبا " فتحن نستطيع أن نعطيك يا سيدتي إذا أردت وجهاً متألقاً كما لو كنت شابة في العشرين .

ومن المعروف أن جلد الإنسان يتغير مع تقدم السن فأنسجة الجسد وما تحت الجلد يعتريها الضعف والوهن وهذا يظهر على شكل ترهل وكرشة وظهور خطوط غائرة في الوجه والأطراف وبعض أجزاء الجلد والعمليات التي أعنيها هنا هي عمليات شد الجلد المعروفة مثل شد الوجه وشد البطن والأطراف وغيرها .

كيف تحدث الشيخوخة المبكرة

المقصود بالشيخوخة المرحلة الأخيرة من عمر الفرد بعد الطفولة والشباب ومن مظاهرها الضعف الجسماني والهزال والتعرض لأمراض الشيخوخة وعدم القدرة على مقاومة ظروف الطبيعة وتقلباتها من زيادة البرودة وارتفاع الحرارة وكذلك عدم المقدرة على القيام بأعباء الحياة .

ويحدث أن تصل السيدة للشيخوخة قبل موعدها الزمني إذا هي تعرضت للإهانك الجسmani والعصبي المستمر المتمثل في تكرار الحمل والولادة مما يوقع الضرر المباشر على جميع أعضاء جسمها ويعرضها لكل أنواع المرض .

هناك بحد الشيخوخة تأتي في صورة أمراض الشيخوخة الشائعة مثل ارتفاع ضغط الدم ويأتي ذلك من تكرار الحمل والولادة وخاصة إذا تعرضت السيدة لتنفس الحمل ولم تعالج العلاج الكافي .

ونجد أيضاً حالات هبوط القلب وهي نتيجة طبيعية لارتفاع ضغط الدم وتكرار الحمل والولادة .

نجد كذلك مرض السكر والتهابات الكلى المزمنة وأمراض الكبد والمرارة فتعاني السيدة تبعاً لذلك من اضطرابات الجهاز الهضمي مثل فقدان الشهية للأكل فتسوء الحالة الصحية العامة ويحدث اهتزاز لما يضعف مقاومتها للأمراض ونجد كذلك عسر الهضم والإسهال وكلها تؤدي الصحة العامة .

ويعاني الجهاز التناسلي من تكرار الحمل والولادة ويحدث ذلك في صورة التزيف

الرحمي المتكرر الذي بدوره يسبب فقر الدم "الأنيميا" وهي مسؤولة بدورها عن استمرار التزيف ويحدث تبعاً لذلك الهزال والضعف الشديد الذي رعما أقعد السيدة عن الحركة .

ومن مشاكل الولادة وتكرارها بلا ربط حدوث سقوط الرحم والمهبل وينتاج عن ذلك مضاعفات كثيرة وآلام زائدة في التبول والتبرز وحصيلة كل ذلك هو تدهور الصحة العامة تدھوراً يفزع بها إلى حالة سن الشيخوخة .

وتحدث الشيخوخة المبكرة عند السيدات إذا استوصلت المبايض بالجراحة أو بفعل الأشعة العميقة لمرضها أو لعلاج أورام بالحوض وهنا تعالج الأعراض الأخرى بالمهدهيات والمقويات .

المراحلة الحرجة بالنسبة للمرأة !!!

مرحلة أوسط العمر بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء مرحلة حرجة وهامة ففي سن الأربعين يقع الظرفان بين جيلين مختلفين في كل شيء يطالا بهما بالكثير ويعتمدان عليهما نفسياً وعملياً وبالتالي يصبح الزوجان مركز الاحتياج الذي يركز عليه الجميع إن أسباب التوتر والقلق النفسي لدى المرأة في هذه السن تعزى دائماً إلى تغيرات جسمانية تحدث نتيجة لانقطاع الطمث .

أما الرجل فإنه يواجه ما يسمى بـ "أزمة أواسط العمر" .

فإذا ذهبت سيدة في أواسط عمرها إلى عيادة الطبيب شاكية له من أمراض نفسية وجسمانية وبالفحص ثبت عدم وجود مرض نفسي أو عضوي هنا فإن الطبيب سوف يرجح كل الأعراض إلى تغير الحياة أو كما تعودنا في بلادنا على تلك التسمية القيمية

"سن اليأس" إن أحدث التقارير الطبية بعد فحص 45 حالة مرضية أرجعت بعضها إلى مرحلة ما بعد انقطاع الطمث مثل الصداع خفقات القلب الأرق القلق التوتر التهيج الأكتئاب فقدان الرغبة الجنسية .

وفي الحقيقة فإنَّ الأعراض الحقيقية المصاحبة لمرحلة ما بعد انقطاع الطمث تكاد تنحصر في : اضطرابات في درجة الحرارة للجسم تتمثل في فورات حار وعرق غزير .

وهي اضطرابات ناجمة عن نقص هرمون الأستروجين "هرمون أنثوي رئيسي" نتيجة انكماس البيضين التدرجي والذى هو عملية طبيعية تحدث مع تقدم العمر وعندما ينقص هرمون الأستروجين عن حد معين فإن الدورة الشهرية تتوقف تماماً وتتوقف القدرة على الإنجاب وهذا يحدث ما بين سن الـ 45 وسن الـ 50 لدى غالبية النساء .

وعندما تقول لأي سيدة أن كل الأعراض التي تصيبها إنما هي نتيجة لتغير الحياة الناجم عن نقص هرموني فإن هذا يعني أن العلاج بسيط عن طريق تزويد الجسم بالهرمون الناقص .

ولكن هل هذا هو الحل الشافي ؟؟؟

إن هذا الهرمون سوف يمنع فقط الأعراض المتمثلة في الفوران الحار والعرق ولكنه لن يؤثر على باقي الأعراض .

والخطأ الأكبر هنا هو أن الدراسات التي تناولت المرأة في هذه المرحلة من عمرها إنما تناولت بشكل فردي وبشكل طبي نسائي معزز عن الظروف البيئية والاجتماعية والنفسية التي يمر بها كل فرد والدراسات المقارنة في عديد من البلدان قد أوضحت تبايناً شاسعاً في قدرة المرأة على التكيف مع هذه المرحلة .

الغدد عند المرأة وأثرها على الجمال

من الثابت علمياً أن الغدد الصماء في جسمك يا سيدتي تلعب دوراً هاماً في جمالك كيف ؟

هذا هو السؤال الذي نود أن نعرف الإجابة التفصيلية عند لتدركى أهمية هذا العالم في جسمك ، عالم الغدد وبخاصة بالنسبة لجمالك .

من المعروف أن الغدد الصماء هي المسؤولة إلى حد كبير عن جمال المرأة ، فهي مسؤولة عن طول وقصر القامة ، والسمنة والتحفاظ ، وعن نعومة وخشونة الجلد ، وكثرة الشعر وقلته وتساقطه ، وعن ظهور حب الشباب في الوجه ، وعن ظهور الشعر في الوجه فمثلاً في عصر من العصور القديمة كانوا يعتبرون تصضم الغدة الدرقية الموجودة بالرقبة

نوعاً من أنواع جمال المرأة و مع مرور الزمن لم تعد هذه الظاهرة كذلك ولكن اعتبرت من ضمن الظواهر التي تشوّه جمال المرأة ولذلك انتشرت ظاهرة استئصال الغدة الدرقية عندما تكبر أو تتضخم .

ولكن في الحقيقة أن تضخم الغدة الدرقية له أسباب كثيرة تتلخص في أن كمية الهرمون " ثيروكسين " المفرزة من الغدة غير كافية لإعطاء الجسم احتياجاته في عملية التمثيل الغذائي وبالتالي تقوم الغدة النخامية بإفراز هرمونها لتنشيط الغدة الدرقية فتضخم وتكبر في الحجم .

ولذلك ليست كل غدة درقية متضخمة لا بد أن تستأصل بل هناك علاج لبعض الحالات بدون إجراء عملية .

والغدة الدرقية مسؤولة عن نشاط الجسم وحيويته وعن مقاومة الجسم للبرودة ففي بعض المصابين بقلة إفراز هذه الغدة لا يستطيعون مقاومة البرد وتحدث لهم تورمات بأصابع اليدين والقدمين مع تغير اللون إلى الأزرق كما يصاحب ذلك تساقط الشعر وخاصة شعر حاجي العينين مع خشونة في الجلد .

أما في حالة زيادة إفراز الغدة الدرقية فيحدث أن المصاب يعاني من نقص في الوزن وعدم تحمل الإرهاق وزيادة في إفراز العرق كما يحدث في بعض الحالات حسوظ بالعيتين وفي هذه الحالات لا بد من معالجتها علاجاً سريعاً وإلا أدت إلى مضاعفات خطيرة أهمها هبوط القلب وضعف البصر أو العلاج إما بالأدوية العادبة أو باليد المشع أو كما في بعض الحالات يجري استئصال الجزء من الغدة الدرقية .

أما في حالات هبوط الغدة النخامية فيصبح الوجه شاحبًا اللون وتميل المريضة إلى الكسل وال الخمول ، وتشكو من انقطاع في الدورة الشهرية وتساقط في الشعر وخاصة شعر الإبطين والعانة .

حب الشباب . . . مشكلة كيف تو اجهيها ؟ ؟ ؟

حب الصبا أو حب الشباب مرض جلدي كثير الأشكال متعدد الأنواع ينتشر بين الفتيات والفتيان عادة في دور المراهقة وهذا ما يلقي النور على منشئه بصورة عامة .

ويتحجم حب الشباب عن التهاب مختلف الشدة يصيب الغدة الدهنية الجلدية أو الأجربة الشعرية ويغير الوجه لتصيره إلى المؤثرات الخارجية وقد ينتشر عند بعضهم فيتناول جلد الرقبة أو الصدر والظهر .

يصيب هذا المرض الأشخاص الذين يملكون بشرة جلدية طرية والذين يتعرقون بكثرة أو الذين اتصفوا بشرتهم بإفراز الدهن بغزاره .

على أن السبب الرئيسي في تكوين هذه الحبوب هو عدم احتراق الأدھان احتراقاً كاملاً بسبب اضطراب الإفرازات الداخلية في سن المراهقة .

ويعزو بعض العلماء ظهور هذه الحبوب إلى أسباب جنسية بحثة في الفتى أو الفتاة - اللذين يكونان غالباً ضحية عادة سيئة أو انعكاسات طفولية ماضية كمتص الإيمام وفرض الأظافر على أن للعقد النفسية أثراً لا ينكر في انتشار هذا المرض ولهذا يكثر

ظهوره في وجوه الطلاب أيام الفحوص إبان اشتداد الدراسة .

وتداول العامة - خطأ - القول المأثور بأن حب الشباب ملازم للمرادفين والمرادفات لا علاج له وأن الزواج وحده كفيل بمنع الشفاء ، مع أن استشارة الطبيب واجبة فقد تحول هذه الاستشارة دون تشويه الوجه وأن العلاجات الحديثة بالقضاء على هذه الحبوب ودرء أذاتها ، وإيقافها عند حدتها ثم استصالها استصالاً تاماً ولا بد من الانصياع إلى بعض النصائح لمكافحة حب الشباب قبل الركون إلى المرادم والعلاجات وبذلك يضمن المصاب عدم نكس مرضه واستفحاله .

فعلى كل مصاب تعريض وجهه ما أمكن إلى الهواء وإلى أشعة الشمس فللأشعة البنفسجية الأثر الشافي والواقي كما أنها تكب الماء النضارة والغضارة وتحمل الدماء تحرير في خديه .

وعليه - ثانياً - عدم لمس الحبوب بيديه وعصرها بأظافرها فإنه يسبب بذلك ندوباً لا تزول آثارها فضلاً عن مساعدته الجرائم على دخول بشرة جلدته وتخريبيها .

وعلى المصاب - ثالثاً - الاعتناء بجهازه الهضمي وتنظيم أوقات طعامه وتبرزه لأن أكثر السموم الجوالة في الدم تتأثر عن التخمرات المعوية وطرحها بانتظام واحتراقها احتراقاً كلياً يساعد على تنقية الجسم من هذه الحبوب والبشرور .

ومن المعلوم أن الفتيان في سن المرادفة يهلون أمر طعامهم وشرائهم منصرفين عن ذلك إلى هواهم ومرحهم أو دراستهم غير عالين بأثر هذا الإهمال في أجسامهم .
ويوصى المصاب - رابعاً - بالامتناع عن تناول المشروبات واللحوم فهي فضلاً

عن تسميمها الجسم تسمىماً بطيئاً فإنما مثيرة مهيجه تزيد في اضطراب مفرزات الغدد الداخليه .

وعليه - خامساً - أن يستعين على تنظيف وجهه بصابون " حامض خفيف " لا بالصابون العادي " القلوبي " .

يوصى المصاب - سادساً - بالابتعاد ما أمكن عن كل مثير جنسي لأن كثرة الاضطرابات الجنسية تزيد من اختلال التوازن الغدي وتؤدي إلى احتراق فضلات الطعام والسموم فتزاد الحبوب انتشاراً .

لهذا يمنع المصاب من قراءة الفحصوص الغرامية وعن ارتياط الملابسي ويدفع إلى غمرة الحياة الواقعية ليرتاد النوادي الرياضية وخاصة منها السباحة .

من الضروري - سابعاً - مكافحة الإمساك بالطرق الصحية المعروفة وهي شرب ماء بارد صباحاً على الريق وترحيس الأمعاء في وقت معين والإكثار من تناول الخضار والفواكه وجعل وجبة الصباح وجبة كبيرة أساسية في التغذية .

ومن الضروري تناول الحبوب المطهرة للأمعاء أو المضادة للدايزنترى " كالانتروفيوفورم " أو " الره زوترين " وغيرها .

- ثامناً - عرض الأمر على الطبيب لاختبار وظائف الكبد فقد يكون منشأ الحبوب قصوراً كبيرياً فتزول لتوها بمجرد مساندة الكبد في عملها .

- تاسعاً - لا يجوز استعمال أي مرهم يعلن عنه قصد الدعاية والتجارة .

- عاشرأً - كان الأطباء يلجأون في معالجة كل مريض إلى دواء وعلاج مختلف بين مريض وآخر ، فمن الطرق الطبيعية المتّبع إعطاء هرمونات الجنسية لتعديل الخلل الحادث في مفرّدات الغدد الداخليّة ، وإعطاء خميرة البيرة أو " الفيتامين ب " مع بعض المراهم المطهّرة .

وقد يلحّ الطبيب عند من استعصى داؤه إلى نقل الدم وتطعيمه به ذاتياً أو إلى تطبيق الأشعة البنفسجية أو " الراديوم " كما أن مادة " البرومور " تفید في هذه الأعصاب المتورّة وتساعد على احتراق السموم احتراقاً منتظماً .

مشكلة الشعر الزائد علاجها بسيط !!!

يعتبر شعر الإنسان نعمة جليلة من نعم الله ، إنه لا يقتصر فقط على الناحية الجمالية التي طلما ألمت الشعراء وأرقت الشعراء .
الشعر الذي يؤدي أيضاً دوراً هاماً في حماية بعض الأعضاء الحساسة مثل العين وفروة الرأس ، ولكن عندما يزيد الشعر عن حدّه يحوّل الغزال إلى قرد .
إن ظهور شعر الذقن والشارب أيضاً في مقدمة الصدر والبطن والساقيين والذراعين عند بنات حواء له عدة أسباب ، فمنها ما هو وراثي ومنها ما هو مرتبط بمناطق معينة خاصة في معظم بلاد الدول العربية ومنها ما هو ناتج عن تعاطي بعض الهرمونات الذكورية للسيدات أو الآنسات ، هذا بخلاف الأسباب الناتجة عن تضخم المبيضين وينتج عن ذلك كله أن الهرمون الذكري تزداد نسبته في الدم وهذا يؤثّر على بصيلة الشعر فيزيد من غلوّها نتيجة ازدياد هذا الهرمون في الجسم .

وتوجد أساليب عديدة للعلاج منها إزالة الشعر بالطرق العادبة أو عن طريق الأبر الكهربائية ، لكن هذه الطريقة غير سليمة لأنها تحدث أحياناً بعض التشوّهات في الجسم أكثر من الشعر ذاته .

وأهم طرق العلاج تتم باستخدام بعض العقاقير أو الهرمونات المضادة لهذا الهرمون وتحوذ عن طريق الفم وفي بعض الأحيان تلجأ إلى عملية تقشير المبيضين !!!

استمتعي بجمال أسنانك . . .

و ابتسمي ! ! ! !

ما أحوجك إلى الابتسامة العريضة التي تملأ شفتيك وتظهر صفوف اللؤلؤ الأبيض الجميل معبرة عن صفات من الأسنان طويل تغطي الشفة العليا ... وصف آخر تغطيه الشفة السفلية لترحيمه وتقيمه هذه الابتسامة التي تملأ حياتك صحة وسعادة .

ولكن كيف ليظهر هذا السحر وهذا الجمال إذا لم تكن أسنانك على أحسن حال ؟

إذن فالعناية بأسنانك مهمة واجبة ، والنظرة إليها نظرة مفيدة وصائبة .

فلتعمتي إذن بأسنانك طول حياتك ... ولتكن هذه الابتسامة والعافية من نصيبك ... والصحة والسعادة مدادك وقدرتك وليس هذا بالصعب العسير بل إنه على العكس سهل ويسير ... إذا أردت لأسنانك الدوام والتعمر ...

الطريقة الصحيحة للعناية بالأسنان :

يجب تنظيف الأسنان يومياً قبل الذهاب إلى النوم وفي الصباح الباكر وذلك بمحجون الأسنان الجيد والغنى " بالفلورايد " وفرشاة مناسبة طبية ، مع تجنب الاحتكاك المباشر بين الفرشاة ونسج اللثة لأنه رقيق وحساس وربما يصاب بعض التقيحات نتيجة لمثل هذا الاحتكاك .

إن أفضل طريقة لتنظيف الأسنان هي تحريك الفرشاة على الأسنان من أعلى إلى أسفل بالنسبة لأسنان الفك العلوي ومن أسفل إلى أعلى بالنسبة لأسنان الفك السفلي أي كما لو كنا ننشط الأسنان بالفرشاة .

كذلك يمكن استعمال " الخلة " في تنظيف ما يعلق بالأسنان بعد كل أكلة على أن يتم ذلك والฟم مغلقاً عليها ، أما إذا دعت الضرورة لتذليك اللثة لتفويتها فيكون ذلك بطرف أصبع السبابة مع استعمال مرهم لهذا الغرض دون إجهاد زائد لها .

وهذه بعض المقتراحات التي تساعد على تكوين لثة سلية والاحتفاظ بها في صحة جيدة :

- حاويي أن تسيري على نظام غذائي قليل في سعراته الحرارية غني بالفيتامينات والمواد المعدنية والبروتينية .
- دربي اللثة والأسنان على مضاع الخبز الجاف والخضار الطازجة والفواكه ذات الألياف وقللي من أطعمةك اللينة .
- لا تستخدمي الطعام المسلوق إلا إذا وصفه لك الطبيب .
- زوري طبيب أسنانك كل عام على الأقل .

الأعشاب والنباتات الطبيعية المغذية لبشرة الوجه !!!

1. الفاصلولياء .

- يذر مسحوق بنور الفاصلولياء فوق الجلد لتنقیته والمحافظة على نضارته

2. الخيار .

- ينقى عصير الخيار الطازج جلد الوجه ويکسبه نضارة وهذا الغرض يطلى الوجه بالعصير في المساء ليستمر مفعوله طيلة الليل ويلاحظ أن الغذاء يجب أن يكون طيلة مدة استعمال الدواء حالياً من التوابل والملحيات .
- ويجب تنظيف البشرة أولاً ، وهذه المناسبة أنسح لك ألا تكثري من استعمال الصابون في غسيل وجهك .
- اغسليه بالماء الطبيعي جيداً واتركي هذا الماء عليه أحياناً إلى أن يجف بمسنائی عن الهراء ولا تكوني من عاشقات المموم فعشيقها ليس من الفضائل .

الأعشاب والنباتات الطبية التي تؤمن لك النشاط والحيوية والشباب الدائم

!!!

• لتجديد خلايا جسمك !!!

1. غبار الطلع .
2. حبيرة البيرة .
3. القدونس .
4. العسل " التحل " .
5. الكوفس .
6. نبتة القمح .
7. إكليل الجبل .
8. مغلي الخلبة .
9. الألبان ومشتقاتها .
10. قشر البلوط .
11. البصل والثوم .
12. الكرات البري .
13. وثلة أعشاب أوروبية وآسيوية تبعث على النشاط كالصرقلية والملائكة .

مشاكل الثدي عند المرأة !!!

يستكون الثدي أساساً من غدة الثدي والدهون التي تحيط بها وتغطي من الخارج بالجلد الذي يسمى "بجلمة الثدي" والتي توجد حولها حالة صغيرة أو ما يسمى بدائرة الحلمة .

وغردة الثدي تكون صغيرة الحجم في مرحلة الطفولة عند الذكر والأثني على حد سواء ولكنها تنمو وتكبر بسرعة في الحجم عند الإناث عند مرحلة البلوغ ويزداد حجمها أكثر بعد الزواج ومرحلياً عندما ترضع الأم صغارها بعد الولادة .
ويصغر حجم هذه الغدة والثدي عندما يتقدم العمر بالمرأة وتصل لمرحلة الستين من عمرها .

أين مكان الثدي من حجم الإنسان ؟؟؟
إن للثدي مكاناً في جسم الإنسان وقد اختره الله سبحانه وتعالى في هذا المكان لحكمة يعلمها هو فيقع في صدر الإنسان ويحتل المساحة من الضلع الثاني إلى الضلع السادس طولاً من كل جهة من الصدر ، ومن عظمة الصدر إلى منتصف فحوة الكتف عرضاً .

وتقع الحلمة تحت منتصف الثدي تحت الضلع الرابع تقريباً بالقرب من غضروف الضلع الرابع محاطة بمساحة من الجلد البني اللون حول الحلمة وهو عبارة عن "حالة أو دائرة سوداء" .

ما سبق يتضح الوضع السليم للثدي بالنسبة لجسم الإنسان وحتى تكون الصورة واضحة عند إجراء جراحات التجميل أو الإصلاح ثم التدخل الجراحي السليم لعلاج الثدي في مختلف المراحل والتواحي .

ما أسباب جراحة تجميل الثدي ؟؟؟

توجد ثلاثة أسباب رئيسية تستدعي التدخل الجراحي السريع لإجراء عمليات التجميل والإصلاح للثدي عند المرأة .
وذلك الأسباب الرئيسية تحتاج بالضرورة إلى أن توجه الأنثى إلى جراح التجميل

ونود أن نوجز تلك الأسباب أو العوامل فيما يلي :

1. تضخم حجم الثدي وكثرة عن المعدل العادي المألوف والذي يتسبب في آلام نفسية وأحياناً في آلام بالظهر نظراً لكبر حجم الثدي وتضخمه بشكل ملحوظ وملفت للنظر كما أسلفنا .
2. صغر حجم الثدي أو ضموره عن المعدل العادي والمألوف لحجم الثدي وهو عكس الحالة السابقة تماماً ، معنى أن حجمه يكون أصغر بكثير من الحجم العادي وهذا أيضاً يؤدي إلى القلق النفسي والتوتر خاصة عند الفتيات بعد مرحلة النمو والبلوغ .
3. عدم وجود ثدي نمائياً ، ذلك يمكن حدوثه في ناحية واحدة في الجهة اليسرى أو اليمنى وأحياناً يكون بسبب استئصال الثدي جراحياً لوجود مرض خبيث به سواء في جهته اليمنى أو اليسرى ولقد أصبحت هذه العمليات الجراحية للثدي تم بشكل طبيعي ونجاح لا يدعو للقلق والخوف .

السمنة ناقوس الخطر عند المرأة !! !

تسبب البدانة من تجمع الدهون داخل الجسم في مواضع التخزين ويعتبر الشخص بدنياً إذا زاد عن الوزن الطبيعي الملازم لطوله وسنّه وجنسه بمقدار 20% أو أكثر .

وتشير السمنة بعد سن الخامسة والثلاثين حيث تقل كمية المجهود البدني الذي يبذله الشخص بعد هذه السن .

ومع اقتراب منتصف العمر فإن الترقى لوظائف إدارية كبيرة وما يتبع ذلك من الجلوس على المكتب ساعات طويلة دون جهد بدني يؤدي إلى مزيد من السمنة .

ومن هنا ... فإن نقص النشاط الجسدي إذا لم يصاحبه نقص مماثل في الأكل فإن ذلك يؤدي إلى السمنة كذلك وجد أن تناول بعض الأدوية يؤدي إلى السمنة .

وقد يؤدي الخلل الهرموني الناتج عن خلل في وظائف الغدة الدرقية أو التحامية أو حajar الكلوية إلى السمنة .

كما أن الهرمونات الأنوثية تلعب دوراً هاماً في ذلك فقد تحدث السمنة عقب الحمل أو بعد استصال المبيضين أو الرحم أو في سن اليأس ، وفي هذه الحالات يؤدي علاج الخلل الهرموني إلى تحسن ملحوظ في السمنة .

أما عن عوامل الوراثة فلم يفهم دورها في السمنة بصورة واضحة ومن ناحية أخرى فإن العادات الغذائية للأسرة قد تكون هي المسؤولة عن السمنة أكثر من

العوامل الوراثية فأطفال الأسر التي تميل إلى تناول الأطعمة المقلية والحلوب ومنتجات الألبان والحلويات يكونون أكثر وزناً من غيرها الذين يميلون إلى تناول الخضروات والفاكه واللحوم الحمراء .

وتعتبر السمنة أشد خطراً من السرطان هذا ما يؤكده علماء النفس الأميركيون إذ أكملوا أن أمراض ارتفاع ضغط الدم والجلطة والسكتة القلبية ، وبعض الضطرابات المعدية والمعوية ومنها الحصبة الصفراوية وبعض أنواع السرطانات لها علاقة وطيدة مع السمنة المفرطة كما أنه ليس صحيحاً أن اخضاع الجسم لرجيم قاسٍ يبعد الإنسان عن الآثار الجانبية للسمنة .

وأرجع العلماء أسباب السمنة في جعلها إلى كونها مرضًا نفسياً فقد أكدت الدراسات أن البدانة لا تصيب الإنسان المفكر ذا الحساسية الشديدة للمشاكل اليومية . وقد أكدت إحدى الاحصائيات أن الذي يعنيه من الكبت والحزن يتوجه لدفع شحنات من الغذاء تلقائياً دون أن يضع الضوابط المحددة لهذه الرغبة السيكولوجية الملحقة .

ذلك أن الغدد المسؤولة عن الهضم تتوقف عن العمل بسبب ما يصيب الجسم من خلل في الموزرين العصبية مما يتسبب في ترهل الشحوم التي يصعب على الطبيب المعالج إخضاعها للنقص .

ومع أن السمنة لا تكون دائماً مرتبطة مع أمراض أخرى فإن هناك مشاكل صعبة تصيب المرأة البدينة وتتفقدها رشاقتها التي هي سر جمالها حيث تضيع معالم الجمال بسبب البدانة ذلك أن مواطن الجمال في السيدات هي أكبر ثروة لهنّ ، ومدعاه فخر

- بين أصدقائهم ومتنة الآخرين ويمكن تلخيص هذه المشاكل الصحية فيما يلي :
1. تزيد الثقل الذي يحمله الجسم ويؤدي ذلك إلى التهاب المفاصل وجعل العضلات رخوة بعد اكتنازها بالدهون والشحوم .
 2. الجهد الكبير الذي يقع على القلب نتيجة زيادة العبء و يتسبب في تصلب الشرايين وضغط الدم .
 3. ارتفاع نسبة الإصابة ببعض الأمراض ومنها البول السكري .
 4. يفسد تجمع الدهن الزائد وظائف الجسم ويشوش على مواطن الحمل في المرأة .
 5. يعوق الدهن في الفراغ البطني حركة الحجاب الحاجز وعضلات البطن وبالتالي يسبب ضيق التنفس .
 6. يستعرض كثرة الدهن مع النشاط الطبيعي ، فالمرأة البدنية عرضة للإجهاد الشديد أكثر من غيرها .

كلام لأي أنثى !!!

الكلام لأي أنثى ... فالمشكلة معروفة ... ولكنها خاصة جدا !!!

فاليد تند إلى ذلك المكان الحساس والألم يتزايد وتبعد دوامة العذاب والرغبة في الحكة " المرض " لا تريح بل تزيد المتاعب .

وإذا كانت الشكوى من المرض واحدة ، فإن الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الحكة في هذا المكان الحساس من جسم المرأة كثيرة .

فعدما تتحدث عن أسباب هذه الحكة يتضح أن هناك نوعان من الحكة :

1. هرش مصحوب بإفرازات .

2. هرش بدون إفرازات .

والواقع أن أي امرأة يمكن أن تتحوّل من هذا العذاب فقط ... يجب معرفة السبب
أولاً ليتم علاجه وتنتهي المشكلة .

قبل كل شيء هل الهرش مشكلة قليلة الحدوث ؟؟؟؟؟

إن الحصائيات تقول أن 10 % من المتاعب التي تشكو منها الأنثى تكون راجعة
إلى هذا الهرش .

إنما مشكلة بالنسبة للأثني سواه كانت زوجة أو عذراء ولكن الذي يجب أن
تعرفه أي أن رغبتها في الهرش في هذا المكان الحساس من جسمها ما هي إلا تعبر
عن هذه الاضطرابات التي حدثت فعلاً في الأعضاء التناسلية وفي خارجها أيضاً .

وعلى هذا يجب أن نعرف أن المسكنات لا تفيد في علاج الألم مهما زادت
كميتها ويكتفى أن نتصور ما قد يحدث عندما يبدأ الهرش في النهار عذاب شديد
فالأنثى في محل عملها أو في مدرستها بين الناس ... أي عذاب !!!

وأي إحساس مؤلم وهي عاجزة عن التصرف وعيون الناس تحيط بها أما في الليل
فالعذاب موجود فهي لا تستطيع النوم من شدة الألم الذي يعذبها دون أي علاج .

و قبل أن ندخل في تفاصيل هذه الحالة يجب أن نبدأ بتحديد وتعريف موضع
ومكان الشكوى إنه عند مخرج الأعضاء التناسلية ألا وهو المهبل وليس عند فتحة
الشرج كما يخطيء البعض .

فـ تحديد المكان مهم لأن على أساس تحديد المكان يتم تشخيص حقيقة الحالة

المرضية

الشكوى واحدة والسبب مختلف .

الشفاء ممكن :

والتشخيص السليم هو أول خطوات العلاج الناجح والعلاج الموضعي لمنع الهرش يكون باستعمال الغسول والراهم المخدرة وتجنب العرق والملابس الضيقة ... والملابس الداخلية المصنوعة من النايلون مع الحرص على تغيير الملابس الداخلية بكثرة مع عليها .

ويكون العلاج باستكمال النقص في حالة وجوده أو القضاء على العدوى إذا حدثت .

ولكن من المهم أن أقول هذه الحقيقة أن 95% من حالات الحكة المهبلية " الهرش " يمكن شفاها تماماً إذا تم تشخيصها بدقة وعلاجيها بسرعة ولكن الإهمال والتكاسل في الكشف أو العلاج هو الذي يعقد الأمور في وقت يمكن أن تستريح فيه الأنثى من العذاب .

أكثـر من فـحـص قـبـل الزـوـاج ! ! !

بحـانـب فـحـص الـيـدـيـن وـالـأـظـافـر جـيـداً بـجـدـاً أـنـه مـنـ الضـرـوري عـمـلـ الفـحـوصـ التـالـيـة :

1. تـكـرـارـ الفـحـصـ المـعـلـيـ الـبـكـتـرـيـلـوـجـيـ لـلـإـفـرـزـاتـ الـمـهـبـلـيـةـ ...ـ وـالـتـكـرـارـ هـنـاـ ضـرـوريـ لـأـنـ الطـحـلـبـ الـسـبـبـ لـلـحـالـةـ يـهـرـبـ خـالـلـ الفـحـصـ وهـكـذـاـ قـدـ تـكـونـ النـتـيـجـةـ سـلـبـيـةـ بـالـرـغـمـ مـنـ وـجـودـ الطـحـلـبـ فـعـلـاًـ ...ـ وـهـكـذـاـ يـجـبـ تـكـرـارـ الفـحـصـ لـلـتـأـكـدـ مـنـ عـدـمـ وـجـودـ العـدـوـيـ .ـ
2. فـحـصـ كـامـلـ لـلـدـمـ لـتـشـخـصـ حـالـاتـ الـأـئـمـيـاـ وـنـقـصـ الـفـيـتـامـيـنـاتـ وـالـمـاعـادـنـ .ـ
3. فـحـصـ عـصـارـةـ الـمـعـدـةـ لـلـتـأـكـدـ مـنـ وـجـودـ الـكـمـيـةـ الـكـافـيـةـ مـنـ حـامـضـ الـهـيـدـرـوـكـلـورـيـكـ .ـ
4. تـخـلـيلـ الدـمـ لـلـسـكـرـ وـعـمـلـ الرـسـمـ الـبـيـانـيـ وـلـاـ يـكـفـيـ تـخـلـيلـ الـبـولـ فـقـطـ .ـ
5. تـخـلـيلـ عـيـنةـ مـنـ الـجـلـدـ إـذـ [1] لـزـمـ الـأـمـرـ .ـ

أـعـشـابـ لـإـزـالـةـ الرـائـحةـ الـكـريـهـةـ لـلـجـسـدـ ! ! !

إـذـاـ كـانـ الـجـسـدـ يـعـرـقـ بـدـرـجـةـ كـبـيرـةـ فـهـذـاـ يـعـنـيـ أـنـ مـسـامـ الـجـسـمـ وـاسـعـةـ وـيـكـفـيـ الـعـلـمـ عـلـىـ تـضـيـيقـهـاـ بـإـضـافـةـ الـعـشـبـ وـمـقـدـارـ صـغـيرـ مـنـ حـامـضـ الـبـورـيـكـ إـلـىـ مـاءـ الـحـمـامـ وـلـوـ أـنـ اـحـتـجـازـ الـعـرـقـ لـيـسـ صـحـيـاـ وـيـسـبـبـ الضـيـقـ لـلـإـنـسـانـ .ـ

لإزالة الرائحة !!!

أما إذا صحب العرق انبعاث رائحة غير مستحبة خاصة من تحت الإبطين فيلزم الاستحمام يومياً واستخدام المريلة لرائحة العرق ومراعاة أن تكون أماكن انبعاث الرائحة نظيفة حالية من الشعر ما أمكن ، ونشر بودرة التلك عليها والإكثار من تغيير الملابس بحيث تكون هذه الأماكن ملاصقة دائماً للملابس نظيفة وجافة حتى تنتهي هذه المشكلة تماماً وتختفي الرائحة المتبعثة من هذه الأماكن .

كما أن الاستحمام والدوش اليومي هو من أفضل الطرق الصحية لنظافة وإزالة رائحة العرق ولتحديد نشاط الجسم .

مستحضرات لإزالة الرائحة :

1. رائحة النضج يزيلها حام البابونج :

زهرتان أو ثلات زهرات لكل لتر من الماء المغلي يضاف إلى ماء الحمام أو يدهن به الجسم قبل الحمام بربع ساعة .

2. و يمكنك استعمال عطر ملكة الجبلترا :

ويتكون من زهر بارنج وبنفسج وورق من زهر الورد العطر .

3. أو عطر ملكة الجبل ويصنع مما يلي :

أ- 350 جراماً من إكليل الجبل المحفف .

ب- 30 جراماً من قشر البرتقال أو النارنج الطازج .

ت- 30 جراماً من عشبة السيترونيل .

ث- 30 جراماً من قشر الليمون الحامض .

ج- 30 جراماً من ورق النعنع المحفف .

توضع هذه المواد في وعاء وتنقع لمدة شهر في ماء يغمرها من كمبتن متساوين من ماء الورد ومن المحلول النقي ثم تصفى للاستعمال ويمكن أن يضاف من هذا العطر ماء الحمام .

تساقط الشعر !!!

يعتبر الصلع ومشكلة سقوط الشعر من أقدم المشاكل التي تواجه الإنسان والتي حاول الأطباء أن يجدوا لها حلّاً حاسماً .

وتعتبر كمية وتعدد الوصفات البلدية التي تنبت الشعر والتي يتوارثها الأبناء عن الآباء عن حجم المشكلة كما أنها تعطي انطباعاً غير مباشر بأن الطب لم يستطع إيجاد حل حاسم لمشكلة سقوط الشعر .

والواقع أن تعدد أسباب سقوط الشعر وتنوعها هو الذي يخلق المشكلة أمام الطبيب المعالج فهناك الضغوط العصبية وتذبذب مستوى الهرمونات في الدم والأنيميا بأنواعها المختلفة وغيرها الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى سقوط الشعر هذا غير الصلع الذي تحدده الصفات الوراثية للإنسان وفي بعض الحالات يحتاج الطبيب للكثير من الفحوص والتحاليل حتى يصل إلى السبب الحقيقي لهذه الحالة إلا أن خبرة الأطباء العاملين في هذا المجال تقول أن المشاكل الفعلية التي تواجه الطبيب لا تكون غالباً علمية ولا ترتبط بطبعية المرض بقدر ما ترتبط بنفسية المريض واعتقاداتاته الشخصية .

فمثلاً هناك اعتقاد سائد بين كثيرين ولا ندري ما سقوط الشعر والضعف الجنسي وكثيراً ما يضطر الطبيب إلىبذل الكثير من الجهد والوقت محاولاً إقناع

المريض أن هذه مجرد أوهام وأنه لا توجد حقيقة علمية تؤكد هذا الكلام بلا جدوى وهناك هؤلاء المرضى في بعض الحالات الذين لا يقتنون بقول الطبيب بأن حالتهم ستشفي من تلقاء نفسها بعد فترة ويصرؤن على تناول أدوية أو أية وصفات موضعية أو نظام للطعام .

وهناك قصة الطبيب الذي جاءته مريضة تشكو من سقوط شعرها بعد الولادة الأولى وهي حالة عادبة سببها تذبذب في مستوى بعض الهرمونات ولا تحتاج لأي علاج لأن الشعر يعود للنموّ عندما يستقر مستوى الهرمونات بعد فترة . ولكن المريضة رفضت أن تقنع بهذا فقد اقترح الطبيب لها نظاماً غذائياً خاصاً وهو أن تأكل يومياً سلطة لمدة ستة شهور وبعد تلك الفترة فوجيء الطبيب بما تقول له : " انظر يا سيدي لقد نجح العلاج " .

وهناك أيضاً الحالات التي يكون سبب سقوط الشعر فيها استخدام العصبيات والكماءيات المختلفة على الشعر ولفترات طويلة هذا غير أدوات التمشيط الساخنة التي تفرد الشعر أو تجعده ففي هذه الحالات تأتي المريضة تبحث عن علاج وترفض تماماً بأن سبب هذا السقوط هو ما تستخدمه على شعرها إذ أن تأثير الإعلانات وإغراء الموضة يمكن أن غالباً أكثر اقتناعاً من صوت الطبيب المعالج .

آلام الكفين عند النساء !!

تكثر وتشتد هذه الآلام من عند الرسغ إلى أطراف الأصابع في النساء ولها مرض مواسم من أهمها فصل الشتاء وتكثر هذه الآلام بعد العسل أو عند النوم والدفء .

ومن أسباب هذا المرض :

1. الحمل في الشهور الأخيرة .
2. التقرس لوجود تربات بأملاح البيريك .
3. مرض البول السكري بسبب التهاب الأعصاب الطرفية .
4. التهابات العمود الفقري للرقبة .
5. ضغط الدورة الدموية بالأصابع في فصل الشتاء .
6. الضغط على العصب الأوسط في النفق بالرسغن لوجود التهاب حول الأوتار بالرسغ أو وجود ورم أو تليف بالرباط الرسغي للنفق .

التشخيص :

يجب أن يتحقق المرض جيداً وأن تستبعد الأسباب العامة مثل الحمل فإن المرض يزول بعد الوضع ويستبعد مرض البول السكري حيث أن الآلام تختفي بعلاج مرض السكري جيداً وكذلك علاج مرض التقرس بأن تكون نسبة أملاح البيريك في الدم أكثر من معدله الطبيعي وتختفي هذه الآلام والأعراض بعلاج هذا المرض .

وكذلك يجب أن تتحقق عظام الرقبة جيداً وتعمل لها الأشعات اللازمة وتستبعد كسب هذه الآلام ويفى بعد ذلك السبب الموضعي وهو الضغط على العصب الأوسط للنفق الرسغي ولهذا المرض علامات إكلينيكية تعرف بواسطة طبيب العظام .

وكذلك يجري فحص العصب الأوسط بواسطة جهاز معين لقياس نشاط العصب ويتم لمعرفة قياس المكان المضغوط من العصب .

العلاج :

يتم علاج آلام الكفين والأصابع من الرسغ بسبب الضغط على العصب الأوسط

داخل نفق الرسغ بطرقين هما :

الطريقة الأولى :

تتم الحقن الكورتيزون الموضعي داخل هذا النفق في مكان معين واتجاه معين بعيداً عن العصب ولا يمكن لأي طبيب القيام بذلك إلا المختصين للتدريب على طريقة الحقن ويكتفى بعدد من الحقن الموضعي حتى زوال هذه الآلام تماماً ، ويعمل بعد ذلك قياس للعصب .

الطريقة الثانية :

وهي إجراء عملية جراحية فيفتح الرسغ وتزال التلفيات من حول العصب والأورام الموجودة في النفق وفتح الرباط الرسغي حيث يكون في هذه الحالة مثلياً وسيكاً وضاغطاً على العصب .

ويقوم أخصائي العظام باختبار الطريقة المثلثى للعلاج حسب كل حالة والنتائج مشجعة ومطمئنة تماماً في هاتين الحالتين .

وهنا يجب أن أنبه كل سيدة أو فتاة تعانى من هذه الآلام بأن العلاج الطبيعي لا يفيد في هذه الحالات إذ لا بد من العلاج بالحقن الموضعي .

المرأة و الاكتئاب !!!

أغلب الظن أن الاكتئاب النفسي هو أحد الأمراض في عصرنا الحالي حيث يتزايد انتشاره في كل أنحاء العالم فقد ذكرت منظمة الصحة العالمية أنَّ 3 - 5 % من سكان العالم يعانون من الاكتئاب أي ما يزيد على 300 مليون إنسان ومن الغريب أيضاً ما تؤكده الإحصائيات من أن المرأة أكثر إصابة بالاكتئاب من الرجل بمعدل (3 - 1) وفيما يلي سوف نحاول إلقاء الضوء على هذا الارتباط بين المرأة والاكتئاب :

هُموم المرأة :

في الواقع أن المرأة لها تكوينها النفسي المتميز وطبيعة خاصة لشخصيتها ودورها ولديها - علاوة على ذلك - من الخبرات والموافق ما هو خاص بها دون الرجال فهي تختلف عنهم في حالة الصحة وفي حالة المرض أيضاً .

فالمراة لديها ما تميز به في كل مراحل النمو من الطفولة إلى البلوغ وظهور الطمث أو الدورة الشهرية ثم الحمل والولادة والنفاس والأمومة ورعاية الأطفال .

ثم لديها ما اصطلاح على تسميته " سن اليأس " وكل هذه المراحل لها خصوصيتها وهمومها من مشكلات في فترة المراهقة ثم الزواج أو عدم الزواج " العنوسة " والطلاق إذا حدث لأي سبب ثم الواجبات المنزلية للمرأة كربة بيت أو

مسؤوليات العمل خارج المنزل وكل هذه الأمور تتقلّل كاهل المرأة وتضيف إلى حياها أعباء إضافية بدنية ونفسية .

قبل الزواج وبعده :

إذا تبعنا مسيرة المرأة في الحياة منذ مراحل الطفولة وحاولنا أن نرص ما يعتريها من مواقف وتغيرات وما لذلك من آثار على توازنها النفسي والعاطفي نجد أن البنات في مرحلة الطفولة أقل تأثراً بالاضطرابات النفسية مقارنة بالأولاد من نفس العمر .

ويفسر ذلك بسرعة النمو والنضج للبنات أكثر من الأولاد في المرحلة التي تسبق البلوغ ثم تأتي بعد ذلك مرحلة المراهقة بما يصاحبها من تغيرات جسدية لم تتألفها الفتاة من قبل مما يوجد لديها شعوراً بالتوتر والاضطراب تفاوت شدته فالمراهقة مرحلة حرجة بكل المقاييس شأن أي فترة انتقال حتى الوصول إلى النضج .

يأتي الزواج بعد ذلك وهو أحد المحطات المهمة في حياة المرأة ورغمما كانت أهمها جمعياً حيث يبدأ بمرحلة الاختيار وما يحيط بها من توتر قد يصل إلى حد الصراع النفسي ، وينتهي الأمر بالانتقال إلى الحياة الزوجية وهي مرحلة تتطلب في بدايتها قدرًا كبيراً من التوافق حتى يتم التكيف مع هذا الوضع الجديد .

ولما كان التوافق التام بين طرفي الزواج أمراً غير ممكن عملياً ولا وجود له غالباً إلا في خيال الذين لم يخوضوا بعد تجربة الزواج فإن السنوات الأولى من الحياة الزوجية تشهد في الغالب كثيراً من الشد والجذب بين الزوجين نتيجة لصعوبة التفاهم بينهما وهذا يحدث بصورة واضحة في أكثر من 50% من حالات الزواج .

الحياة الزواج الطلاق !!!

تلقي الصراعات الزوجية بين زوجين غير متافقين بظلالها على حياة كل منهما فيعاني كلا الزوجين بصورة أو بأخرى من الآثار السلبية المترتبة على هذه الصراعات . غير أن المرأة تكون عادة هي الطرف الأكثر تأثراً وقد لا يكون هناك أي مخرج أو حل مشروع لهذا الموقف سوى الانفصال أو الطلاق .

والطلاق رغم أنه أحد الخبرات المريرة في حياة المرأة فقد وجد أن نفس الأسباب التي تؤدي إليه إذا ما قورنت بالنتائج التي تترتب عليه فإن الآثار الناجمة في كلتا الحالتين تتساوى من الناحية النفسية وهذا معناه أن الاستمرار في حياة زوجية غير متلائمة خوفاً من تجربة طلاق لا فائدة منه ولا يحمل أية ميزة للمرأة وذلك حتى في حالة وجود الأطفال الذين يخشى عليهم من آثار الطلاق .

فالواقع أن هؤلاء سوف يتأثرون حتماً بما ينجم عن الطلاق نتيجة لانفصال الأبوين وإما باستمرار الخلافات الزوجية نتيجة للتواجد في جوٌّ أسري مليء بالمشكلات والصراع

والنتيجة في كلتا الحالتين سلبية ومتساوية تقربياً وذلك خلافاً لما يعتقد البعض من أن وجود الوالدين معاً ومعهم الأبناء تحت سقف واحد أفضل من غياب أحد الوالدين من الساحة وبقاء الآخر مع الأطفال فهذا الرأي محل شك .

هموم ربات البيوت :

نرى السيدات من ربات البيوت اللائي لا يعملن خارج المنزل الكثير من المشكلات والهموم الخاصة بهن مما يجعلنهن أكثر عرضة للإصابة بالإكتئاب وتؤيد

الدراسات التي أجريت في بلدان مختلفة أن للمهنة علاقة مباشرة بالإصابة بالاضطرابات النفسية خصوصاً الاكتئاب .

ومهنة " ربة بيت " هي في العادة التي تناول النصيب الأكبر من الإصابة بالإكتئاب النفسي كما تذكر ذلك الاحصائيات في بلاد مختلفة أجريت بمعرفة منظمة الصحة العالمية

وفي دراسة أقيمت على عينة من مرضى الاكتئاب كانت الغالبية العظمى بنسبة 70% من الحالات من ربات البيوت !!!

وربما يرجع السبب في تعرض ربات البيوت بصفة خاصة للإصابة بالإكتئاب إلى ما يبذله من جهد كبير في المنزل مع الشعور بعدم الرضا أو الاشباع من خلال هذا الدور داخل جدران المنزل والإحساس بالعزلة والملل .

وقد ورد في مراجع الطب النفسي ذكر نوع من الاكتئاب يتسم بأنه يصيب السيدات بصفة خاصة ويسبب عنده شعور تزايد بالفتور والإرهاق ، آلام بدنية وبمهمة ، وقد أطلق على هذه الحالة مرض ربات البيوت .

المراة وأسباب أخرى للاكتئاب :

ثمة مواقف وحالات أخرى قد تكون وراء إصابة المرأة بالاكتئاب مثال ذلك مضاعفات عملية الحمل والولادة وما يعقبها من النفاس ثم أعباء الأمومة ورعاية الأطفال .

وهذه الأمور تحمل من التغيرات البدنية والمزاجية ما قد يدفع إلى الشعور بالغrief والسلام ومشاعر الكآبة التي أحياناً ما ترتبط بخطرة الإقدام على إيذاء النفس أو الانتحار

ورغم أن ذلك الاضطراب يعزى إلى هموم الحمل والولادة ومسؤوليات الزواج والأمومة فمن الغريب حقاً أن نعلم أن غياب هذه المواقف قد يكون هو السبب في إصابة المرأة بالكآبة .

فالسيدات اللائي فاهمن قطار الزواج ويعانين من العنوسه وأولئك اللائي تزوجن ولم يقدر لهن إنجاب الأطفال فحرمن من الأمومة هن في الغالب من ضحايا الاكتئاب النفسي

ولقد ثبت أيضاً تزايد الاضطرابات الاكتئابية في السيدات اللائي يتعاطفين بأعراض منع الحمل لمدة طويلة وذلك يرجع لأسباب نفسية ولما يتبع عنها من خلل بيولوجي نتيجة لتأثير ما تحتويه من الهرمونات كما تزيد حالات الاكتئاب في السيدات اللائي أجريت لهن جراحة لربط أنابيب الرحم لمنع الإنجاب حتى لو تم ذلك بمحض إرادتهن وكذلك في السيدات اللائي أجريت لهن عملية استئصال الرحم لضرورة ما ، وأيضاً عقب حدوث الإجهاض .

سن اليأس بين الحقيقة والوهم !!!

بقيت حالة أخرى ارتبطت بردح طويل من الزمن في الأذهان بالاكتئاب النفسي هي ما يطلق عليها سن اليأس وربما أسهمت هذه التسمية في حد ذاتها في هذا الارتباط حيث تظن المرأة أن هذه الحالة من اسمها نصيب رغم أنها ترجمة غير دقيقة لحالة توقف الحيض .

وتعزى الاضطرابات النفسية التي تصيب المرأة في هذه المرحلة من العمر إلى ما يعتريها من تغيرات بيولوجية أهمها انقطاع الدورة الشهرية حيث يرمز ذلك إلى بداية خريف العمر بالنسبة للكثير من النساء اللائي ينظرن إليه على أنه إيدان لتجمّعهن الساطع بالأفول ولعل هذا التصور الوهمي هو المرض نفسه.

فقد ثبت علمياً عدم صحة الارتباط بين الاكتئاب وهذه المرحلة من العمر وكل ما يذكر عن اكتئاب سن اليأس نستطيع أن نؤكد عدم دقيقه

فحالات الكآبة التي تحدث في هذه المرحلة لا تختلف عن تلك التي تحدث في مراحل العمر الأخرى حيث لم تسجل أية زيادة في هذه السن بالذات ولعل ذلك هو ما حدا بالمتخصصين إلى حذف هذه التسمية من التصنيفات الحديثة في الطب النفسي .

متناقضات وهل من حل ???

لم يعد المرء بحاجة إلى دليل على وجود ارتباط بين المرأة والاكتئاب بعد كل ما تقدم لكنها بالفعل علاقة لا تخلي من المتناقضات .

فالمرأة تصاب بالكآبة نتيجة لمشكلات الزواج أو نتيجة لعدم الزواج وبسبب مضاعفات الحمل والإنجاب أو إذا حرمت من ذلك وإذا خرجت للعمل أو جلست داخل المنزل .

إن ذلك يذكرنا بما يردده المتشائمون في بعض المناسبات حين يقولون : لن يستريح الإنسان إلا في قبره فهل ذلك ينطبق على المرأة ؟

إننا نبادر بتاكيد رفضنا لهذه المقوله التي تدعى إلى اليأس والإحباط فكل سبل السعادة وراحة البال موجودة في داخلنا ومن حولنا وإن كان البعض منها يضل الطريق إليها في كثير من الأحيان .

ومن جهة نظر الطب النفسي فإن الارتباط بين المرأة والاكتاب ربما كان مرجعه إلى انخفاض تقدير المرأة لذاتها وعجزها عن فهم قدراتها وذلك في مقابل سيادة الرجل في الأسرة والمجتمع وأحياناً تدفع مشاعر العجز المرأة إلى محاولة التفوق والاجماع بين مجالات عديدة دون الانتباه إلى حجم إمكاناتها وقدراتها

وأوضح ذلك فأقول : إن المرأة يصعب أن تتأتى لها القدرة على أن تكون الموظفة أو سيدة الأعمال الناجحة وفي نفس الوقت أماً مثالية وزوجة رائعة وربة بيت وطاحية طعام ماهرة !!!

وأرى أن المرأة إذا قومت بإمكاناتها بموضوعية واعتدال وتوصلت إلى تسوية أو حل وسط يرضي جميع الأطراف توفق فيه بين هذه الحالات المختلفة فإذنها في هذه الحالة تستطيع أن تعيش حياة نفسية مستقرة وتحتفظ بتوافقها النفسي في مواجهة الكتاب .

عذاب دائم للمرأة اسمه الصداع المزمن !!!

يرى الدكتور "برازيليه"⁽¹⁾ أن الصداع بدأ مع حياة الرجل والمرأة فيقول : "إن المرأة هي التي خلقت الصداع وتعاملت معه ثم وقعت صريعة ... وإذا كان الصداع خمسة أنواع فإن المرأة تتفوق على الرجل في الإصابة بأكثر من أربعة أنواع منه ولعل صداع الميحرin "الشقيقة" هو أكثر أنواع الصداع انتشاراً إليه الصداع العصبي والنفسي .

والمرأة تحملت عديداً من الأسباب التي يجعل الصداع رفيقاً لها وما من امرأة إلا وحملت في حقيبة يدها المسكنات والعطر والمتدليل كأسلحة لها وللصداع والدموع الجاذبية .

فهناك صداع " لا فجر " وسببه ضغط الدم العالي وهو يصيب الجزء الخلفي من الرأس وصداع الصباح الباكر هو الميحرin "الشقيقة" الذي يصيب الجزء الأيسر أو الأيمن من الرأس ، وكذلك فهو يمكن أن يصيب منتصف الرأس وفي اتجاه واحد وقد يصيب البعض خلف الرأس وهو أسوأ أنواع الصداع وأكثرها ألماً .

(1) متخصص في أمراض النساء : رئيس نادي الصداع في باريس .

وينصح الدكتور "برازليه" مرضى الميحرin عندما تصيبهم التوبة أن يلحوأ إلى حجرة مظلمة وأن يلحوأ إلى المدء والسكينة حالسين والقرفباء حتى لا يتعرضوا لأية مضائقات تزيد من صداعهم .

أما الصداع النفسي والعصبي أو الصداع ما بعد الظهيرة فإنه يصيب منتصف الرأس وعلى جانبي الرأس أيضاً والصداع في وقت الظهيرة يكون بسبب الجيوب الأنفية وهو يصيب الجزء الأمامي من الرأس .

والصداع الليلي سببه متاعب العيون والقراءة غير الصحية وإجهاد الكتابة والقراءة أما صداع ما بعد منتصف الليل فهو يختص الذين يسرفون في شرب الكحول .

وثمة مأكولات ومشروبات تسبب الصداع المؤقت والطاريء الذي يزور الإنسان مرة واحدة وينساه كما أن الحرارة الشديدة والجوع والتخمة والبرد كلها تسبب الصداع المؤقت .

وعموماً فإن كل أنواع الصداع سببها معروف مثل صداع الجيوب الأنفية ومتاعب العيون والنظارات غير الصحية والقراءة المعيبة وضغط الدم العالى والكتلى والضغوط النفسية والعصبية ، ما عدا الصداع النصفي فإن سببه غير معروف على وجه التحديد حتى الآن وإن كان معروفاً أن الوراثة من بعض أسبابه ، والبعض الآخر غير معروف أسبابه ونسبة منه سببها الترف والملل والإحباط النفسي .

قائمة المحتويات

الموضوع	رقم الصفحة	الموضوع	رقم الصفحة	رقم الصفحة
المقدمة		للمرأة الرشيدة ...	3	33
فحص العروس قبل الزواج		كيف تكون بنت العشرين ...	5	35
العقم مشكلة لها حل		كيف تحدث الشيخوخة ...	6	36
إذا كان زوجك ضعيفاً		المرحلة الحرجة	8	37
أسباب السقوط الرحمي .		الغدد عند المرأة ...	9	39
البرود الجنسي عند المرأة		حب الشباب	12	41
إصلاح غشاء البكارة		مشككنة الشعر الرائد ...	13	44
ختان الإناث		استمعي بجمال أستانك !!!	14	45
مرض سري قد يصيب النساء		الأعشاب والنباتات الطبيعية ..	15	47
الوصايا العشر للمرأة الحامل		الأعشاب والنباتات الطيبة ...	16	48
احذرى الحمل قبل سن العشرين		مشاكل الدي ...	17	49
الحمل خارج الرحم		السمنة ناقوس الخطر ...	19	51
ما هي علامات الخطر		كلام لأي أشي ...	21	53
كيف تتحسين التزيف ...		أكثر من فحص قبل الزواج ..	22	56
كيف تصرف السيدة		أعشاب لإزالة الرائحة	24	56
لا تقلقي بشأن الولادة		تساقط الشعر ...	25	58
أعراض الولادة الحقيقة ...		آلام الكفين عند النساء	27	59
الولادة قبل الميعاد ...		المرأة والاكتئاب .	29	62
التجريب المعجل للولادة ...		عناب دائم للمرأة امه	31	69
رشاقة دائمة للمرأة			32	

أسرار المرأة وحياتها الخاصة الصحية والنفسية



حـادثـة إـمـرـاء لـلـنـشـر وـالـتـوزـيع

الأردن - عمان - البحرين - مقابل الكراجات - تلفاكس ٦٦٢٠٧٦١

جبل عمان - الدوار الأول - تلذاكس ٦٦١٥٩١ ص.ب ١٨٧٦٦ عمان -الأردن



٠٥٩٦١٣٥٨٣٥٨٧، س. تاریخی معاصر